سندیکای تولیدکنندگان
مکمل‌های رژیمی غذایی
ایران

راهنمای مکمل‌های رژیمی غذایی ایران



گردآورندگان: محمد مهدی قاضی مرادی، پوریا فتحعلی‌پور
ترانه کاووسی، ساغر صدیق، طهور نیکبخت، علی وحدتی
مبین حمیدی، مهدی چوب فروش خویی، یزدان مهرفیروزی

زیر نظر: دکتر عباس کبریایی‌زاده

تهیه و تنظیم:

سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران

فهرست اسامی شرکت‌های دارویی

آبا داروطـب ۴
ابیـان دارو ۲۰
ابیان فارمـد ۳۶
آریان سناء ۴۴
آرین سلامت سینا ۶۹
اسـوه ۸۱
اطلس تجارت سـبحان ۹۷
آفشـن ۱۰۶
افق تدبیر سـلامت ۱۱۱
اکسـون فارمد ۱۲۹
الحـاوی ۱۴۹
الشـن دارو ۱۷۹
به سـازان پژوهان امید آریا ۱۸۲
پـارس حیـان ۲۰۶
تچرا فارمـد ۲۴۷
تهران دارو ۲۵۱
ثنامـد ۲۷۸
حکیمان طب کار ۳۰۳
دارو درمان پارمیـدا ۳۹۶
درسا دارو ۴۰۸
دکتـر عبیـدی ۴۱۷
رازک ۴۲۸
سـامان فارمد پویـا ۴۴۲
شـرکت اشبال شیمی ۵۳۳
کوثـر ۵۳۸
کیمیا سـلامت ایرانیان ۵۵۷
کیمیـدارو ۵۶۳
نـاوک دارو ۵۶۶
نوریا درمان پاسـارگاد ۵۷۴

مقدمه


• علم و فن‌آوری به سرعت در حال پیشرفت است. حاصل این پیشرفت به‌خصوص در صده گذشته و حاضر افزایش امید به زندگی، افزایش طول عمر و برخورداری بشر از رفاه اجتماعی بیشتر بوده است. پیشرفت‌های رخ داده در حوزه پزشکی و داروسازی از بالاترین نرخ رشد در میان علوم مختلف برخوردار بوده است. استفاده از دانش و فن‌آوری‌های بین رشته‌ای شتاب بیشتری به برخورداری انسان از خدمات و کالاهای سلامت داده است. به موازات پیشرفت‌های صورت گرفته در حیطه‌های گوناگون الگوی زندگی بشر نیز تغییر یافته، افزایش طول عمر و افزایش نسبت سالمندان به جامعه جوان، تغییرات سبد و رژیم غذایی، الگوی استفاده از غذاهای فرآیند شده، زندگی ماشینی و کم تحرکی و... باعث گردیده تا انسان با کمبود برخی از ویتامین‌ها، املاح و دیگر ترکیبات ضروری که برای سلامت ارگان‌های مختلف بدن ضروری هستند مواجه گردد.

از طرف دیگر تحقیقات نشان داده است این کمبود و ضرورت تأمین نیاز از طریق فرآورده‌های خاص نه تنها برای سالمندان، بلکه برای گروه‌های دیگر از مردم نظیر کودکان، زنان در دوره‌های گوناگون زندگی، زنان باردار، زنان شیرده، بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن نیز ضرورت دارد. نیاز همواره خالق صنعت و اقتصاد است. این نیاز باعث گردیده تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را برای تأمین این گروه از فرآورده‌ها بکار گیرند. صنعت تولید و عرضه مکمل‌های رژیمی-غذایی عمر طولانی ندارد. درسال‌های نه چندان دور شرکت‌های داروسازی در کنار تولید محصولات دارویی خود برخی ویتامین‌ها و املاح را نیز تولید می‌کردند. با افزایش دانش و آگاهی متخصصان به کاربردهای متنوع ویتامین‌ها، املاح و ... برای ارتقای سلامت ارگان‌های بدن به مرور مکمل‌های رژیمی غذایی در دنیا گسترش یافت و جای پایی در اقتصاد سلامت برای خود جستجو نمود، بطوری‌که بیش از ده درصد صنعت دارو را به خود اختصاص داد. صنعت مکمل‌های رژیمی-غذایی در ایران نیز در دو دهه گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. در ابتدا توان و نیروی صاحبان سرمایه عمدتاً بر واردات متمرکز شد و بخش بزرگی از بازار کشور را شرکت‌های وارداتی تصاحب نمودند. اما از آنجا که صاحبان سرمایه در ایران همواره نگرش تولیدزایی داشتند دیری نپایید که شرکت‌های زیادی وارد عرصه تولید شدند. بازار مکمل‌های رژیمی-غذایی کشور که درسال‌های نه چندان دور (۱۵سال پیش) تقریبا تماما وابسته به واردات بود در کمتر از یک دهه تبدیل به صنعتی بزرگ در نظام سلامت ایران با رویکرد تولید محوری شد. اکنون بیش از ۳۰۰ شرکت تولیدی در داخل کشور تأمین نیاز مکمل‌های کشور را بعهده گرفته اند بطوری‌که هیچ نیازی به واردات احساس نمی‌شود. صنعت تولید مکمل‌های رژیمی-غذایی در ایران امروز تبدیل به یک صنعت پویا، رو به توسعه و افتخار آمیز گردیده است. در کتاب پیش رو مکمل‌های رژیمی-غذایی تولید داخل مطابق برگه راهنمای شرکت‌های تولید کننده معرفی شده تا راهنمای در دسترس برای همکاران پزشک، داروساز، متخصصان تغذیه و مصرف‌کنندگان باشد. تلاش خواهد شد این کتاب بطور مستمر روزآمد شده و آخرین تغییرات در آن اعمال گردد. لازم میدانم از گروه تدوینگر شامل مسئولان فنی شرکت‌های تولیدکننده، همکاران دبیرخانه سندیکا به‌خصوص سرکار خانم بان، دانشجویان داروسازی به شرح نام؛ محمدمهدی قاضی مرادی، پوریا فتحعلی پور، ترانه کاووسی، ساغر صدیق، طهور نیک‌بخت، علی وحدتی، مبین حمیدی، مهدی چوب‌فروش خوئی، یزدان مهرفیروزی، سپاسگزاری نمایم. امید که این آغاز سر آغازی مبارک و مستدام باشد.

دکتر عباس کبریایی‌زاده

رئیس هیأت مدیره سندیکا

شرکت داروسازی آبا داروطب





- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** Natures only/ Bio Basics Children
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آبا دارو طب
- **تولیدشده در:** شرکت پارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
کلسیم	۸۰ میلی‌گرم
منیزیم	۳۷/۵ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۱۰۰ واحد جهانی
ویتامین ای	۷/۴۵ واحد جهانی
ویتامین آ	۱۳۳۳ واحد جهانی
ویتامین ث	۳۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۰/۶ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۰/۶ میلی‌گرم
ویتامین ب۳	۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۵	۳ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۱۲	۰/۵ میکروگرم
بیوتین	۸ میکروگرم
فولیک اسید	۱۰۰ میکروگرم
فسفر	۴۰ میلی‌گرم
ید	۷۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مانیتول، ساکاروز، نشاسته، پوویدون، کاراگینان، روغن کرچک هیدروژنه، سوکرالوز، اریتروزین سوپرا، سدیم تروآت، ponceau ۴ R supra، مالتودکسترین، باتر اسکوچ، پودر سوربیتول، طعم‌دهنده وانیل، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش ایمنی، رشد و نمو و ارتقا سلامت عمومی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالاتر از ۳ سال: روزانه یک قرص مصرف شود. قرص جویدنی بوده و قبل از بلعیده شدن باید جویده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در صورت حساسیت به اجزای فراورده با پزشک مشورت شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروی دیگر با پزشک مشورت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** Bio Basics Men/ Natures only
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آبا دارو طب
- **تولیدشده در:** شرکت پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد جهانی
ویتامین ای	۲۷ واحد جهانی
ویتامین آ	۶۶۷ واحد جهانی
ویتامین کا۱	۷۵ میکروگرم
ویتامین ث	۸۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۱/۲ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۳	۱۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۵	۵ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱/۴ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم

جز	مقدار
ویتامین ب۱۲	۲/۴ میکروگرم
کلسیم	۲۰۰ میلی‌گرم
منیزیم	۵۶/۲۵ میلی‌گرم
زینک	۲۰ میلی‌گرم
آهن	۱۴ میلی‌گرم
منگنز	۲ میلی‌گرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۰۰ میکروگرم
کروم	۳۵ میکروگرم
مولیبدن	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نشاسته، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی‌اکسید، کراس‌کارملوز سدیم، هایپرملوز، تریاستین، اتیل سلولز، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، آهن اکسید قرمز، آهن اکسید سیاه
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تامین ریزمغذی‌ها روزانه مردان جهت ارتقا سلامت عمومی و عملکرد سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. با شکم خالی مصرف نشود. در صورت حساسیت به اجزای فراورده از مصرف آن خودداری فرمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد خون مثل وارفارین خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها با پزشک مشورت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان




- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** Bio Basics Women/ Natures only
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی آبا داروطب
- **تولیدشده در:** شرکت پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد جهانی
ویتامین ای	۲۷ واحد جهانی
ویتامین آ	۸۷۲ واحد جهانی
ویتامین کا۱	۷۵ میکروگرم
ویتامین ث	۸۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۳	۱۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۵	۵ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱/۴ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم

جز	مقدار
ویتامین ب۱۲	۲/۴ میکروگرم
کلسیم	۲۰۰ میلی‌گرم
منیزیم	۷۵ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
آهن	۱۴ میلی‌گرم
منگنز	۲ میلی‌گرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
کروم	۲۵ میکروگرم
مولیبدن	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نشاسته، کراس‌کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی‌اکساید، تریاستین، هایپرملوز، اتیل سلولز، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، آهن اکسید قرمز زرد
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمبود آهن و ویتامین‌ها، کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو قرص به همراه یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. با شکم خالی مصرف نشود. در صورت داشتن حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری فرمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت مصرف داروی ضدانعقاد خون مثل وارفارین زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارویی دیگر با پزشک مشورت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: بایونا من/ نیچرزاونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
بیوتین	۱۰ میلی‌گرم
زینک اکسید	۲۲/۵ میلی‌گرم زینک
کروم	۳۵ میکروگرم
سلنیوم	۶۵ میکروگرم
استیل سیستئین	۵۰ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، دی کلسیم فسفات، کراس‌کارملوز سدیم، پوویدون، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، منیزیم استئارات، هایپرومولوز، پلی اتیلن گلیکول، پلی سوربات، تری اتیل سیترات، اتیل سلولز، تیتانیوم دی‌اکسید، آهن اکسید زرد، آهن اکسید قرمز
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامتی و تقویت پوست و مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو قرص به همراه یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در صورت ابتلا به آسم، زخم‌های گوارشی و اختلالات انعقادی خون، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در افرادی که بر هر یک از اجزا این فرآورده حساسیت دارند منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوزهای بالا اسهال، استفراغ و سردرد، تهوع، درد شکمی و نفخ حساسیت پوستی می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای دیگر با پزشک داروساز خود مشورت فرمایید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: دینو /نیچرزاونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شـکل فـرآورده و تعداد در بسـته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیسـتر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
متیل کوبالامین	۱۵۰۰ میکروگرم
آلفا-لیپوئیک اسید	۱۰۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۳ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۱۰ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فرآورده (اکسـیپانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، کراس‌کارملـوز سـدیم، منیزیـم اسـتئارات، تالـک، کلوئیدالسـیلیکون دی‌اکسـاید، دی کلسـیم فسـفات، پوویـدون، اسـید اسـتئارات، هایپرملـوز، تریاسـیتین، اتیـل سـلولز، تیتانیـوم دی‌اکسـید، آهـن اکسـید قرمـز، اکسـید آهـن سـیاه
- **رده سنی:** -
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن ویتامین‌هـای گـروه ب، کمـک بـه بهبـود سـلامت و عملکـرد سیسـتم عصبـی، کمـک بـه کاهـش سـطح هوموسیسـتئین
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه یـک عـدد قـرص بـا غـذا و یـک لیـوان آب
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـرآورده یـک مکمـل اسـت و بـرای درمـان و تشـخیص و پیشـگیری اسـتفاده نشـود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صـورت داشـتن حساسـیت بـه اجـزای فـرآورده از مصـرف آن خـودداری فرماییـد.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** عارضـه جانبـی خاصـی گـزارش نشـده ا ست .
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** در صورتـی کـه هیپوگلیسـمی داریـد زیـر نظـر پزشـک مصـرف شـود. بـه دلیـل تداخـلات احتمالـی بـا سـایر داروهـا قبـل از مصـرف بـا پزشـک مشـورت شـود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیـر ۳۰ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود- دور از دسـترس کـودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سوپراکل دی/ نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
کلسیم سیترات	۱۰۰۰ میلی‌گرم معادل ۲۱۰/۷ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد جهانی
منیزیم هیدروکساید	۱۰۰ میلی‌گرم منیزیم المنتال
زینک سولفات	۴ میلی‌گرم روی المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت، متیل پارابن، پروپیل پارابن، میکروکریستالین سلولز
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان، کمک به درمان پوکی استخوان، مکمل تغذیه‌ای در بارداری و شیردهی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با غذا و یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در افراد مبتلا به آکلوریدریا با احتیاط مصرف شود. افرادی که هایپوپاراتیروئید هستند و مقادیر زیادی ویتامین د مصرف می‌کنند افزایش ریسک هایپر کلسمی و در افرادی که سنگ‌های کلیوی حاوی کلسیم دارند عموما توصیه می‌شود مکمل حاوی کلسیم مصرف ننمایند. در میاستنی گراویس از مصرف فرآورده باید پرهیز شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** بیماران دارای هایپرکلسمی، هایپرکلسیوری، هیپوفسفاتمی، سنگ کلیه، افزایش بیش از حد ویتامین د
- **عوارض جانبی احتمالی:** عارضه یبوست خفیف و گذرا، تهوع، درد شکم، هایپرکلسمی، سردرد، ضعف عضلانی، اختلال گوارشی در موارد نادر
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان با تتراسایکلین‌ها، کینولون‌ها و بیو فسفات‌ها سبب کاهش جذب کلسیم می‌شود. مصرف توام کلسیم با مدرهای تیازیدی ریسک ابتلا به هایپر کلسمی و آلکالوئیدوز متابولیک را افزایش می‌دهد. مصرف کلسیم و آلندوریت برای درمان پوکی استخوان ممکن است تداخل ایجاد کند. مصرف همزمان کلسیم با آنتی‌اسیدهای حاوی آلمینیوم مقدار جذا آلمینیوم در خون را افزایش می‌دهد. فوروزماید و بومتانید سطح کلسیم در کلسیم را کاهش داده و مصرف کلسیم با جنتامایسین ممکن است خطر سمیت کلیوی را افزایش دهد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سوپراکل کا۲/ نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
کلسیم سیترات	۱۰۰۰ میلی‌گرم معادل ۲۱۰/۷۶ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین کا۲	۴۵ میکروگرم
ویتامین د۳	۲۰۰ واحد جهانی
زینک سولفات	۴ میلی‌گرم روی المنتال
منیزیم هیدروکسید	۱۰۰ میلی‌گرم منیزیم المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، سدیم لوریل سولفات، کلوئیدال سیلیکون دی‌اکساید، میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، هیدروکسی متیل سلولز، تیتانیوم دی‌اکساید، پروپیلن گلیکول و تالک
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان، پوکی استخوان، نرمی استخوان و پوکی استخوان ناشی از استروئیدها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو عدد قرص با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در افرادی که کم کاری پاراتیروئید دارند و ویتامین د مصرف می‌کنند ریسک افزایش بیش از حد کلسیم در خون و ادرار وجود دارد. در افرادی که سابقه سنگ کلیوی دارند با احتیاط مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف در دوران بارداری مجاز است.
- **موارد منع مصرف:** در افرادی که میزان کلسیم بالایی در ادرار دارند، در افراد دارای سنگ کلیه، میزان بالایی ویتامین د و فسفات در خون، بیماران مبتلا به مشکلات انعقادی خون
- **عوارض جانبی احتمالی:** در موارد نادر یبوست، نفخ شکمی، تهوع، درد شکم، اسهال، خارش، جوش و کهیر، هایپرکلسمی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** تتراسایکلین‌ها ممکن است در جذبشان تاثیر داشته باشد. مصرف همزمان با کورتیکو تستروئیدهای سیستمتیک ممکن است باعث کاهش جذب کلسیم شود. مدرهای تیازیدی ممکن است سبب افزایش دفع ادراری کلسیم شوند. مصرف همزمان با رزین‌های تبادل یونی ممکن است باعث کاهش جذب ویتامین دی شود. افزایش بیش از حد کلسیم می‌تواند باعث افزایش سمیت گلیکوزیدهای قلبی در زمان مصرف شود. بیس فسفونات‌ها یا فلوراید سدیم باید ۳ ساعت قبل از کلسیم مصرف شود. مصرف بیش از حد می‌تواند منجر به افزایش بیش از حد کلسیم شود. در مصرف همزمان با وافارین باعث کاهش تاثیرات وافارین میشود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سوپراکل/نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
کلسیم سیترات	۱۰۰۰ میلی‌گرم معادل ۲۱۰/۷۷ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین د۳	۲۰۰ واحد جهانی
منیزیم هیدروکسید	۱۰۰ میلی‌گرم منیزیم المنتال
زینک سولفات	۵ میلی‌گرم روی المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم استارچ گلیکولات، پوویدون، منیزیم استئارات، متیل پارابن، پروپیل پارابن، کراس کارملوز، تیتانیوم دی اکسید، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت و تقویت استخوان‌ها، به عنوان مکمل در بارداری و شیردهی، پوکی استخوان ناشی از یائسگی، پوکی استخوان در آقایان مسن، رشد کودکان و نوجوانان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک یا دو عدد قرص با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در افراد مبتلا به سنگ کلیه، سندروم شیر قلیا، میاستنی گراویس، آکلریدریا، نارسایی کلیوی و پانکراس و افرادی که سطح فسفات خون کمی دارند قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ممصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی ایمن است لطفا زیر نظر پزشک مصرف نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در افراد مبتلا به هایپرکلسمی، سمیت با ویتامین د، بیماری سارکوئیدوزیس، بیماری بدخیم استخوان میلوما، متاستاز استخوان، وجود مقادیر زیاد کلسیم در ادرار یا سنگ کلیوی، نارسایی کلیوی، مصرف بیش از حد ویتامین د
- **عوارض جانبی احتمالی:** فقط عوارض خفیفی در حد عوارض گوارشی مانند تهوع دارد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** کلسیم با جذب آنتی‌بیوتیک‌های کینولونی مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، اوفلوکساسین و تتراسایکلین، مینوسایکلین و تترا سایکلین تداخل دارد. کلسیم ممکن است در جذب آلندرونیت که در درمان استئوپورز بکار میرود اختلال ایجاد نماید.
مصرف همزمان با مشتقات اسیدهای صفراوی مانند کلستیرامین، کلستیپول و کولسولام که در درمان کلسترول بالا به کار می‌رود. این داروها در جذب کلسیم اختلال ایجاد نموده و باعث کاهش کلسیم در ادرار می‌شود. در صورت مصرف این داروها باید از مکمل‌های کلسیم و ویتامین D استفاده کرد. مصرف مقادیر زیاد کلسیم ممکن است باعث افزایش خطر سمیت با دیگوکسین شود.
مدرهای تیازیدی مانند هیدوکلرتیازید باعث افزایش غلظت کلسیم در خون می‌شود.
لوپ دیورتیک‌ها مانند فوروزماید و بومتانید باعث کاهش غلظت کلسیم می‌شود.
مصرف همزمان کلسیم با جنتامایسین باعث افزایش خطرات سمیت کلیوی با این دارو می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: کارتیژن دی مکس / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
گلوکزآمین سولفات	۱۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۲۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکرو کریستالین سلولز، پوویدون، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هایپرملوز، دی اتیل فتالات، اتیل سلولز، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، اکسید آهن قرمز، اکسید آهن سیاه
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تسکین علائم استئو آرتریت خفیف تا متوسط
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. بیمارانی که به صدف حلزون و میگو و سایر ترکیبات این قرص حساسیت دارند. در بیمارانی که مشکلات حاد کبدی و کلیوی دارند. ایمنی و تاثیر این فرآورده در کودکان ثابت نشده است بنابراین مصرف آن در کودکان توصیه نمی‌شود. زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** ناراحتی‌های گوارشی، سردرد و استفراغ
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** ممکن است با داروهای ضد انعقاد خون تداخل داشته باشد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: کارتیژن رز / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
گلوکز آمین سولفات	۷۵۰ میلی‌گرم
عصاره گل رز	۴۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی اتیلن گلیکول، پوودیون، کراس‌کارملوز سدیم، میکروکریستالین سلولز، اتیل سلولز، تالک، منیزیم استئارات، هاپیرملوز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی‌اکسید، آهن اکسید قرمز، آهن اکسید سیاه
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مفاصل، التهاب و سختی مفاصل ناشی از استئوآرتریت، محدودیت حرکتی ناشی از اوستئوآرتریت، آرتریت روماتویید، درد مفصل، درد کمر
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک قرص دوبار در روز بعد از غذا با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان، تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در افراد دیابتی زیر نظر پزشک مصرف شود. در افرادی که سرطان، بیماری‌های کبدی، کلسترول، تری‌گلیسرید بالا، آسم و سایر اختلالات تنفسی را دارند زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به صدف حلزون این فراورده زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** ناراحتی گوارشی، خواب‌آلودگی، سردرد، بی‌خوابی، در دوز بالاتر یبوست، اسهال، استفراغ، سوزش سردل، کاهش اشتها شود، در موارد نادر ترکیب کندرویتین و گلوکزآمین سبب افزایش فشار خون و تپش قلب می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین می‌تواند ریسک خون‌ریزی را زیاد کند.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: کارتیژن فورت / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
گلوکزآمین سولفات پتاسیم کلراید	۷۵۰ میلی‌گرم که معادل ۵۶۳ میلی‌گرم گلوکزآمین سولفات است
کندرویتین سولفات	۱۰۰ میلی‌گرم
متیل سولفونیل متان	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۲۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین ث	۳۰ میلی‌گرم
ویتامین ای	۱۲/۵ میلی‌گرم
سدیم سلنیت	۷۰ میکروگرم سلنیوم
زینک سولفات مونوهیدرات	۴ میلی‌گرم زینک
منگنز سولفات	۳ میلی‌گرم منگنز
کرومیوم پیکولینات	۵۰ میکروگرم کروم
مس سولفات پنتاهیدرات	۰/۵ میلی‌گرم مس
سدیم بورات	۰/۵ میلی‌گرم بور
سیلیکون	۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پوویدون، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، استئاریک اسید، کلوئیدول سیلیکون دی اکساید، گلیسرول، هیدروکسی پروپیل سلولز، اکسید آهن قرمز
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود التهاب مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو عدد قرص همراه یا بدون غذا
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود.

در صورتی که تاکنون هرگونه حساسیت جوش یا هر علامت دیگری در برابر هر کدام از مواد متشکله قرص را داشته‌اید از مصرف این فرآورده خودداری کنید. تاثیر و ایمنی این محصول در کودکان ارزیابی نشده است در نتیجه از مصرف گلوکزامین در کودکان اجتناب کنید. در بیماران با بیماری‌های کبدی و کلیوی جدی زیر نظر پزشک مصرف شود.


- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف آن در بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** ناراحتی‌های گوارش، خواب آلودگی، سردرد، بدخوابی و عوارض گوارشی موقت متوسط مثل دل درد، کم‌اشتهایی، تهوع، سوزش سردل، یبوست، اسهال و استفراغ
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** ممکن است گلوکزامین با ضدانعقادهای خوراکی تداخل داشته باشد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: کارتیژن مکس / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
گلوکزآمین سولفات پتاسیم کلراید	۱۵۰۰ میلی‌گرم معادل ۱۱۲۶ میلی‌گرم گلوکزآمین سولفات

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پوویدون، کراس‌کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل‌متیل سلولز، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک، هیدروکسی پروپیل سلولز، پلی اتیلن گلیکول، روکش
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مفاصل، استئوآرتریت درجه یک
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق تجویز پزشک با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان، تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. اگر بیماری مفصلی دیگری دارید با پزشک مشورت شود شاید درمان دارویی دیگری لازم باشد. در بیماران دیابتی زیر نظر پزشک مصرف شود. اگر داروی دیگری مصرف می‌شود با پزشک مطرح شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به صدف یا غذاهای دریایی و هر کدام یک از اجزای فراورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** درد شکمی، ناراحتی گوارشی، سوءهاضمه، یبوست، اسهال، تهوع، سردرد، خارش، قرمزی پوست، خستگی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین سبب افزایش ریسک خونریزی می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** یک قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: گلوکواستار / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
گلوکزآمین سولفات	۶۰۰ میلی‌گرم
کندرویتین	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره زنجبیل	۱۰۰ میلی‌گرم
سلنیوم	۳۰ میکروگرم
زینک	۴ میلی‌گرم
منگنز	۲/۵ میلی‌گرم
کروم	۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۱۰۰ میکروگرم
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد جهانی
ویتامین ای	۲۹/۸ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، کراس‌کارملوز سدیم، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، منیزیم استئارات، پوویدون، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک، ریبوفلاوین، گلیسرول، شلاک
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی دو بار هر بار یک عدد قرص بعد از غذا با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان، تشخیص و پیشگیری استفاده نشود.
برای اطمینان از عدم بروز اثرات جانبی و تداخلات دارویی با پزشک خود مشورت فرمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورتی‌که به صدف حلزون و سایر ترکیبات فراورده حساسیت دارید با پزشک مشورت کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض گوارشی، خواب‌الودگی، سردرد، بی‌خوابی، مشکلات هاضمه مثل درد شکمی، کاهش اشتها، تهوع، سوزش سردل، یبوست، اسهال، استفراغ در دوز بالا
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با داروهای ضدانعقاد مثل وارفارین ریسک خون‌ریزی را افزایش می‌دهد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: لاکتول / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد ساشه حاوی پودر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
لاکتوباسیلوس اسپوروژنز	۱۰ میلی‌گرم
فروکتوالیگوساکارید	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مانیتول، مالتودکسترین، آسپارتام، طعم وانیلی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود هضم و ایمنی، کمک به رفع علائم ناشی از اسهال، یبوست، کمک به کاهش اسهال آنتی‌بیوتیکی یا عفونی، اسهال مسافرتی، کمک در کاهش علائم IBS
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو الی چهار عدد ساشه مستقیما در دهان ریخته شود و بدون نیاز به آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در هنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها فاصله حداقل ۲ ساعت رعایت شود. در افراد مبتلا به نقص ایمنی
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ایمنی آن در دوران بارداری ثابت نشده است.
- **موارد منع مصرف:** در افرادی که به اجزای فراورده حساسیت دارند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عمدتا عارضه خاصی ندارد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در افرادی که داروهای مهارکننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند مثل سیکلوسپورین، تاکرولیموس، آزاتیوپورین و داروهای ضدسرطان، مصرف همزمان سبب عوارض گوارشی می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان




- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: مگترا / نیچرز اونلی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آبا دارو طب**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد ساشه حاوی پودر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
منیزیم اکسید	۳۰۰ میلی‌گرم منیزیم المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم سیترات، سیتریک اسید، زایلیتول، سوکرالوز، سوربیتول، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک ساشه را مستقیما در دهان ریخته شود بدون نیاز به آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان، تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در صورت ابتلا به دیابت، وابستگی به الکل، بیماری کبدی و کلیوی و فنیل کتونوری با پزشک مشورت شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن حساسیت به هر یک از اجزای فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشکلات گوارشی، اسهال، افزایش منیزیم در خون، سندروم شیر، قلیا، افزایش بیش از حد اسید معده، در صورت داشتن عوارض حساسیتی به پزشک مراجعه شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با داروهایی مثل سدیم سلولز فسفات، دیگوکسین و سدیم استایرن پلی سولفونات تداخل دارد. با داروهای ضدویروس مثل دولوتگراویر و رالاتگراویر مصرف نشود. با داروهای مثل تتراسایکلین‌ها و کینولون‌ها مثل سیپروفلوکساسین و داروهای تیروئید و بیس فسفونات‌ها، منیزیم سبب کاهش جذب آن‌ها می‌شود. با داروهای ضداسید حاوی منیزیم و ترکیبات گیاهی زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان

abian
DAROU

شرکت داروسازی ابیان دارو





- **نام فرآورده: قرص ACTiAID**
- **نام تجاری/ برند: ACTiAID®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت ابیان دارو/ داروسازی ریحانه اصفهان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۴ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
Vitamin A (acetate)	IU ۵۰۰۰
Vitamin D۳	IU ۶۰۰
Vitamin E (acetate)	IU ۱۵۰
Vitamin C	mg ۲۵۰
Vitamin B۱ (Thiamin HCl)	mg ۱۲
Vitamin B۲ (Riboflavin)	mg ۵
Vitamin B۳	mg ۲۰
Vitamin B۵ (Calcium D-pantothenate)	mg ۱۰
Vitamin B۶ (Pyridoxine HCl)	mg ۱۰
Vitamin B۱۲	mcg ۲۵
Biotin	mcg ۱۵۰
Folic acid	mcg ۵۰۰

جز	مقدار در هر دو قرص
Zinc (as Zinc oxide)	mg ۳۰
Magnesium (as Magnesium oxide)	mg ۶۰
Copper (as Copper sulfate)	mg ۱
Manganese (as Manganese sulfate)	mg ۲
Chromium (as Chromium chloride)	mcg ۵۰
Selenium (as Selenium selenite)	mcg ۱۰۰
Lycopene	mg ۴
Coenzyme Q10	mg ۷۵
Glutathione	mg ۲/۵
Inositol	mg ۴۰
N-acetyl-L-Cysteine	mg ۵۰
L-Arginine	mg ۹۵
Panax ginseng	g ۳۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sodium metabisulfite, Colloidal silicon dioxide, Sodium croscarmellose, Magnesium Stearate, ,Microcrystalline cellulose PH۱۰۲ Calcium hydrogen phosphate anhydrous, Maltodextrin, Opadry (Green) AMB II.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت قوای جنسی و بهبود فرآیند باروری در آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود. قرص را کامل ببلعید و از شکستن و جویدن قرص بپرهیزید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری ازبیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هرکدام از ترکیبات موجود در این فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید.
مصرف این فرآورده در افرادی که داروی وارفارین دریافت می‌کنند، افراد با سابقه اختلالات تیروئیدی، فشار خون بالا، دیابتیک با احتیاط انجام شود.
مصرف این فرآورده را زمانی که جراحی دارید از ۲ هفته قبل قطع کنید.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده ها/داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
این فرآورده را با معده خالی مصرف نکنید.
قرص را کامل ببلعید و از شکستن و جویدن قرص بپرهیزید.

- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت مصرف مکمل‌های حاوی مولتی ویتامین مینرال شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می‌باشد. علائم آلرژی به هریک از اجزای فرآورده شامل کهیر، تنفس دشوار، تورم صورت، لب، زبان و گلو است که در صورت مشاهده، باید مصرف مکمل را قطع کرده و با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون (شامل هپارین، وارفارین) و داروهای ضد پلاکت خون (شامل آسپرین)، داروهای ضد فشار خون، آتورواستاتین، ترتینوئین و ایزوترتینوئین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (شامل ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، ایندومتاسین و ملوکسیکام) با احتیاط و طبق نظر پزشک انجام شود.
مصرف همزمان این فرآورده با سایر مکمل‌های حاوی ویتامین A،D،E توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص ACTiCOUNT**
- **نام تجاری/ برند: ACTiCOUNT®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت ابیان دارو/ داروسازی ریحانه اصفهان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
Vitamin C	mg ۵۰۰
Vitamin B۲	mg ۱۰
Vitamin B۳	mg ۲۵
Vitamin B۱۲	mcg ۵۰۰
Maca extract	mg ۲۰۰
Withania somnifera (Ashwagandaha)	mg ۲۰۰
Panax ginseng	mg ۱۵۰
CoQ۱۰	mg ۱۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Microcrystalline cellulose, Calcium phosphate anhydrous, Maltodextrin, Aerosil, MgS, Croscarmellose.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تقویت عملکرد جنسی و بهبود فرایند باروری در آقایان، افزایش تعداد اسپرم
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
توصیه می‌شود مصرف این محصول در افراد مبتلا به فشار خون بالا، نارسایی کبدی، بیماری‌های قلبی- عروقی، اختلالات انعقاد خون، اختلالات خونریزی‌دهنده و یا انجام همزمان شیمی‌درمانی و رادیوتراپی با احتیاط صورت گیرد.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌ها این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند اسهال، تهوع، اختلالات فشار خون و افزایش ضربان قلب گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.
از مصرف همزمان مکمل اکتی کانت با داروهای سرکوب‌کننده‌ی سیستم ایمنی (مایکوفنولات، تاکرولیموس، کورتیکواستروئیدها)، داروهای خواب‌آور (کلونازپام، لورازپام، زولپیدم)، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (سلکوکسیب، دیکلوفناک، مفنامیک‌اسید، ناپروکسن)، داروهای ترومبولیتیک (آلتپلاز)، داروهای ضد پلاکت خون (آسپرین)، داروهای ضد انعقاد خون (هپارین، وارفارین)، شلاتورهای آهن (دفراسیروکس، دفروکسامین) و ویتامین K۱ خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص ACTiDERM**
- **نام تجاری/ برند: ACTiDERM®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت ابیان دارو/ داروسازی ریحانه اصفهان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Zinc sulfate	۲۷/۴۵ mg (Ele mental zinc: ۱۰ mg)
Vitamin B۶	mg ۵
Pantothenic acid	mg ۹/۷۸
Biotin	mg ۰/۵
L-cysteine	mg ۱۰۰
L-methionine	mg ۲۰۰
Brewer's yeast	mg ۲۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Aquapolish
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن‌ها/ کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این مکمل در افراد مبتلا به سیروز کبدی، خانم‌های باردار و شیرده باید با احتیاط صورت گیرد.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف محصول را قطع و با پزشک خود مشورت نمایید.
این فراورده مکمل تغذیه‌ای است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌های تغذیه‌ای این محصول هم می‌تواند در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند سردرد، سرگیجه و یا اسهال شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف همزمان مکمل اکتی‌درم با داروهای ضد افسردگی MAOIs (سلژیلین، ایزوکربوکسازید، فنلزین، ترانیل سیپرومین)، آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین‌ها مانند مینوسایکلین، داکسی سایکلین)، و بیس فسفونات‌ها (آلندرونیت، اتیدرونات، رزیدرونات) خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiFOL
- **نام تجاری/ برند:** ACTiFOL®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** شرکت فاران شیمی/ ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص/ ۳ بلیستر ۲۰ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin D۳ (as Cholecalciferol)	۸۰۰ IU
Vitamin B۱۲	۲/۶ mcg
Folate (as L-Methylfolate Calcium)	۶۰۰ mcg
Vitamin B۲	۱/۴ mg
IODINE (as Potassium Iodide)	۱۵۰ mcg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCL)	۱/۹ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium phosphate,Colloidal Silicon dioxide, Starch, Croscarmellose, Magnesium stearate, Opadry
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین ید و فولیک اسید مورد نیاز بدن بانوان/ کمک به حفظ سلامت مادر و جنین/ حاوی فرم فعال فولات (کلسیم ال متیل فولات) با جذب بالاتر جهت کمک به رشد و نمو سیستم عصبی جنین و جلوگیری از عارضه نقص لوله عصبی جنین/ حاوی ویتامین‌های B۲, B۶, B۱۲ و D جهت کمک به رشد و نمو جنین
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص بلافاصله پس از وعده غذایی اصلی با یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مردان، زنان باردار و شیرده باید قبل از مصرف این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت کنند.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری زمینه‌ای قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزاء این محصول، از مصرف فرآورده اجتناب گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌های تغذیه‌ای این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند ناراحتی گوارشی، تهوع، استفراغ، دل‌درد و سردرد شود. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف این فرآورده را قطع و با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از مصرف هرداروی دیگری با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. اکتی‌فول را با داروهای ضد صرع (مانند فنی‌توئین)، باربیتورات‌ها (مانند فنوباربیتال)، داروهای ضدسرطان (مانند فلوراوراسیل، متوترکسات، کپسیتابین) و لوودوپا مصرف نکنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiIMMUNE
- **نام تجاری/ برند:** ACTiIMMUNE®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی ریحانه اصفهان/ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص/ ۴ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۱۰۰۰ IU
Vitamin C	۳۰۰ mg
Vitamin E	۱۰۰ IU
Vitamin B۱	۵۰ mg
Vitamin B۲	۶ mg
Vitamin B۳	۲۷ mg
Vitamin B۶	۱۰ mg
Vitamin D۳	۱۰۰۰ IU
Pantothenic acid	۲۰ mg
Magnesium	۱۰۰ mg

جز	مقدار در هر قرص
Copper	۰/۵ mg
Chromium	۱۰۰ mcg
Selenium	۱۸۰ mcg
Zinc	۱۵ mg
Citrus bioflavonoids	۳۰ mg
Choline bitartrate	۱۰ mg
Elderbery extract	۱۰۰ mg
Ginger root extract	۱۲۵ mg
Echinacea root extract	۲۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Croscarmellose, Colloidal Silicon dioxide, MgS, Microcrystalline cellulose، Dicalcium phosphate dihydrate, Maltodextrin
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی/ تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن/ آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
توصیه می‌شود مصرف این مکمل در افراد مبتلا به بیماری‌های خود ایمنی، افراد گیرنده عضو پیوندی و همچنین خانم‌های باردار یا شیرده با احتیاط صورت گیرد.
از مصرف مکمل اکتی‌ایمیون بلافاصله قبل و یا بعد از عمل آنژیوپلاستی قلب خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها، مکمل‌ها و فراورده‌های گیاهی قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف همزمان مکمل اکتی‌ایمیون با داروهای شیمی‌درمانی، داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی، داروهای ضد انعقاد خون (هپارین، وارفارین)، داروهای ضد پلاکت (آسپرین)، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (سلکوکسیب، دیکلوفناک) و ویتامین k1 خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiIRON
- **نام تجاری/ برند:** ACTiIRON®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی ریحانه اصفهان/ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۸۰۰ IU
Beta Carotene	۲/۷ mg
Vitamin C	۱۰۰ mg
Vitamin E	۲۸ IU
Vitamin B۱	۳/۸۵ mg
Vitamin B۲	۳/۸۵ mg
Vitamin B۳	۱۴ mg
Vitamin B۶	۵ mg
Vitamin B۱۲	۲۰ mcg
Folic acid	۸۰۰ mcg
Vitamin D۳	۸۰۰ IU
Biotin (as D-Biotin)	۱۵۰ mcg
Pantothenic acid	۶ mg

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin K۱	۲۰ mcg
Iodine	۱۵۰ mcg
Iron	۳۰ mg
Magnesium	۱۰۰ mg
Copper	۱ mg
Manganese	۵ mg
Chromium	۱۰۰ mcg
Selenium	۱۰۰ mcg
Zinc	۸ mg
Green Tea	۵۰ mg
PABA	۳۰ mg
L-Carnitine	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Maltodextrin, Croscarmellose, Dibasic calcium phosphate, PVPK3 ,Colloidal siicon dioxide, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف این مکمل در خانم‌های باردار و یا شیرده باید تحت نظر پزشک صورت گیرد. در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی، حساسیت غذایی و یا حساسیت به هریک از مواد اولیه موجود در این محصول، با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌های تغذیه‌ای این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند اسهال، یبوست، تهوع و نفخ شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف همزمان مکمل اکتی‌آیرون با آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین‌ها مانند داکسی‌سایکلین، مینوسایکلین)، داروهای ضد پارکینسون (مانند لوودوپا) و داروهای مربوط به بیماری‌های تیروئیدی (لووتیروکسین)، خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص ACTiLITY**
- **نام تجاری/ برند: ACTiLITY®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی ریحانه اصفهان/ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۴ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
Vitamin B۵	۲۰ mg
Vitamin B۶ (Pyridoxal -۵phosphate)	۵ mg
Vitamin B۶ (Pyridoxine HCL)	۵ mg
Vitamin B۱۲	۵۰۰ mcg
Vitamin C	۱۵۰ mg
Selenium	۱۴۰ mcg
N-Acetyl-L-Cysteine	۲۰۰ mg
CoQ۱۰	۳۰ mg
L-Carnitine	۱۰۰۰ mg
L-Arginine	۲۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):** Sodium Metabisulfite, Colloidal silicon dioxide, Sodium croscarmellose, Microcrystalline cellulose PH102 Magnesium Stearate, Calcium hydrogen phosphate (anhydrous, Opadry (Light Blue
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت قوای جنسی در آقایان، کمک به افزایش تحرک اسپرم
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۳ عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود. قرص را کامل ببلعید و از شکستن و جویدن قرص بپرهیزید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به هر کدام از ترکیبات موجود در این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمائید.
مصرف این فرآورده در افرادی که داروی وارفارین دریافت می‌کنند، افراد با سابقه اختلالات تیروئیدی، صرع، فشار خون بالا، نارسایی کلیوی و تحت درمان با داروهای شیمی‌درمانی با احتیاط انجام شود.
مصرف این فراورده از دو هفته قبل جراحی قطع گردد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.
این محصول را با معده خالی مصرف ننمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی شایع در صورت مصرف مکمل‌های حاوی مولتی‌ویتامین مینرال شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می‌باشد. علائم آلرژی به هر یک از اجزای فرآورده شامل کهیر، تنفس دشوار، تورم صورت لب، زبان و گلو می‌باشد که در صورت مشاهده ضروریست مصرف فرآورده را قطع کنید و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فرآورده با انسولین، داروهای کاهنده کلسترول، داروهای ضد سرطان، داروهای ضد فشار خون با احتیاط و طبق نظر پزشک صورت گیرد. مصرف همزمان این مکمل با نیتراتها شامل نیتروگلیسرین، ایزوسورباید مونونیترات و نیترو پروساید به دلیل تشدید اثرات این داروها توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiMAN
- **نام تجاری/ برند:** ACTiMAN®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی ریحانه اصفهان/ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۲قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۱۰۰۰ IU
Beta Carotene	۲/۷ mg
Vitamin C	۱۲۰ mg
Vitamin E	۴۰ IU
Vitamin B۱	۴/۲ mg
Vitamin B۲	۴/۶ mg
Vitamin B۳	۱۶ mg
Vitamin B۶	۵/۵ mg
Vitamin B۱۲	۲۰ mcg
Vitamin D۳	۸۰۰ IU
Vitamin K۱	۲۵ mcg
Folic acid	۴۰۰ mcg
Biotin (as D-Biotin)	۵۰ mcg
Pantothenic acid	۱۲/۵ mg
Iodine	۱۵۰ mcg
Iron	۶ mg

جز	مقدار در هر قرص
Magnesium	۸۴ mg
Copper	۱ mg
Manganese	۵/۵ mg
Chromium	۰/۱ mg
Selenium	۱۵۰ mcg
Zinc	۱۱ mg
PABA	۲۰ mg
L-Arginine	۵۰ mg
L-Carnitine	۱۰ mg
CoQ ۱۰	۵ mg
Lutein	۱ mg
Lycopene	۰/۶ mg
Ginseng	۵ mg
Resveratrol	۲۵ mg
Taurine	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف این محصول در افراد دچار نارسایی کلیوی و مبتلا به سیروز کبدی باید با احتیاط صورت گیرد. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌ها این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند درد شکم یا اسهال شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خون (مانند وارفارین)، ضد پلاکت خون (مانند آسپرین) و نیتراتها (مانند نیتروگلیسیرین) خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiNATAL
- **نام تجاری/ برند:** ACTiNATAL®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی ریحانه اصفهان/ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۴۰۰ IU
Vitamin C	۱۲۰ mg
Vitamin E	۳۰ IU
Vitamin B۱	۱/۴ mg
Vitamin B۲	۱/۴ mg
Vitamin B۳	۱۸ mg
Vitamin B۶	۵ mg
Vitamin B۱۲	۲/۶ mcg
Vitamin D۳	۶۰۰ IU
Vitamin K۱	۴۵ mcg
Folic acid	۸۰۰ mcg
Biotin (as D-Biotin)	۵۰ mcg

جز	مقدار در هر قرص
Pantothenic acid	۶ mg
Calcium	۱۸۰ mg
Iodine	۲۲۰ mcg
Iron	۲۷ mg
Magnesium	۴۵ mg
Copper	۰/۹ mg
Manganese	۲ mg
Chromium	۳۰ mcg
Molybdenum	۵۰ mcg
Selenium	۶۰ mcg
Zinc	۷/۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Croscarmellose, Silicon dioxide, MgS, Microcrystalline
- **رده سنی:** خانم‌ها در دوران بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادران در دوران بارداری و شیردهی، کمک به رشد و تکامل جنین
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف این مکمل در خانم‌های باردار یا شیرده باید تحت نظر پزشک صورت گیرد. در صورت حساسیت غذایی و یا حساسیت به هر یک از مواد اولیه موجود در این محصول، با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌های تغذیه‌ای این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز برخی عوارض جانبی گردد. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی مصرف مکمل را قطع و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف همزمان با آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین، جمی‌فلوکساسین، لووفلوکساسین و تتراسایکلین‌ها مانند داکسی‌سایکلین، مینوسایکلین) و داروی ترومبوپگ خودداری کنید .
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص ACTiNATAL+**
- **نام تجاری/ برند: ACTiNATAL+®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص و سافت ژل/ ۵ بلیستر ۱۲ عددی در هر جعبه، هر بلیستر شامل ۶ عدد قرص و ۶ عدد سافت‌ژل**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۴۰۰ IU
Vitamin C	۱۲۰ mg
Vitamin E	۳۰ IU
Vitamin B۱	۱/۴ mg
Vitamin B۲	۱/۴ mg
Vitamin B۳	۱۸ mg
Vitamin B۶	۵ mg
Vitamin B۱۲	۲/۶ mcg
Vitamin D۳	۶۰۰ IU
Vitamin K۱	۴۵ mcg
Folic acid	۸۰۰ mcg
Biotin	۵۰ mcg
Pantothenic acid	۶ mg
Calcium	۱۸۰ mg

جز	مقدار در هر قرص
Iodine	۲۲۰ mcg
Iron	۲۷ mg
Magnesium	۴۵ mg
Copper	۰/۹ mg
Manganese	۲ mg
Chromium	۳۰ mcg
Molybdenum	۵۰ mcg
Selenium	۶۰ mcg
Zinc	۷/۵ mg
Average Valuse Per Softgel	
Omega ۳ fatty acids	
EPA	۶۰ mg
DHA	۲۸۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** TBHQ, Glycerin, Methylparaben, Gelatin, Colloidal silicon dioxide, Sodium croscarmellose, Microcrystalline cellulose PH102 ,Magnesium Stearate, Opadry
- **رده سنی:** قابل مصرف در دوران پیش از بارداری/ حین بارداری/ پس از بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز خانم‌ها در دوران قبل از بارداری، در طول بارداری و پس از آن کمک به رشد و تکامل جنین، حاوی DHA جهت کمک به رشد و تکامل طبیعی مغز و چشم جنین
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص مولتی‌ویتامین به‌همراه یک عدد سافت‌ژل امگا ۳ همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود. قرص و سافت ژل را کامل ببلعید و از شکستن و یا خردکردن آن بپرهیزید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف همزمان این فرآورده با شیر و یا سایر فرآورده‌های لبنی، مکمل‌های حاوی کلسیم و یا آنتی‌اسیدهای حاوی کلسیم و نیز سایر مکمل‌های حاوی ویتامین A,D,E,K توصیه نمی‌شود.
در صورت نیاز به مصرف بیش از مقدار توصیه شده در روز حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
در صورت حساسیت به هرکدام از ترکیبات موجود در فرآورده، از مصرف آن خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی شایع در صورت مصرف مکمل‌های حاوی مولتی‌ویتامین مینرال شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می‌باشد. علائم آلرژی به هر یک از اجزای فرآورده شامل کهیر، تنفس دشوار، تورم صورت لب، زبان و گلو می‌باشد که در صورت مشاهده ضروریست مصرف فرآورده را قطع کنید و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف فرآورده‌های حاوی امگا۳ در افرادی که داروهای ضدانعقاد خون و پلاکت خون مصرف می‌کنند و یا مستعد خونریزی هستند توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده:** قرص ACTiWOMAN
- **نام تجاری/ برند:** ACTiWOMAN®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان دارو
- **تولیدشده در:** ابیان دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۱۰۰۰ IU
Beta Carotene	۱/۸ mg
Vitamin C	۱۰۰ mg
Vitamin E	۲۸ IU
Vitamin B۱	۳/۸۵ mg
Vitamin B۲	۳/۸۵ mg
Vitamin B۳	۱۴ mg
Vitamin B۶	۵ mg
Vitamin B۱۲	۲۰ mcg
Vitamin D۳	۸۰۰ IU
Vitamin K۱	۲۰ mcg
Folic acid	۶۰۰ mcg
Biotin (as D-Biotin)	۱۵۰ mcg
Pantothenic acid	۱۱ mg
Iodine	۱۵۰ mcg
Iron	۷/۵ mg

جز	مقدار در هر قرص
Magnesium	۶۴ mg
Copper	۰/۹ mg
Manganese	۵ mg
Chromium	۱۰۰ mcg
Selenium	۱۰۰ mcg
Zinc	۸ mg
CoQ ۱۰	۵ mg
L-Lysine	۲۰ mg
L-Cysteine	۹۲ mg
L-Methionine	۵۰ mg
Panax Ginseng	۴۰ mg
Green Tea Extract	۳۰ mg
PABA	۲۰ mg
Lutein	۱ mg
Lycopene	۰/۶ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Croscarmellose, Silicon dioxide, MgS, Microcrystalline cellulose
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز خانم‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف این مکمل در خانم‌های باردار یا شیرده باید با احتیاط صورت گیرد. در صورت حساسیت غذایی و یا حساسیت به هر یک از مواد اولیه موجود در این محصول، با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌های تغذیه‌ای ممکن است در بعضی از افراد باعث نفخ، اسهال یا تهوع شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خون (مانند وارفارین) و ضد التهاب غیر استروئیدی (مانند دیکلوفناک) خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص UNiBONE BLEND**
- **نام تجاری/ برند: UNiBONE BLEND®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۴ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Calcium Blend (Carbonate & Citrate)	۱۱۵۰ mg
Vitamin D۳	۵۰۰ IU
Magnesium oxide	۱۵۰ mg (Elemental: ۹۰ mg)
Zinc sulfate	۲۰ mg (Elemental: ۷/۳ mg)
Vitamin K	۶۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, PEG400, PEG4000, Titanium Dioxide, HPMC, PVPK 30
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت سلامت استخوان‌ها و مفاصل
کمک به تقویت رشد استخوان ها و مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود. قرص را کامل ببلعید و از شکستن و جویدن قرص بپرهیزید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به هر کدام از ترکیبات موجود در این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمائید.
مصرف این فرآورده در افراد با سابقه بیماری‌های کلیوی و قلبی با احتیاط انجام شود.
مصرف این فرآورده را زمانی که جراحی دارید، از دو هفته قبل قطع کنید.
در صورتی که در دوران بارداری و یا شیردهی هستید، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
مصرف این فرآورده در افراد با سابقه کلسیم بالای خون شامل اختلالات پاراتیروئید و سارکوئیدوز توصیه نمی‌شود.
فراورده را با معده خالی مصرف نکنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی شایع در صورت مصرف مکمل‌های حاوی ویتامین و مینرال شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف همزمان با آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها مانند سیپرو فلوکساسین و تتراسایکلین‌ها مانند مینوسایکلین، داکسی سایکلین)، بیس‌فسفونات‌ها (مانند آلندرونیت، اتیدرونات، رزیدرونات)، داروهای تیروئیدی (مانند لووتیروکسین)، داروهای ضد انعقاد خون (مانند وارفارین) و داروهای کاهنده چربی خون (مانند کلستیرامین و کلستیپول) خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص UNiFERRO**
- **نام تجاری/ برند: UNiFERRO®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ریحانه اصفهان/ ابیان دارو ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۲ بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Polysaccharide Iron (PIC)	۳۴ mg
Heme Iron Polypeptide (HIP)	۶ mg
Vitamin C	۲۵۰ mg
Folic acid	۸۰۰ mcg
Vitamin B۱۲	۸ mcg
Vitamin B۶	۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Microcrystalline cellulose, Lactose, Aerosil, PVP, Croscarmellose, MgS
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن و تأمین ویتامین‌های B۹ و B۱۲ مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص مصرف شود. بهترین زمان مصرف یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا است. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری گوارشی، جهت به‌حداقل رساندن عوارض گوارشی، یک عدد قرص بلافاصله بعد از وعده غذایی اصلی با یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
• توصیه می‌شود مصرف این مکمل در بیماران مبتلا به هموکروماتوز، هموسیدروز، آنمی همولیتیک، افراد دارای حساسیت غذایی و یا حساسیت به هریک از مواد اولیه موجود در این محصول و همچنین در خانم‌های باردار و شیرده با احتیاط صورت گیرد.
• در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف محصول را قطع و با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک و با احتیاط
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌ها این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند سردرد، یبوست، اسهال و حالت تهوع گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارویی، قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف همزمان با آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها، تتراسایکلین‌ها)، لوودوپا، لووتیروکسین و متیل‌دوپا خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: قرص UNiFLEX**
- **نام تجاری/ برند: UNiFLEX®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ریحانه اصفهان/ ابیان دارو ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۴ عدد بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Calcium carbonate	۶۵۰ mg
MSM	۲۵۰ mg
Vitamin D۳	۶۰۰ IU
Magnesium oxide	۱۰۰ mg (Elemental magnesium: ۶۰ mg)
Zinc sulfate	۲۰ mg (Elemental zinc: ۷/۳ mg)
Vitamin K	۷۵ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Colloidal silicon di-oxide, Sodium croscarmellose, Microcrystalline cellulose PH102, Magnesium Stearate, PVP K30,HP-MC,PEG400,PEG4000, Titanium Dioxide
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت استخوان‌ها و مفاصل، کمک به کاهش التهاب مفاصل و گرفتگی عضلات، کمک به کاهش دردهای مفصلی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به هرکدام از ترکیبات موجود در این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمائید.
مصرف این فرآورده در افراد با سابقه بیماری‌های کلیوی و قلبی با احتیاط انجام شود.
مصرف این فرآورده را زمانی که جراحی دارید، از دو هفته قبل قطع کنید.
در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمائید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.
مصرف این فرآورده در افراد با سابقه کلسیم بالای خون شامل اختلالات پاراتیروئید و سارکوئیدوز توصیه نمی‌شود.
فرآورده را با معده خالی مصرف نکنید.
قرص را کامل ببلعید و از شکستن و جویدن قرص بپرهیزید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی شایع در صورت مصرف مکمل‌های حاوی مولتی ویتامین مینرال شامل تهوع، استفراغ و دردهای شکمی می‌باشد. علائم و آلرژی به هر یک از اجزای فرآورده شامل کهیر، تنفس دشوار، تورم صورت، لب، زبان و گلو می‌باشد که در صورت مشاهده ضروریست مصرف فرآورده را قطع کنید و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضدانعقاد خون شامل هپارین، وارفارین و داروهای ضد پلاکت خون شامل آسپرین، با احتیاط و طبق نظر پزشک انجام شود.
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای لووتیروکسین با رعایت ۴ ساعت فاصله زمانی توصیه می‌شود.
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای بیس فسفونات‌ها شامل آلندرونیت، رزیدرونیت و... با رعایت حداقل ۳۰ دقیقه فاصله زمانی و یا در دو زمان متفاوت در طول روز توصیه می‌شود.
افرادی که داروی دیگوکسین، دیلتیازم، هیدروکلروتیازید و لیتیم مصرف می‌کنند، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنند.
از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای آنتی بیوتیک از دسته کینولون‌ها شامل سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و نیز دسته تتراسایکلین‌ها شامل داکسی سایکلین و... با رعایت حداقل ۲ ساعت فاصله زمانی قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد توصیه می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.




- **نام فرآورده: قرص UNiZINC**
- **نام تجاری/ برند: UNiZINC®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ریحانه اصفهان/ ابیان دارو ابیان دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۴ عدد بلیستر ۱۵ عددی در هر جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Zinc sulfate monohydrate	۴۱/۱ mg (Elemental zinc: ۱۵ mg)
Biotin	۱۰۰ mcg
Folic acid	۵۰۰ mcg
Vitamin B۱	۱۰ mg
Vitamin B۲	۱۰ mg
Vitamin B۳	۳۰ mg
Vitamin B۶	۳ mg
Vitamin B۱۲	۱۵ mcg
Vitamin C	۱۵۰ mg
Calcium D-Pantothenate	۵۰ mg (Pantothenic acid: ۴۶ mg)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sodium Croscarmellose, Dibasic Calcium phosphate, MgS, Microcrystalline cellulose, Opadry
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین ویتامین‌های گروه B، کمک به حفظ سلامت سیستم ایمنی، کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص، همراه با وعده غذایی و یک لیوان آب خنک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
مصرف این مکمل در افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی، سیروز کبدی، حساسیت غذایی و یا حساسیت به هر یک از مواد اولیه موجود در این محصول و در خانم‌های باردار و شیرده باید با احتیاط صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌ها این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند سردرد، سرگیجه و یا اسهال شود.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف محصول را قطع و با پزشک و داروساز خود مشورت نمائید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با آنتی‌بیوتیک‌ها (کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین‌ها مانند مینوسایکلین، داکسی‌سایکلین)، بیس‌فسفونات‌ها (مانند آلندرونیت، رزیدرونات، اتیدرونات)، داروهای ضد صرع (مانند فنی‌توئین)، لوودوپا و سیس‌پلاتین خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس اطفال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود.

ABIAN
PHARMED
Different Health Thinking

شرکت داروسازی ابیان فارمد





- **نام فرآورده:** شربت LiQO Multi
- **نام تجاری/ برند:** LiQO MULTI®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vitamin A	۱۲۰۰ IU
Vitamin D۳	۴۰۰ IU
Vitamin E	۲/۲۲ IU
Vitamin C	۵۰ mg
Vitamin B۱ (as Thiamin HCl)	۱ mg
Vitamin B۲	۱ mg
Vitamin B۳	۶ mg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCl)	۰/۵ mg
Folic acid	۱۵۰ mcg
Vitamin B۱۲	۱ mcg
Vitamin B۵ (as Calcium Pantothenate)	۲ mg
Selenium (as Sodium Selenite)	۲۰ mcg
Zinc (as Zinc Gluconate)	۳ mg
Biotin	۸ mcg
Manganese (as Manganese Sulfate)	۵۰۰ mcg
Chromium (as Chromium Chloride)	۲۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Saccharin Sodium, Butylated Hydroxytoluene, Anhydrous Citric Acid, Glycerol, 2,4-Hexadienoic Acid Potassium, Polysorbate 80, Sorbitol, Sucrose, Trisodium Citrate Dihydrate, Xanthan Gum, Coloring Agents, Water, Ethyl Methylphenylglycidate
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و کمک به تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن، کمک به تأمین ویتامین‌های گروه B، کمک به پیشگیری از خستگی ذهنی و جسمی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** محدوده سنی ۸-۱ سال: ۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری یک بار در روز)- محدوده سنی ۱۸-۹ سال: ۱۰ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری دو بار در روز)- بزرگسالان: ۱۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری سه بار در روز). قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست. مصرف این مکمل در خانم‌های باردار و شیرده با احتیاط صورت گیرد. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** از مصرف فرآورده لیکومولتی در افراد دارای حساسیت به هریک از ترکیبات این شربت خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشابه تمام مکمل‌ها این محصول هم ممکن است در بعضی افراد سبب بروز عوارضی مانند سردرد، سرگیجه و یا اسهال شود. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف محصول را قطع و با پزشک و داروساز خود مشورت نمائید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. از مصرف همزمان لیکومولتی با فرآورده‌های حاوی ویتامین A خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگهداری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** شربت LiQO Mune
- **نام تجاری/ برند:** LiQO MUNE®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vitamin D۳	۸۰۰ IU
Vitamin C	۱۰۰ mg
Vitamin B۱ (as Thiamin HCl)	۳ mg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCl)	۱/۵ mg
Vitamin B۱۲	۱/۸ mcg
Selenium (as Sodium Selenite)	۴۰ mcg
Zinc (as Zinc Gluconate)	۷ mg
Manganese (as Manganese Sulfate)	۱ mg
Magnesium (as Magnesium Gluconate)	۲۰ mg
Chromium (as Chromium Chloride)	۸ mcg
Iodine (as Potassium Iodide)	۵۰ mcg
Copper (as Copper Sulfate)	۵۰۰ mcg
Beta Carotene	۱/۵ mg
L-carnitine (as L-carnitine tartrate)	۵ mg
Acerola extract	۱۰۵ mg
Elderberry extract	۵۰ mg
Shiitake mushroom extract	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Saccharin sodium, BHT, Citric acid, Glycerol, Pottasium sorbate, Tween 80, Sorbitol, Sucrose, Sodium citrate, Xanthan gum, Orange dry flavor, Grapefruit liquid flavor.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت سیستم ایمنی، کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن
آنتی‌اکسیدان و کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** محدوده سنی ۸-۱ سال: ۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری یک بار در روز)، محدوده سنی ۱۸-۹ سال: ۱۰ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری دو بار در روز)، بزرگسالان: ۱۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری سه بار در روز)، قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری نیست.
در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف کنید.
از مصرف بیش از حد مجاز خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: شربت LiQO Oli**
- **نام تجاری/ برند: LiQO Oli®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت ابیان فارمد**
- **تولیدشده در: شرکت زاویه دارویی طب آریانا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
MCT Oil	۱۰۰ ٪

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بر اساس دستور پزشک یا متخصص تغذیه
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** مشکلات و بیماری‌های مرتبط با سوءجذب چربی، کاهش وزن، کنترل اشتها، ایجاد انرژی اضافی برای ورزش
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** باید طبق تجویز پزشک یا متخصص تغذیه استفاده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده جهت مصرف خوراکی بوده و برای استفاده روده‌ای مناسب نیست.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف لیکو اُلی را قطع و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
لیکو اُلی به‌عنوان تنها منبع تغذیه، کافی و مناسب نیست.
لیکو اُلی را باید به آرامی وارد رژیم غذایی کنید زیرا جذب آن سریع بوده و ممکن است باعث بروز مشکلاتی مانند اسهال یا استفراغ شود.
در صورت مصرف همزمان لیکو اُلی با سایر فرآورده‌ها یا داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** افرادی که به روغن نارگیل حساسیت دارند از مصرف لیکو اُلی خودداری کنند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی لیکو اُلی می‌تواند شامل درد شکم، اسهال و ناراحتی معده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از تابش مستقیم آفتاب، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** شربت LiQO PURE
- **نام تجاری/ برند:** LiQO PURE®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Omega -۳acid ethyl esters (Providing ۶۰۰ mg EPA and ۴۶۸ mg DHA)	۱۲۰۰ mg
Vitamin A	۰/۸۹۸ mg
Vitamin E	۱۰ mg
Vitamin D۳	۰/۴ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Saccharin, Glycerin, Tween 80, Tutti Frutti Flavor
- **رده سنی:** کودکان ۴ سال به بالا، نوجوانان و جوانان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به سلامت قلب و عروق و مغز
کمک به کاهش سطح کلسترول
کمک به کاهش التهاب
کمک به تامین ویتامین آ و د
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ سال به بالا، نوجوانان و جوانان: روزانه ۵ میلی‌لیتر
قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان داده دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** برای مصرف این مکمل در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
در صورت استفاده از داروهای ضد انعقاد (وارفارین، کلوپیدوگرل،...) با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** از مصرف فرآورده لیکوزینک در افراد دارای حساسیت به هر یک از ترکیبات این شربت خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی لیکو اُلی می‌تواند شامل درد شکم، اسهال و ناراحتی معده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** شربت LiQO Royal
- **نام تجاری/ برند:** LiQO ROYAL®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vitamin A	۸۰۰ IU
Vitamin D۳	۱۰۰ IU
Vitamin E	۵ IU
Vitamin C	۳۰ mg
Vitamin B۱ (as Thiamin HCl)	۰/۷ mg
Vitamin B۲	۰/۸ mg
Vitamin B۳	۹ mg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCl)	۱ mg
Folic acid	۱۰۰ mcg
Vitamin B۱۲	۰/۵ mcg
Vitamin B۵ (as Calcium Pantothenate)	۳ mg
Biotin	۷۵ mcg
Royal Jelly	۱۵۰ mg
Honey	۳۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Saccharin Sodium, Butylated Hydroxytoluene, Anhydrous Citric Acid, Glycerin, Polysorbate 80, 2,4-Hexadienoic Acid Potassium, Sorbitol, Sucrose, Trisodium Citrate Dihydrate, Xanthan Gum, Pineapple Oils, Acesulfame Potassium,Water
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی، کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن، کمک به تأمین ویتامین A و D و کمک به سلامت پوست، بینایی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ تا ۱۲ سال: ۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری یک بار در روز)، کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۱۰ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری دو بار در روز)، قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری نیست.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ممنوع
- **موارد منع مصرف:** مصرف این مکمل در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است. از مصرف فرآورده لیکورویال در افراد دارای حساسیت به هریک از ترکیبات این شربت و همچنین در صورت سابقه آسم، درماتیت و فشار خون پایین خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی لیکو اُلی می‌تواند شامل درد شکم، اسهال و ناراحتی معده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
در صورت استفاده از داروهای وارفارین یا داروهای فشار خون، شربت لیکو رویال را بدون مشاوره پزشکی مصرف نکنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** شربت LiQO Up
- **نام تجاری/ برند:** LiQO UP®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vitamin A	۱۲۰۰ IU
Vitamin D۳	۶۰۰ IU
Vitamin E	۱۰ IU
Vitamin C	۶۰ mg
Vitamin B۱ (as Thiamin HCl)	۰/۷ mg
Vitamin B۲	۰/۸ mg
Vitamin B۳	۸ mg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCl)	۰/۸ mg
Folic acid	۰/۱ mg
Vitamin B۱۲	۰/۵ mcg
Vitamin B۵ (as Calcium Pantothenate)	۲ mg
Selenium (as Sodium Selenite)	۲۰ mcg
Zinc (as Zinc Gluconate)	۵ mg
Chromium (as Chromium Chloride)	۱۵ mcg
L-arginine	۵۰۰ mg
Lysine	۲۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** BHT, Potassium sorbate, Citric acid, Glycerol, Tween 80, Sorbitol, Sucralose, Sodium citrate, Xanthan gum, Orange flovor
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به عضله‌سازی و تحریک ترشح هورمون رشد در بدن، کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و استخوان، کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** محدوده سنی ۳ تا ۱۲ سال: ۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مربا خوری یک بار در روز)، محدوده سنی بالای ۱۲ سال: ۱۰ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مربا خوری دو بار در روز)، قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان داده دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری نیست.
در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** از مصرف فرآورده لیکوآپ در افراد دارای حساسیت به هریک از ترکیبات این شربت خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی لیکو اُلی می‌تواند شامل درد شکم، اسهال و ناراحتی معده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای "آسپرین"، "کلوپیدوگرل"، "وارفارین"، "هپارین" و "داروهای تنظیم‌کننده‌ی فشار خون" با پزشک خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.




- **نام فرآورده:** شربت LiQO Zinc
- **نام تجاری/ برند:** LiQO Zinc®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت ابیان فارمد
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت ۲۵۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vitamin A	۱۰۰۰ IU
Vitamin D۳	۴۰۰ IU
Vitamin E	۱۰۰ IU
Vitamin C	۴۱ mg
Vitamin B۱ (as Thiamin HCl)	۰/۸ mg
Vitamin B۲	۰/۸ mg
Vitamin B۳	۶ mg
Vitamin B۶ (as Pyridoxine HCl)	۰/۶ mg
Folic acid	۱۵۰ mcg
Vitamin B۱۲	۰/۹ mcg
Vitamin B۵ (as Calcium Pantothenate)	۲ mg
Zinc (as Zinc Gluconate)	۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Saccharin Sodium, Butylated Hydroxytoluene, Anhydrous Citric Acid, Glycerol, Polysorbate 80, Methylparaben, Propylparaben, Water, (D)-Limonene, Xanthan Gum, Povidone K30, Sorbitol, Sucrose, Trisodium Citrate Dihydrate
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت سیستم ایمنی، آنتی‌اکسیدان و کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن، کمک به تأمین ویتامین‌های گروه B
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** محدوده سنی ۱ تا ۸ سال: ۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری یک بار در روز)، محدوده سنی ۹ تا ۱۸ سال: ۱۰ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری دو بار در روز)، بزرگسالان: ۱۵ میلی‌لیتر روزانه (یک قاشق مرباخوری سه بار در روز)، قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان داده دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست. در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف نمایید. در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی، مصرف مکمل را قطع و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** از مصرف فرآورده لیکوزینک در افراد دارای حساسیت به هریک از ترکیبات این شربت خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی لیکو اُلی می‌تواند شامل درد شکم، اسهال و ناراحتی معده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. از مصرف همزمان لیکوزینک با فرآورده‌های حاوی ویتامین A خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و در جای خشک و دور از نور، دور از دید و دسترس کودکان و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

شرکت داروسازی آریان سناء





- **نام فرآورده: کلسیم سیترات (+ منیزیم + زینک + ویتامین D۳)**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰-۱۰۰ عدد قرص / هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin D۳ (Cholecalciferol)	۶۰۰ IU (DV٪۱۵۰)
Calcium Citrate (۱۲۶ mg calcium)	۶۰۰ mg (DV٪۶۰)
Magnesium (Magnesium Oxide)	۱۳۵ mg (DV٪۳۳)
Zinc (Zinc Gluconate)	۱۰ mg (٪۹۱DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):** Microcrystallin Cellulose, Povidone, Pregelatinized Starch, Sodium Croscarmellose, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: استرس فرمولا**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد کپسول/ و یا هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عددی کپسول و مجموعا ۳۰ عدد کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Vitamin C (Ascorbic Acic)	۱۰۰ mg (٪۱۶۶DV)
Vitamin E (DL Acetate)	۳۰ IU (٪۱۰۰DV)
Vitamin B۱ (Thiamine)	۱۵ mg (٪۱۰۰۰DV)
Vitamin B۲ (Riboflavine)	۱۰ mg (٪۵۸۸DV)
Vitamin B۳ (Niacinamide)	۱۰ mg (٪۵۰DV)
Vitamin B۶ (Pyridoxine HCL)	۵ mg (٪۲۵۰DV)
Vitamin B۵ (Calcium Pantothenate)	۲۰ mg (٪۲۰۰DV)
Folic Acid	۴۰۰ mcg (٪۱۰۰DV)
Vitamin B۱۲ (Cyanocobalamin)	۱۲ mcg (٪۲۰۰DV)
Biotin	۴۵ mcg (٪۱۵DV)
Zinc (Zinc Oxide)	۱۵ mg (٪۱۰۰DV)
Copper (Copper Oxide)	۲ mg (٪۱۰۰DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Maltodextrin, Dicalcium Phosphate, Gelatin from Capsule, Magnesium Stearate، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی، کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب، کمک به سلامت سیستم ایمنی، کمک به سلامت پوست مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول، ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: ویژن ساپورت (vision support)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد کپسول/ و یا هر بسته حاوی دو بسیتر ۱۵ عددی کپسول و مجموعا ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین A (بتاکاروتن)	۵۰۰۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامینE (دی ال-آلفا توکوفریل استات)	۳۰ IU (٪۱۰۰DV)
نیاسینامید	۲۰ mg (٪۱۰۰DV)
زینک (زینک اکساید)	۴۰ mg (٪۲۶۶DV)
سلنیوم (سلنیوم آمینواسید شلات)	۱۵۰ mcg (٪۲۱۴DV)
برگ زغال اخته (vaccinium myrtillus)	۵۰ mg
لوتئین	۵ mg


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، مالتودکسترین، دی‌کلسیم فسفات و استئارات منیزیم، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت چشم‌ها و بینایی آنتی‌اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: هیر/ اسکین /نیلز (hair/skin/nails)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد کپسول/ و یا هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عدد کپسول و مجموعا ۳۰ عدد کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
ویتامین A (استات)	۵۰۰۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفریل استات)	۳۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)	۱۰ mg (٪۶۶۷DV)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱۰ mg (٪۵۸۸DV)
ویتامین B۳ (نیاسینامید)	۵۰ mg (٪۲۵۰DV)
فولات (فولیک اسید)	۸۰۰ mcg (٪۲۰۰DV)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۵۰ mcg (٪۸۳۳DV)
بیوتین	۱۰۰۰ mcg (٪۳۳۳DV)
پنتوتنیک اسید (دی کلسیم پنتوتنات)	۲۰ mg (٪۲۰۰DV)
زینک (زینک اکساید)	۴۰ mg (٪۲۶۶DV)
مس (کوپر گلوکونات)	۲ mg (٪۱۰۰DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مو، پوست، ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: کلسیم ۶۰۰+ ویتامین دی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء(تولید قراردادی در شرکت داروسازی آنی درمان)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
(کلکلسیفرول) Dویتامین	۲۰۰ IU (٪۵۰DV)
کلسیم کربنات	۶۰۰ mg (٪۲۴DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، استئاریک اسید، کراس کاملوز سدیم، منیزیم استئارات، سیلیکا
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با غذا یا طبق تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. بیش از حد مجاز مصرف نشود. در صورت آسیب دیدگی درپوش ایمنی استفاده نگردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در خانم‌های باردار و شیرده مصرف نشود.
- **موارد منع مصرف:** خانم‌های باردار و شیرده
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین، مینرال و جینسینگ**
- **نام تجاری/ برند: مولتی دیلی (Multi daily)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء(تولید قراردادی در شرکت داروسازی آنی درمان)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ و یا ۱۲۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامینA (استات)	۵۰۰۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۶۰ mg (٪۱۰۰DV)
ویتامین D۳ (کلکلسیفرول)	۴۰۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامین E (دی ال استات)	۳۰ IU (٪۱۰۰DV)
ویتامین B۱ (تیامین مونونیترات)	۱/۵ (DV٪۱۰۰)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱/۷ mg (٪۱۰۰DV)
ویتامین B۳ (نیاسینامید)	۲۰ mg (٪۱۰۰DV)
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ mg (٪۱۰۰DV)
پنتوتنیک اسید (دی کلسیم پنتوتنات)	۱۰ mg (٪۱۰۰DV)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۶ mcg (٪۱۰۰DV)
فولیک اسید	۴۰۰ mcg (٪۱۰۰DV)
کلسیم (کلسیم کربنات)	۲۰۰ mg (٪۲۰DV)
آهن (فروس فومارات)	۱۰ mg (٪۵۵DV)
زینک (زینک اکساید)	۱۸ mg (٪۱۰۰DV)
ریشه جینسینگ کره‌ای (Panax Ginseng)	۵۰ mg
پودر بذر کتان (.Linum usitatissimum L)	۴۰ mg
rutin	۲۰mg
کولین بی تارترات	۵ mg
اینوزیتول	۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** استئاریک اسید، میکروکریستالین سلولز، هیپرومولوز، منیزیم استئارات، سدیم کراسکارملوز، سیلیکا، دی اکسید تیتانیوم، دی کلسیم فسفات، تالک و عامل رنگ دهنده، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین انرژی و سلامت عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **موارد منع مصرف:** خانم‌های باردار و شیرده
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** سوپر ایمیون سی
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آلفاویتامینز آمریکا
- **تولیدشده در:** شرکت آریان سناء
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قوطی حاوی ۳۰۰ گرم پودر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر اسکوپ معادل ۱۶ گرم
کالری	۷۰
چربی کل	۰g
چربی اشباع شده	۰g
چربی ترانس	۰g
کلسترول	۰g
سدیم	۱۵۲mg (٪۶/۴DV)
کربوهیدرات کل	۶/۴g (٪۲/۴DV)
Dietary fiber	۰g
قند کل	۴g
Includes ۴ g added sugars	٪۸DV
پروتئین	۸g (٪۱۶DV)
ویتامین D۳	۱۰۰mcg (۴۰۰۰IU)(٪۵۰۰DV)
کلسیم	۰mg
آهن	۰mg
پتاسیم	۰mg
Cویتامین	۸۰۰mg (٪۸۸۸/۸DV)
زینک (زینک گلوکونات)	۴۰mg (٪۳۶۴DV)
کلاژن هیدرولیزات	۸/۸g

جز	مقدار در هر اسکوپ معادل ۱۶ گرم
آلانین	۷۱۹ mg
آرژنین	۷۵۵ mg
آسپارتیک اسید	۵۰۹ mg
سیستین	۹ mg
گلوتامیک اسید	۸۸۲ mg
گلایسین	۱۸۹۱ mg
هیستیدین	۷۰ mg
هیدروکسی پرولین	۱۰۷۲ mg
ایزولوسین	۱۲۵ mg
لوسین	۲۳۰ mg
لایزین	۲۹۹ mg
متیونین	۶۱ mg
فنیل آلانین	۱۳۱ mg
پرولین	۱/۰۵۷ mg
سرین	۲۹۱ mg
ترئونین	۱۷۰ mg
تیروزین	۴۴ mg
والین	۱۸۶ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** natural orange fla-vor,sugar,citric acid,sodium bicarbonate, stevia,sodi-,um citrate
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی، آنتی‌اکسیدان، کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک پیمانه (۱۶ گرم) ۲-۱ بار در هفته مصرف شود. این پودر به آسانی هم می‌گردد و درمایعات سرد و گرم محلول است. به‌راحتی می‌توان آن را به آب، اسموتی، شیک و آب‌میوه اضافه کرد.مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری شود.
- **موارد منع مصرف:** خانم‌های باردار و شیرده
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عوارض جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فراورده با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین+ مینرال مخصوص بارداری و شیردهی**
- **نام تجاری/ برند: آلفا پریناتال (alfa prenatal)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A (استات)	۵۰۰۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۱۰۰ mg (۱۶۶٪DV)
ویتامین D (کلکلسیفرول)	۴۰۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین E (دی ال-استات)	۳۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)	۱/۵ mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱/۷ mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۳ (نیاسینامید)	۲۰ mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ mg (۱۰۰٪DV)
فولیک اسید	۸۰۰ mcg (۲۰۰٪DV)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۶ mcg (۱۰۰٪DV)
پنتوتنیک اسید (دی کلسیم پنتوتنات)	۱۰ mg (۱۰۰٪DV)
کلسیم (کلسیم کربنات)	۲۰۰ mg (۲۰٪DV)
آهن (فروس فومارات)	۲۷ mg (۱۵۰٪DV)
زینک (زینک اکساید)	۱۵ mg (۱۰۰٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، استئاریک اسید، کراس کارملوزسدیم، هیپروملوز، منیزیم استئارات، تریاستین، تیتانیوم دی اکسید، تالک، ترکیبات رنگ دهنده
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در دوران قبل، حین و بعد از بارداری
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فولیک اسید+ید+ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: فولیتامین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء(تولید قراردادی در شرکت هگمتان داروی غرب)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عددی قرص روکش‌دار و مجموعه ۳۰ قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر یک قرص در روز
فولیک اسید	۵۰۰ mcg (۱۲۵٪DV)
ید (پتاسیم یدید)	۱۵۰ mcg (۱۰۰٪DV)
ویتامین D۳ (کلکلسیفرول)	۶۰۰ IU (۱۵۰٪DV)


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوزمونوهیدرات، کراس کارملوزسدیم، منیزیم استئارات، کلسیم کربنات، سیلیکون دی اکساید کولوئیدی، پوویدون
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک تامین فولیک اسید و ید و ویتامین د۳
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص و یا طبق تجویز پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. مصرف این محصول در کسانی که مبتلا به بیماری‌های تیروئیدی هستند بایستی تحت نظر پزشک صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف این فراورده همراه با سایر فراورده‌هایی که حاوی فولیک اسید هستند خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان و در بسته‌بندی اصلی نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آریان سناء**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عددی قرص روکش‌دار و مجموعه ۳۰ قرص ۱۰۰۰ IU**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر یک قرص در روز
ویتامین D۳ (کلکلسیفرول)	۱۰۰۰ IU (۱۲۵٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز مونوهیدرات، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، کلسیم کربنات، سیلیکون دی اکساید کولوئیدی، پوویدون
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان و در بسته‌بندی اصلی نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آریان سناء**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عددی قرص روکشدار و مجموعه ۳۰ قرص ۲۰۰۰ IU**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر یک قرص در روز
ویتامین D۳ (کلکلسیفرول)	۲۰۰۰ IU (۲۵۰٪ DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوزمونوهیدرات، کراس کارملوزسدیم، منیزیم استئارات، کلسیم کربنات، سیلیکون دی اکساید کولوئیدی، پوویدون
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی: -**
- **موارد منع مصرف: -**
- **عوارض جانبی احتمالی: -**
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: -**
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان و در بسته‌بندی اصلی نگهداری شود.



- **نام فرآورده: بیوتین**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص ۱۰۰۰ mcg**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
بیوتین	۱۰۰۰ mcg (۱۶۶۷٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکرو کریستالین سلولز، منیزیم استئارات گیاهی، استئاریک اسید، کراس کارملوز سدیم.
فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست و مو و ناخن، کمک به تامین انرژی سلولی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: بیوتین**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص ۴۰۰۰ mcg**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
بیوتین	۴۰۰۰ mcg (۱۳۳۳٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکرو کریستالین سلولز، منیزیم استئارات، استئاریک اسید، کراس کارملوز سدیم
فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست و مو و ناخن، کمک به تامین انرژی سلولی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه اعدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین ب۱۲**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص ۱۰۰۰ mcg**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین B۱۲ (متیل کوبالامین)	۱۰۰۰ mcg (۱۶۶۷٪ DV)


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، استئاریک اسید، کراس کارملوز سدیم، سیلیکا
فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک تامین ویتامین ب۱۲ مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: زینک گلوکونات**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در هگمتان داروی غرب)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص ۳۵ میلی‌گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
زینک گلوکونات (۱۵ میلی‌گرم زینک)	۲۵۰mg (٪۳۱۸DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، استئاریک اسید، کراس کارملوز سدیم،سیلیکون دی اکساید فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست و مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه اعدد قرص و یا طبق تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف: -**
- **عوارض جانبی احتمالی: -**
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: -**
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین ای**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در شرکت دارویی مینو)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی سافت ژل و مجموعا ۳۰ عدد سافت ژل ۴۰۰IU/ و یا قوطی حاوی ۶۰-۱۰۰ عدد سافت ژل ۴۰۰ IU**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر یک سافت ژل
ویتامینE (دی ال-آلفا توکوفریل استات)	۴۰۰ IU (۱۳۳۳٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، آب تصفیه شده، روغن سویا
فاقد مواد محافظ، قند، مخمر، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** :
کمک به تامین ویتامین ای و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد سافت ژل ترجیحا پس از ناهار. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده این فراورده از مصرف خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: کلاژن هیدرولیزات + ویتامین سی**
- **نام تجاری/ برند: آلکوژن (Alcogen)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی کپسول و مجموعا ۳۰ کپسول/ و یا قوطی حاوی ۶۰ عددکپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
کلاژن هیدرولیزات	۱۰۰۰ mg
ویتامینC (آسکوربیک اسید)	۲۰ mg (۳۳٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** ژلاتین، دی کلسیم فسفات، منیزیم استئارات، تیتانیوم دی اکساید فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به سلامت پوست و مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی، کمک به سلامت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه ۲ عدد کپسول ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده این فراورده از مصرف خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگه‌داری شود.



- **نام فرآورده: آهن لیپوزومال**
- **نام تجاری/ برند: فولیزومال (Folisomal)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ میلی لیتر قطره /هر میلی لیتر از فراورده حاوی ۷میلی‌گرم آهن المنتال**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر در روز
آهن (آهن پیروفسفات میکروانکپسوله در شکل لیپوزومال)	V mg (۵۰ RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** فاقد گلوتن آب، سوربیتول، سوکرالوز، گلیسرین، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، سیتریک اسید، سویا لسیتین، طعم دهنده نارگیل/ سیب
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ میلی‌لیتر و یا طبق تجویز پزشک همراه یا بدون غذا
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان زیر ۳ سال



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: آلفلکسیل (Alflexil)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سنا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص/و یا هر بسته حاوی دو بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سه قرص
گلوکزآمین هیدروکلراید	۱۵۰۰ mg
کندروئیتین سولفات	۱۲۰۰ mg
M.S.M (متیل سولفونیل متان)	۵۰۰ mg
کلاژن هیدرولیزات	۳۰۰ mg


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، استئاریک اسید، کراس کارملوزسدیم، هیپرومولوز، منیزیم استئارات، ترياستین، تیتانیوم دی اکسید، تالک
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت غضروف و مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۳ عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** امگا۳
- **نام تجاری/ برند:** -
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آلفاویتامینز آمریکا
- **تولیدشده در:** شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در داروسازی مینو)
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قوطی حاوی ۶۰ یا ۱۰۰ عدد سافت ژل ۱۰۰۰ میلی‌گرمی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل
کالری	۱۰
کالری ناشی از چربی	۱۰
چربی کل	۱ g (۲٪DV)
Polyunsaturated fat	۰/۵ g
کلسترول	۰
روغن ماهی	۱۰۰۰ mg
EPA (ایکوزاپنتانوئیک اسید)	۱۸۰ mg
DHA (دوکوزاهگزانوئیک اسید)	۱۲۰ mg
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفریل استات)	۱ IU (۳٪DV)


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، آب تصفیه شده
فاقد ماده محافظ، قند، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به کاهش کلسترول، کمک به سلامت قلب و عروق، کمک به کاهش التهاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد سافت ژل با غذا یا طبق تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف فراورده با سایر داروها و یا در صورت ابتلا به مشکلات انعقادی خون و یا حساسیت به روغن ماهی قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری نمایید. در صورت آسیب درپوش از مصرف فراورده خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در خانم‌های باردار و شیرده مصرف نشود.
- **موارد منع مصرف:** افراد زیر ۱۸ سال
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: منیزیم + ب۶**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین B۶	۵۰ mg (۲۵۰۰٪DV)
منیزیم (منیزیم اکساید)	۳۰۰ mg (۷۵٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، استئاریک اسید، کراس کارملوز سدیم، سیلیکون دی اکساید فاقد مواد محافظ، مخمر، قند، طعم دهنده و گلوتن
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی عضلانی، کمک به اسپاسم عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه اعدد قرص مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: کلسیم منیزیم زینک پلاس ویتامین د**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در شرکت داروسازی آنی درمان)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰-۱۰۰ عدد کپلت**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپلت
ویتامین D (کلکلسیفرول)	۱۳۳ IU (۳۳٪DV)
کلسیم (کلسیم کربنات)	۳۳۳ mg (۳۳٪DV)
منیزیم (منیزیم اکساید)	۱۳۳ mg (۳۳٪DV)
زینک (زینک اکساید)	۵ mg (۳۳٪DV)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** استئاریک اسید، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، سدیم کراسکارملوز، دی کلسیم فسفات، سیلیکا
فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با غذا یا طبق تجویز پزشک.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
بیش ازحد مجاز مصرف ننمایید.
در صورت آسیب دیدگی درپوش ایمنی استفاده نگردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** مولتی وومن (Multi Women)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آلفاویتامینز آمریکا
- **تولیدشده در:** شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در شرکت داروسازی آنی درمان)
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص/ هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامینA (استات)	۵۰۰۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۶۰mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین D (کلکلسیفرول)	۴۰۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوریل استات)	۳۰ IU (۱۰۰٪DV)
ویتامین K (فیتونادیون)	۸۰mcg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۱ (تیامین مونونیترات)	۱/۵mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱/۷mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۳ (نیاسینامید)	۲۰mg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ mg (۱۰۰٪DV)
فولات (فولیک اسید)	۸۰۰mcg (۲۰٪ oDV)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۶mcg (۱۰۰٪DV)
بیوتین	۳۰۰mcg (۱۰۰٪DV)

جز	مقدار در هر قرص
پنتوتنیک اسید (دی کلسیم پنتوتنات)	۱۰ mg (۱۰۰٪DV)
کلسیم (دی کلسیم فسفات)	۱۶۲ mg (۱۶٪DV)
آهن (فروس فومارات)	۱۸ mg (۱۰۰٪DV)
فسفر (دی کلسیم فسفات)	۱۲۵ mg (۱۳٪DV)
ید (پتاسیم یدید)	۱۵۰ mcg (۱۰۰٪DV)
منیزیم (منیزیم اکساید)	۲۵ mg (۶٪DV)
زینک (زینک اکساید)	۱۵ mg (۱۰۰٪DV)
سلنیوم (سلنیوم آمینو اسید شلات)	۷۰ mcg (۱۰۰٪DV)
مس (کوپر اکساید)	۲ mg (۱۰۰٪DV)
منگنز (منگنز سولفات)	۲ mg (۱۰۰٪DV)
کروم (کروم پیکولینات)	۱۲۰ mcg (۱۰۰٪DV)
مولیبدن (مولیبدن آمینو اسید شلات)	۷۵ mcg (۱۰۰٪DV)
بور (بور آمینواسید شلات)	۱۵۰mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** استئاریک اسید، میکروکریستالین سلولز، هیپروملوز، منیزیم استئارات، سدیم کراسکارملوز، دی اکسید تیتانیوم، سیلیکا، تالک، ترياستین FD&C Yellow #6 Lake، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در خانم‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با فراورده‌های مکمل دیگر که حاوی آهن می‌باشند با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- **نام فرآورده: -**
- **نام تجاری/ برند: مولتی من (Multi Men)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آلفاویتامینز آمریکا**
- **تولیدشده در: شرکت آریان سناء (تولید قراردادی در شرکت داروسازی آنی درمان)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص / و هر بسته حاوی دو عدد بلیستر ۱۵ عددی قرص و مجموعا ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامینA (استات)	۵۰۰۰ IU (۱۶۷٪DV)
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۶۰mg (۶۷٪DV)
ویتامین D (کلکلسیفرول)	۴۰۰ IU (۵۰٪DV)
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوریل استات)	۳۰ IU (۹۰٪DV)
ویتامین K (فیتونادیون)	۸۰mcg (۶۷٪DV)
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)	۱/۵mg (۱۲۵ ٪DV)
ویتامین B2 (ریبوفلاوین)	۱/۷mg (٪۱ ۱۳DV)
ویتامین B3 (نیاسینامید)	۲۰mg (۱۲۵ ٪DV)
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ mg (۱۱۷/۶۷ ٪ DV)
فولات (فولیک اسید)	۴۰۰mcg (۱۰۰٪DV)
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)	۶mcg (۲۵۰٪DV)
بیوتین	۳۰۰mcg (۱۰۰۰٪DV)

جز	مقدار در هر قرص
پنتوتنیک اسید (دی کلسیم پنتوتنات)	۱۰mg (۲۰۰٪DV)
کلسیم (دی کلسیم فسفات)	۱۲۶mg (۱۲/۶٪DV)
آهن (فروس فومارات)	۱۸mg (۱۰۰٪DV)
فسفر (دی کلسیم فسفات)	۹۷mg (۸٪DV)
ید (پتاسیم یدید)	۱۵۰mcg(۱۰۰٪DV)
منیزیم (منیزیم اکساید)	۲۵mg (۶٪DV)
زینک (زینک اکساید)	۱۵mg (۱۳۶٪DV)
سلنیوم (سلنیوم آمینواسید شلات)	۷۰mcg (۱۲۷٪DV)
مس (کوپر اکساید)	۲mg (۲۲۲٪DV)
منگنز (منگنز سولفات)	۲mg (۸۷٪DV)
کروم (کروم پیکولینات)	۱۲۰mcg (۳۴۳٪DV)
مولیبدن (مولیبدن آمینو اسید شلات)	۷۵mcg (۱۶۷٪DV)
بورون (بورون آمینواسید شلات)	۱۵۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** استئاریک اسید، میکروکریستالین سلولز، هیپروملوز، منیزیم استئارات، سدیم کراسکارملوز، دی اکسید تیتانیوم، سیلیکا، تالک، ترياستین FD&C Blue #1 Lake ،FD&C Blue #2 Lake، فاقد مواد محافظ، شکر، مخمر، طعم‌دهنده و گلوتن
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز افزایش ندهید
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز مصرفی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با فراورده‌های مکمل دیگر که حاوی آهن می‌باشند با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرکت داروسازی آرین سلامت سینا





- **نام فرآورده: کلسیم، ویتامین د۳، ویتامین کا ۲-۷**
- **نام تجاری/ برند: استئوکینون**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰۰ سی سی محلول خوراکی در بطری داخل جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ سی سی
کلسیم (به فرم کلسیم کربنات)	۱۲۵ میلی‌گرم
ویتامین د۳ طبیعی	۲۰۰ واحد جهانی
ویتامین کا ۲-۷	۲۲/۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** زانتان گام، گلیسرین، سدیم بنزوات، سیتریک اسید، پتاسیم سوربات، پروپیلن گلیکول، پلی سوربات 80، سدیم ساخارین، سوربیتول، شکر، سوکرالوز، طعم‌دهنده وانیل، طعم‌دهنده کارامل، اتانول 96% و آب خالص‌شده
فاقد گلوتن، مواد لبنی، لاکتوز، نمک و مخمر
- **رده سنی:** تمامی سنین
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به سلامت استخوان‌ها، کمک به دریافت کلسیم مورد نیاز در تمامی سنین
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان زیر یک سال: ۵ سی سی یک بار در روز بعد از غذا
کودکان یک تا هشت سال: ۵ سی سی دو بار در روز بعد از غذا
کودکان نه تا هجده سال: ۵ سی سی سه بار در روز بعد از غذا
بزرگسالان: ۱۰ سی سی سه بار در روز بعد از غذا
قبل از هر بار مصرف بطری را بخوبی تکان دهید.
مصرف شربت استئوکینون را تا زمان نیاز می‌توانید ادامه دهید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. برای مصرف بیش از مقدار توصیه‌شده با پزشک مشورت کنید. مادران باردار و افرادی که داروهای دیگری دریافت می‌کنند قبل از مصرف پزشک مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته و آن را درون جعبه، دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگه داری کنید. از یخزدگی محافظت کنید.



- **نام فرآورده: کلسیم، ویتامین د۳، ویتامین کا ۲-۷**
- **نام تجاری/ برند: استئوکینون**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۱۰۰ عدد قرص در ۵ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم (به فرم کلسیم کربنات)	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۲۰۰ واحد جهانی
ویتامین کا ۲-۷	۴۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون K30، کراس کارملوز سدیم، اتانول 96 درصد، آب تقطیرشده و کوتا فیلم
- **رده سنی:** تمامی سنین
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
قابل مصرف برای افراد دیابتی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص یک تا چهار بار در روز بعد از غذا و با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فرآورده، مصرف نشود. این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها نمی‌باشد. جهت مصرف بیش از میزان توصیه‌شده با پزشک یا داروساز مشورت شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** مایو- و دی کایرو اینوزیتول، ال-متیل فولات، ال-آرژنین، ان-استیل سیستئین، ویتامین د۳، زینک، سلنیوم، کرومیوم
- **نام تجاری/ برند:** اواهلث آرین سلامت سینا
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی آرین سلامت سینا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی آرین سلامت سینا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۶۰ عدد قرص روکش دار در ۶ بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
مایو- اینوزیتول	۱۰۰۰ میلی‌گرم
دی- کایرو اینوزیتول	۱۰ میلی‌گرم
ال- آرژنین	۱۰۰ میلی‌گرم
ال- متیل فولات	۱۰۰ میلی‌گرم
ان- استیل سیستئین	۵۰ میلی‌گرم
زینک (به فرم زینک سولفات)	۱۵ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد جهانی
کرومیوم (به فرم کرومیوم پیکولینات)	۱۰۰ میکروگرم
سلنیوم (به فرم سدیم سلنات)	۱۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزم استئارات، سیلیکون دی اکساید، پودر صورتی کوتا فیلم
- **رده سنی:** تمامی سنین
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک (تنبلی تخمدان PCOS)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دو نوبت در روز، هر نوبت یک تا دو عدد قرص با یک لیوان آب و ترجیحا بعد از غذای اصلی میل شود.
قابل مصرف برای افراد دیابتی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را درون جعبه، دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳، منیزیم**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین D۳ فورت ۱۰۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در بطری داخل جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین د۳ (فاقد لانولین)	۱۰۰۰ واحد جهانی
منیزیم (به فرم منیزیم اکساید)	۱۰۰ میلی‌گرم المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مالتودکسترین، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون K30، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، تالک، پودر سفید کوتا فیلم، طعم دهنده کارامل
- **رده سنی:** تمامی سنین
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر، کمک به سلامت سیتم ایمنی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک تا دو عدد قرص بعد غذای اصلی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود.
در صورت مصرف داروهای دیگر زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از هر بار مصرف درب بطری را کاملا بسته و آن را درون جعبه، دور از نور و رطوبت، و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳، منیزیم**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین D۳ فورت ۲۰۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص در بطری داخل جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین د۳ (فاقد لانولین)	۲۰۰۰ واحد جهانی
منیزیم Marine	۱۰۰ میلی‌گرم المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** مالتودکسترین، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون K30، و تالک
- **رده سنی:** تمامی سنین
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر، کمک به سلامت سیتم ایمنی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با وعده غذایی اصلی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در صورت مصرف دارویی دیگر زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از هر بار مصرف درب بطری را کاملا بسته و آن را درون جعبه، دور از نور و رطوبت، و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.



- **نام فرآورده: زینک، ویتامین ب کمپلکس، ویتامین ث**
- **نام تجاری/ برند: زینک پاور**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۲ عدد کپسول در ۲ بلیستر ۱۶ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
زینک (به فرم زینک سولفات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین ث	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۱/۳ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین ب۳	۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۵	۶/۵۲ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱/۶ میلی‌گرم
بیوتین (ب۷)	۱۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۳ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون K30، دانه N.P، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد کپسول یک تا دو بار در روز به همراه وعده غذایی با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود.
جهت مصرف بیش از مقادیر توصیه‌شده با پزشک یا داروساز مشورت شود.
در صورتی که دارو یا مکمل دیگری مصرف می‌کنید فراورده را زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را درون جعبه، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری کنید- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: کلسیم، منیزیم ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: سیترابن**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص روکش دار در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم (به فرم کلسیم سیترات)	۲۱۰ میلی‌گرم
منیزیم marine	۴۰ میلی‌گرم المنتال
ویتامین د۳ طبیعی (فاقد لانولین)	۵۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آویسل 102 (میکروکریستالین سلولز)، پلی وینیل پیرولیدون K30، پودر سفید کوتا فیلم، سدیم کراس کارملوز و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان، قابل مصرف برای افراد دیابتی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص، یک تا دو بار در روز بعد از غذا و با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوز درمانی عوارض جانبی ندارد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را درون جعبه، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری کنید. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: آهن، فولیک اسید، ویتامین ب۱۲، ویتامین ث**
- **نام تجاری/ برند: فرو-دین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۲ عدد کپسول در ۲ بلیستر ۱۶ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
آهن (به فرم فروس بیس گلایسینات)	۲۸ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۸ میکروگرم
ویتامین ث	۶۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز میکروکریستالین، مانیتول، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، هیپروملوز، پیگمان زرد 104 C.I، تیتانیوم دی‌اکساید، پلی اتیلن گلیکول 400، کارامل، کلسیم فسفات دی‌بازیک anhydrous
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن و ویتامین ب۱۲ مورد نیاز بدن، جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، کمک به ساخت گلبول قرمز، کمک به فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک الی دو عدد کپسول در دوز ترجیحا با معده خالی، در صورت عدم تحمل بعد از غذا میل شود. از مصرف همزمان با لبنیات، چای و قهوه خودداری شود. پس از بهبود علائم کم‌خونی مصرف مکمل را تا ۳ الی ۶ ماه ادامه دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. در هموکروماتوزیس، هموگلوبینوپاتی‌ها، آنمی همولوتیک و آپلازی گلبول قرمز که ممکن است آهن خون بالا باشد، باید با احتیاط مصرف شود. عدم پاسخ به درمان ممکن است از علل دیگر کم‌خونی باشد که باید بررسی شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در بیماران حساس به فراورده یا میزان آهن بالا ممنوع است.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به سبب اثرات درمانی یک سری عوارض جانبی نیز دارد. مدفوع تیره در دوره درمان با آهن معمول است. سایر علائم گوارشی مثل درد شکمی، تهوع، استفراغ، یبوست و گاهی اسهال مشاهده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** جذب آهن با تتراسایکلین‌ها، پنی‌سیلامین، لوودوپا، بیس‌فسفونات‌ها، لووتیروکسین، کینولون‌ها و آنتی‌اسیدها تداخل دارد. برای جلوگیری از این عمل بین مصرف این داروها و فراورده حداقل ۲ تا ۳ ساعت فاصله داشته باشد. در صورت مصرف داروی دیگر زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مسمومیت با آهن به ویژه در کودکان خطرناک است و نیاز به مداخله فوری دارد. در صورتی که بیش از ۲۰ میلی‌گرم آهن المنتال به ازای هر کیلوگرم بدن مصرف شود می‌تواند منجر به علائم مسمومیت مثل درد شکمی، استفراغ، اسهال و استفراغ خونی و در موارد شدیدتر افت فشار خون، اسیدوز متابولیک و افزایش قند خون، اختلال سیستم اعصاب مرکزی با درجات مختلفی از بی‌حالی تا کما شود و می‌بایست سریعا به پزشک یا مراکز درمانی منتقل شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دارو را در محل خشک و دور از نور، در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. برای پیشگیری از مسمومیت با آهن از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.



- **نام فرآورده: کلسیم، منیزیم، زینک، ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: کلسی پاور**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰۰ سی سی محلول خوراکی در بطری داخل جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ سی سی
کلسیم (به فرم کلسیم کربنات)	۱۰۰ میلی‌گرم
منیزیم (به فرم منیزیم هیدروکساید)	۷۵ میلی‌گرم
زینک (به فرم زینک گلوکونات)	۵ میلی‌گرم
ویتامین د۳ طبیعی	۱۲۵ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** زانتان گام، پتاسیم سوربات، پلی سوربات 80، پروپیلن گلایکول، گلیسرین، سدیم ساخارین، سوربیتول، سدیم بنزوات، طعم‌دهنده کارامل و آب خالص‌شده
فاقد مواد لبنی، شکر، لاکتوز، نمک، مخمر و رنگ مصنوعی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:**
کودکان ۷ ماه تا ۸ سال: ۵ سی سی یک الی دو بار در روز بعد از غذا
کودکان ۹ تا ۱۸ سال: ۵ سی سی دو الی سه بار در روز بعد از غذا
بزرگسالان: ۱۰ سی سی دو بار در روز بعد از غذا
قبل از هر بار مصرف بطری را به خوبی تکان دهید. مصرف شربت کلسی‌پاور را تا زمان نیاز می‌توانید ادامه دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** پس از مصرف درب بطری را کاملا بسته، آن را درون جعبه دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. از یخزدگی محافظت کنید.



- **نام فرآورده: کلسیم، منیزیم، زینک، ویتامین د۳ طبیعی**
- **نام تجاری/ برند: کلسی پاور**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۹۰ عدد قرص روکش دار در بسته بندی بطری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم (به فرم کلسیم کربنات)	۲۰۰ میلی‌گرم
منیزیم (به فرم منیزیم مارین)	۱۵۰ میلی‌گرم
زینک (به فرم زینک گلوکونات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳ طبیعی (فاقد لانولین)	۲۵۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پوویدون K30، تالک، سدیم استارچ گلیکولات، هیپرومولوز 2910، وانیل
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک تا دو عدد قرص با یک لیوان آب و بعد از غذای اصلی. قابل مصرف برای افراد دیابتی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.




- **نام فرآورده: منیزیم، ویتامین ب۱، ب۶، د۳ و کا ۲-۷**
- **نام تجاری/ برند: مگنیفورت**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی آرین سلامت سینا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۲ عدد کپسول در ۲ بلیستر ۱۶ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
منیزیم (به فرم منیزیم Marine)	۱۵۰ میلی‌گرم المنتال
ویتامین ب۱	۹۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین کا ۲-۷	۵۰ میکروگرم
ویتامین د۳ طبیعی	۴۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون K30 و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین منیزیم و ویتامین د۳، کمک به حفظ سلامت بدن، قابل مصرف برای افراد دیابتی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد کپسول یک تا دو بار در روز بعد از غذا با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای درمان و تشخیص و پیشگیری استفاده نشود. جهت مصرف بیش از مقادیر توصیه‌شده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. در صورتی که دارو یا مکمل دیگری نیز مصرف می‌کنید، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را درون جعبه، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری کنید. دور از دسترس کودکان

شرکت داروسازی اسوه





- **نام فرآورده: قرص بیوتین ۱۰۰۰ میکروگرم**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد قرص داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Biotin	۱۰۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** K30، کراس کارملوز سدیم، مانیتول، میکروکریستالین سلولز، تالک، منیزم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد قرص و یا طبق دستور پزشک یا داروساز خود مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و یا درمان نمی‌باشد. مصرف دوزهای بالای بیوتین با برخی از تست‌های آزمایشگاهی مانند تروپونین، تست‌های عملکرد تیروئید و تست‌های هورمونی تداخل دارد و ممکن است نتایج حاصل از آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین برای بیماران تالاسمی**
- **نام تجاری/ برند: تالاویت**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۲ عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص فرد و ۲ عدد بلیستر ۱۰ عددی قرص زوج به همراه یک بروشور در جعبه مقوایی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار زوج
زینک	۳/۴۴ میلی‌گرم
ویتامین B1	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۲/۵ میلی‌گرم
نیاسین	۱۶ میلی‌گرم
اسید پنتوتنیک	۶ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۰۰ میکروگرم
ویتامین ایی	۱۲ IU
ویتامین آ	۲۶۶۶ IU


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز 102، نشاسته پرژلاتینه، PVP K30، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، آب خالص، اپادرای نارنجی، اپادرای سفید، BHT، Mannitol SD، رنگ FD & C BLUE No.2
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تامین ویتامین‌ها و املاح ضروری در بیماران تالاسمی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف فرآورده بر اساس سن، جنس و شرایط فیزیکی شخص توسط پزشک تعیین می‌شود. میزان معمول مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به تالاسمی به شرح زیر می‌باشد:
قرص‌های فرد، در روزهای فرد هفته، روزی یک عدد.
قرص‌های زوج، در روزهای زوج هفته، روزی یک عدد
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد. بیش از مقدار توصیه شده از این مکمل استفاده نشود. با توجه به وجود ویتامین B۲ در قرص‌های فرد، در صورت مصرف این فرآورده ممکن است رنگ ادرار زردتر شود که این امر طبیعی می‌باشد. جهت پیشگیری از بروز عوارض گوارشی بهتر است این مکمل همراه غذا یا بعد از غذا مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان مولتی ویتامین**
- **نام تجاری/ برند: اسوه- مولتی ویتامین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان در بسته بندی ۱۰ و ۲۰ عددی داخل تیوب**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin A	۳۰۰۰ IU
Vitamin B۱	۲ mg
Vitamin B۲	۲/۵ mg
Vitamin E	۲/۵ mg
Vitamin B۶	۴ mg
Vitamin B۱۲	۲ mcg
Vitamin C	۱۰۰ mg
Nicotinamide	۲۰ mg
Calcium Pantothenate	۸ mg
Biotin	۳۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پودر سوکروز، اسید سیتریک انهیدروس، سدیم بیکربنات، آدیپیک اسید، دایمتیکون، پلی سوربات 80، اسانس پرتقال، اسانس نارنگی، اتانول 96%، آب خالص، سدیم ساخارین
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل میل نمایید. از مصرف قرص قبل از حل کردن در آب خودداری نمائید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد. این فرآورده فاقد Vitamin D۳ می باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزا فرآورده مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.



- **نام فرآورده: کپسول سلنیوم ۲۰۰ میکروگرم**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد کپسول داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Selenium (as sodium selenite)	۲۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم کربنات، کراس کارملوز سدیم، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، کپسول ژلاتینی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان و کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** در بزرگسالان روزانه یک کپسول ترجیحا همراه غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و یا درمان نمی‌باشد. در صورت داشتن بیماری (نظیر بیماری‌های گوارشی یا کلیوی و ...) قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ میلی‌گرم
- **نام تجاری/ برند:** -
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی اسوه
- **تولیدشده در:** تهران، ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص جوشان با طعم انبه در بسته بندی ۱۰ عددی داخل تیوب
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم کربنات، کراس کارملوز سدیم، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، کپسول ژلاتینی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان و کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** در بزرگسالان روزانه یک کپسول ترجیحا همراه غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و یا درمان نمی‌باشد. در صورت داشتن بیماری (نظیر بیماری‌های گوارشی یا کلیوی و ...) قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان با طعم لیمو در بسته بندی ۱۰ و ۲۰ عددی داخل تیوب**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پودر سوکروز، اسید سیتریک انهیدروس، سدیم بیکربنات، اسانس لیمو، ریبوفلاوین-5سدیم فسفات، آدیپیک اسید، نشاسته ذرت، سدیم ساخارین، اتانول 96%، آب خالص
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی و تامین ویتامین ث
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل میل نمایید. از مصرف قرص قبل از حل کردن در آب خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف: -**
- **عوارض جانبی احتمالی: -**
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: -**
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.



- **نام فرآورده: قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: قـرص جوشـان بـا طعـم لیمـو در بسـته بنـدی ۱۰ و ۲۰ عـددی داخـل تیـوب**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۵۰۰ mg

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** پـودر سـوکروز، اسـید سـیتریک انهیـدروس، سـدیم بیکربنـات، اسـانس پرتقـال، ریبوفلاویـن5، سـدیم فسـفات، PVP K30، آلـورا رد، اتانـول 96%، آب خالـص، آدیپیـک اسـید، نشاسـته ذرت، سـدیم سـاخارین
- **رده سنی: -**
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه سـلامت سیسـتم ایمنـی و تامیـن ویتامیـن ث
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** هـر قـرص را در یـک لیـوان آب حـل کـرده و پـس از انحـلال کامـل میـل نماییـد. از مصـرف قـرص قبـل از حـل کـردن در آب خـودداری نماییـد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و جهـت پیشـگیری، تشـخیص و درمـان نمی‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف: -**
- **عوارض جانبی احتمالی: -**
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: -**
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن: -**
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای کمتـر از ۳۰ درجه سـانتیگراد و دور از نـور و رطوبـت نگهـداری شـود. پـس از هـر بـار مصـرف درپـوش ظـرف را محکـم ببندیـد.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان کلسیم فورت
- **نام تجاری/ برند:** کلسیم فورت
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی اسوه
- **تولیدشده در:** تهران، ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۱۰ عدد قرص جوشان داخل تیوب
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Calcium (as Ca Lactate Gluconate)	۳۶۳/۳۶۴ mg
Calcium (as Ca Carbonate)	۱۲۰/۱۳۲ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسید سیتریک انهیدروس، سدیم بیکربنات، PEG 4000، پودر مانیتول، آدیپیک اسید، سوکرالوز، اسانس پرتقال، آلورا رد، ریبوفلاوین 5 - سدیم فسفات، PVP K30، اتانول 96%، ایزوپروپیل الکل
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر قرص را در یک لیوان آب سرد حل کرده و پس از انحلال کامل میل نمائید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و یا درمان نمی‌باشد. بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان کلسیم - د
- **نام تجاری/ برند:** کلسیم فورت
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی اسوه
- **تولیدشده در:** تهران، ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۱۰ عدد قرص جوشان داخل تیوب
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Calcium (as carbonate)	۵۰۰ mg
Cholecalciferol (Vit D۳)	۴۰۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسید سیتریک انهیدروس، سدیم بیکربنات، PEG، PVP K30، آدیپیک اسید، سایمتیکون، آسکوربیک اسید، سوکرالوز، ریبوفلاوین، اسانس لیمو، اتانول 96%
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر قرص را در یک لیوان آب سرد حل کرده و پس از انحلال کامل میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد. بیش از مقدار توصیه شده مصرف نشود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. پس از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.



- **نام فرآورده: کپسول کافئین ۲۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: کلسیم فورت**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد کپسول داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Caffeine Anhydrous	۲۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس، تالک، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، کپسول ژلاتینی
- **رده سنی:** در افراد زیر ۱۲ سال مصرف نشود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش هوشیاری و تاخیر خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال؛ روزانه یک کپسول
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و یا درمان نمی‌باشد. هر کپسول حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین است که حدودا معادل کافئین یک فنجان قهوه می باشد. در صورت مصرف این فرآورده، مصرف دیگر فرآورده‌های حاوی کافئین (مانند نوشابه‌های انرژی‌زا، قهوه، چای و شکلات) را محدود کنید. در صورت داشتن بیماری زمینه‌ای قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید. افزایش ضربان قلب، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، سردرد می‌تواند از عوارض مصرف کافئین باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- **نام فرآورده: قرص روکشدار مولتی ویتامین**
- **نام تجاری/ برند: اسوه- مولتی ویتامین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۱۰۰ عدد قرص روکشدار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A	۵۰۰۰ IU
Vitamin B۱	۱/۵ mg
Vitamin B۲	۱/۷ mg
Vitamin B۶	۲ mg
Vitamin C	۶۰ mg
Vitamin D۳	۴۰۰ IU
Vitamin E	۱۵ IU
Vitamin B۱۲	۶ mcg
Nicotinamide	۲۰ mg
Folic Acid	۴۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک، پودر سوکروز، PVP K30، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت، مانیتول، اتانول 96%، اپادرای صورتی، آب خالص
- **رده سنی:** در افراد زیر ۱۲ سال مصرف نشود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف مکمل‌ها بر اساس سن، جنس و شرایط فیزیکی شخص توسط پزشک تعیین می‌گردد. میزان معمول مصرف مکمل در بزرگسالان روزانه یک قرص به‌صورت خوراکی است.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد. با توجه به وجود ریبوفلاوین (ویتامین B۲) در این فرآورده ممکن است ادرار به رنگ زرد در آید. به منظور کاهش ناراحتی گوارشی، فرآورده‌های حاوی ویتامین را همراه غذا یا شیر و یا بعد از غذا مصرف نمایید. تا زمانی که علت نیاز به مصرف ویتامین‌ها برطرف گردد. جهت آگاهی از این امر با پزشک خود تماس بگیرید. مکمل را دقیقا مطابق دستور پزشک مصرف کنید. مصرف بیش از حد برخی ویتامین‌ها از جمله ویتامین A و D به علت ذخیره شدن آن‌ها در بدن سبب بروز مسمومیت می‌گردد. دوزهای بالای ویتامین ث ممکن است در آزمون‌های قند در افراد دیابتی و تست خون در مدفوع تداخل ایجاد نماید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

- **نام فرآورده: مولتی ویتامینCKD (بیماری‌های مزمن کلیوی)**
- **نام تجاری/ برند: نفروویت**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۱۰۰ عدد قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر قرص
Vitamin B۱۲	۶ mcg
Vitamin B۱	۱/۵ mg
Vitamin B۲	۱/۷ mg
Vitamin B۶	۱۰ mg
Vitamin E	۵۰ mg
Vitamin B۵	۱۰ mg
Ascorbic Acid	۶۰ mg
Biotin	۳۰۰ mcg
Zinc(as Zinc Oxide)	۲۵ mg
Nicotinamide	۲۰ mg
Folic Acid	۵۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اکدیسول، آویسل 102، منیزیم استئارات، اتانول 96% ، آب خالص، اپادرای نارنجی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف فرآورده براساس سن، جنس و شرایط فیزیکی بیمار توسط پزشک معالج تعیین می‌گردد. میزان معمول مصرف این فرآورده در بزرگسالان مبتلا به ESRD، روزانه یک قرص به‌صورت خوراکی پس از دیالیز می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده یک مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی احتمالی (حتی اگر اینجا ذکر نشده) در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید. اسهال خفیف و گذرا، پلی سیتمی، ترومبوز عروق محیطی، خارش، احساس تورم در تمام بدن، شوک آنافیلاکسی، آتاکسی (عدم تعادل)، سندرم آسیب به اعصاب حسی، احساس گرما و گرگرفتگی، کهیر، ضعف، تعریق، سیانوز و ادم ریوی. واکنش‌های آلرژیک با مصرف فرم خوراکی فولیک اسید (از اجزای این فرآورده) ممکن است مشاهده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان و یا سابقه‌ی مصرف هر داروی دیگر (به ویژه داروهای زیر)، به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید: لوودوپا: پیریدوکسین (از اجزای این فرآورده) می‌تواند اثر بخشی داروی لوودوپا را از طریق افزایش متابولیسم محیطی آن، کاهش دهد. فنی توئین: پیریدوکسین (از اجزای این فرآورده) می‌تواند باعث کاهش سطح سرمی فنی توئین گردد. فولیک اسید (از اجزای این فرآورده) ممکن است باعث کاهش اثرات فنوباربیتال، فنی توئین و پیریمیدون گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.



- **نام فرآورده: قرص روکشدار جویدنی ویتامین ایی ۱۰۰ واحد بین‌المللی**
- **نام تجاری/ برند: اسوه- ویتامین ایی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکش‌دار جویدنی در جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین ایی (دی-ال-آلفاتوکوفریل استات)	۱۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** PVP K30، پودر سوکروز، آویسل 101، آئروزیل 200، توتی فروتی، اتانول 96% اپادرای نارنجی، آب خالص، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ایی و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف هر دارو یا فرآورده را پزشک تعیین می‌کند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان بیماری نمی‌باشد. از مصرف این فرآورده بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمائید. مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضدانعقاد خون، نیازمند تائید پزشک متخصص می‌باشد. مصرف همزمان و زیاد هیدروکسید آلومینیوم، کلستیرامین، پارافین و سوکرالفیت می‌تواند بر روی جذب این فرآورده تاثیر گذارد. از آنجایی که ویتامین ایی می‌تواند اثر ویتامین K را آنتاگونیزه کرده و سبب افزایش زمان انعقاد خون گردد بنابراین مصرف همزمان این دو فرآورده نیازمند تایید پزشک متخصص می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک سبب عوارض زیر می‌گردد: شامل اسهال، سرگیجه، ضعف یا خستگی، تاری دید، سردرد، تهوع و دردهای شکمی. در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جویدنی ویتامین ث ۲۵۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: اسوه- ویتامین ث ۲۵۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص خط دار جویدنی با طعم پرتقال در بسته بندی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin C (Ascorbic Acid/ Sodium Ascorbate)	۲۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پودر سوکروز، PVP K30، سدیم ساخارین، Mannitol SD، منیزیم استئارات، اسانس پرتقال، ریبوفلاوین5 -سدیم فسفات، اتانول 96%
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقادیر توصیه شده روزانه ۱۰۰-۱۵۰۰ میلی‌گرم
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار بایستی به بیمارستان منتقل شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** این فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود.




- **نام فرآورده: قرص جویدنی ویتامین ث ۲۵۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: اسوه- ویتامین ث ۲۵۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی اسوه**
- **تولیدشده در: تهران، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص خط دار جویدنی بدون طعم در بسته بندی ۱۰۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۲۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آویسل 102، پودر سوکروز، منیزیم استئارات، آئروزیل 200، سوکرالوز
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقادیر توصیه شده روزانه ۱۵۰۰-۱۰۰ میلی‌گرم
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی در اسرع وقت با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار بایستی به بیمارستان منتقل شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** این فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود.

شرکت داروسازی اطلس تجارت سبحان





- **نام فرآورده:** ب کمپلکس فورته
- **نام تجاری/ برند:** -
- **شرکت صاحب پروانه:** Golden Score بلژیک
- **تولیدشده در:** اطلس تجارت سبحان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامینB۱ (تیامین هیدروکلراید)	۲۵mg (۱۶۶۶٪RDA)
ویتامینB۲ (ریبوفلاوین)	۲۵mg (۱۴۷۰٪RDA)
ویتامینB۳ (نیکوتینامید)	۲۵mg (۱۲۵٪RDA)
ویتامینB۴ (کولین بی تارترات)	۲/۵ mg
ویتامینB۵ (پنتوتنیک اسید)	۹mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامینB۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامینBV (بیوتین)	۱۵۰mcg (۵۰٪RDA)
ویتامینB۸ (اینوزیتول)	۱۰۰ mcg
ویتامینB۹ (فولیک اسید)	۴۰۰ mcg()
ویتامینB۱۰ (پارا آمینوبنروئیک اسید)	۲mg
ویتامینB۱۲ (سیانوکوبالامین)	۲۵ mcg (۴۱۶٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به کاهش استرس و افسردگی، کمک به حفظ سیستم عصبی، تامین کلیه ویتامین‌های گروهB
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان یا افرادی که دارو مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** این فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: بیوتین فورته**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: Golden Score بلژیک**
- **تولیدشده در: اطلس تجارت سبحان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی حاوی ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
زینک سیترات (زینک المنتال ۵mg)	۱۵/۶۲۵ mg (۵۰٪RDA)
بیوتین	۵۰۰۰ mcg (۱۶۶۶/۶۶٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان یا افرادی که دارو مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: زینک ۱۵ میلی‌گرم پلاس**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: Golden Score بلژیک**
- **تولیدشده در: اطلس تجارت سبحان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی حاوی ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
زینک سیترات (زینک المنتال ۱۵mg)	۴۶/۸۷۵mg (۱۵۰٪RDA)
ویتامین C	۱۰۰mg (۱۲۵٪RDA)
ویتامین B۱ (تیامین هیدروکلراید)	۱/۴۶mg (۱۳۲٪RDA)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱/۵۸mg (۱۱۲٪RDA)
ویتامین B۳ (نیاسین)	۹/۴۵mg (۵۹٪RDA)
ویتامین B۵ (پنتوتنیک اسید)	۹/۵mg (۱۵۸٪RDA)
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱/۶۹mg (۱۱۴٪RDA)
ویتامین B۷ (بیوتین)	۲۰۰mcg (۷۵٪RDA)
ویتامین B۹ (فولیک اسید)	۲۱۰mcg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۳mcg (۱۲۰٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** حاوی ویتامین C و برخی از ویتامین‌های گروه B ، کمک به افزایش سطح سیستم ایمنی، آنتی اکسیدان، کمک به حفظ سلامت پوست و مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در افراد مبتلا به نارسایی‌های حاد کلیوی با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و یا شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف: -**
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** بهتر است بین مصرف مکمل زینک با مکمل‌های آهن و کلسیم چند ساعت فاصله با شد .
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین ب۱۲ فورته**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: Golden Score بلژیک**
- **تولیدشده در: اطلس تجارت سبحان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۱۰۰۰ mcg (۳۳۳۳۳٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان،بیماران کلیوی و کبدی و یا افرادی که دارو را مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و یا شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: بیوتین**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: Golden Score بلژیک**
- **تولیدشده در: اطلس تجارت سبحان**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قوطـی حـاوی ۶۰ عـدد قـرص ۱۰۰۰ میکروگرمـی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
بیوتین	۱۰۰۰ mcg (۳۳۳۳٪RDA)

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، مونـو و دی گلیسـریدهای اسـید چـرب، منیزیـم اسـتئارات
- **رده سنی:** -
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه حفـظ سـلامت پوسـت، مـو و ناخـن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه یـک قـرص بـه همـراه مایعـات میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد.
در کـودکان و یـا افـرادی کـه دارو را مصـرف می‌کننـد بـا مشـورت پزشـک یـا داروسـاز مصـرف شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** در دوران بـارداری و یـا شـیردهی بـا نظـر پزشـک یـا داروسـاز مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** در صـورت بـروز و تـداوم هـر گونـه عـوارض ناخواسـته، مصـرف ایـن دارو را قطـع و بـه پزشـک مراجعـه نماییـد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و خنـک و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده:** قرص مخمر آبجو ۵۰۰ میلی‌گرم + ب کمپلکس + ویتامین E و C
- **نام تجاری/ برند:** Gold Levure
- **شرکت صاحب پروانه:** Golden Score بلژیک
- **تولیدشده در:** اطلس تجارت سبحان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قوطی حاوی ۳۰ عدد قرص
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
مخمر آبجو (Brewer's Yeast)	۵۰۰mg
ویتامین B۱ (تیامین هیدروکلراید)	۱/۴mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱/۶mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۳ (نیکوتینامید)	۱۸mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۵ (پنتوتنیک اسید)	۶mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۷ (بیوتین)	۱۵۰mcg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۹ (فولیک اسید)	۲۰۰mcg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۱mcg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین C	۶۰mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین E	۱۰mg (۱۰۰٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی. آنتی اکسیدان، کمک به سلامتی و شادابی پوست و مو و ناخن، کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان، بیماران کلیوی و کبدی و یا افرادی که دارو را مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و یا شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: مگ گولد فورته (Mag Gold Forte)**
- **شرکت صاحب پروانه: Golden Score بلژیک**
- **تولیدشده در: اطلس تجارت سبحان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی حاوی ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
منیزیم (اکساید)	۳۷۵ mg (۱۰۰٪RDA)
ویتامین B۶	۶ mg (۴۲۹٪RDA)
فولیک اسید (ویتامین B۹)	۵۰۰ mcg (۲۳۸٪RDA)
ویتامین B۱۲	۷٫۵ mcg (۳۰۰٪RDA)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک اسپاسم و گرفتگی و رفع خستگی عضلات، کمک به عملکرد سیستم عصبی و قلب و عروق، کمک به حفظ سلامت دندان‌ها و استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان، بیماران کلیوی و کبدی و یا افرادی که دارو را مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و یا شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص مخمر آبجو - (Saccharomyces cerevisiae) (Bewer's Yeast)
- **نام تجاری/ برند:** -
- **شرکت صاحب پروانه:** Bioclinic Canada
- **تولیدشده در:** کارخانه سونا طب پارسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** هر قوطی حاوی ۶۰ عدد قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قوطی
Vitamin B1 (Thiamine)	۷ mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	۳ mg
Vitamin B3 (Nicotinamide) (3-Pyridinecarboxamide) Vitamin B5 (Pantothenic Acid)	۲۵ mg
Vitamin B5 (Pantothenic Acid)	۴ mg
Vitamin B6 (Pyridoxine)	۳ mg
Vitamin B9 (Folic Acid)	۱/۴۵ mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	۰/۶ mcg
Vitamin H (Biotin)	۸۲ mcg
Calcium (Ca)	۸۵ mg
Potassium (K)	۹۲۰ mg
Magnesium (Mg)	۱۲۰ mg
Sodium (Na)	۱۹ mg
Chromium (Cr)	۱۷ mcg
Iron (Fe)	۵ mg
Copper (Cu)	۲۷۰ mcg


جز	مقدار در هر قوطی
Manganes (Mn)	۰/۴ mg
Zinc (Zn)	۶ mg
Phosphorus (P)	۶۵۰ mg
Arginine ((S) -2Amino--5-3methylpentanoic acid)	۱/۷ g
Isoleucine ((-2-(25,35Amino-3-methylpentanoic aicd)	۱/۱ g
Leucine ((S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid)	۱/۹ g
Lysine ((S)-2,6- Diaminohexanoic acid)	۳ g
Methionine (2-Amino-4-(methyltio)-butyric acid)	۰/۶ g
Phenylalanine ((S)-2- Amino-3-phenylpropanoic acid)	۱/۵ g
Threonine ((25,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid)	۱/۷ g

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** منبع تامین ویتامین‌های گروه ب، کاهش سطح کلسترول خون، تنظیم قند خون،
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ الی ۶ قرص به همراه مایعات میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان و یا افرادی که دارو را مصرف می‌کنند با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
در صورتی که پوشش درب آسیب دیده مصرف نشود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و یا شیردهی با نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** افرادی که به مخمر حساسیت دارند از مصرف این محصول اجتناب کنند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت بروز و تداوم هر گونه عوارض ناخواسته، مصرف این دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

MOFID

MOFID DAROU SALAMAT CO.

شرکت داروسازی آفشن





- **نام فرآورده: کلاژل آفشن کلاژن پپتید**
- **نام تجاری/ برند: ColaGel® Afshan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آفشن (سهامی خاص) ایران**
- **تولیدشده در: کارخانه مفید دارو سلامت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ ساشه ۵ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Calories	۱۸ kcal
Protein	۴/۵ g
Fat	۰
Sugar	۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه محتویات یک ساشه را در یک لیوان آب، آبمیوه، شیر، سوپ یا اسموتی حل و میل نمایید. این پودر در مایعات گرم و سرد به‌خوبی حل می شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست
بهترین زمان برای مصرف قبل از تاریخ انقضا است. در صورت مصرف هم‌زمان داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. در صورت داشتن مشکلات کبدی یا کلیوی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** کلاژن پپتید برای زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است. کلاژن هیدرولیز شده در افرادی که به محصولات حاوی این ترکیب حساسیت دارند، منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: کلاژل آفشن کلاژن پپتید**
- **نام تجاری/ برند: ColaGel® Afshan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت آفشن (سهامی خاص) ایران**
- **تولیدشده در: کارخانه مفید دارو سلامت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ ساشه ۵ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Calories	۲۰ kcal
Protein	۴ g
Fat	۰
Sugar	۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت غضروف مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه محتویات یک ساشه را در یک لیوان آب، آبمیوه، شیر، سوپ یا اسموتی حل و میل نمایید. این پودر در مایعات گرم و سرد به‌خوبی حل می شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
بهترین زمان برای مصرف قبل از تاریخ انقضا است. در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. در صورت داشتن مشکلات کبدی یا کلیوی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** کلاژن پپتید برای زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است. کلاژن هیدرولیز شده در افرادی که به محصولات حاوی این ترکیب حساسیت دارند، منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دردمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگه داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** کلاژل آفشن کلاژن پپتید
- **نام تجاری/ برند:** ColaGel® Afshan
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آفشن (سهامی خاص) ایران
- **تولیدشده در:** کارخانه مفید دارو سلامت ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ ساشه ۵ گرمی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Calories	۱۸ kcal
Protein	۴/۵ g
Fat	۰
Sugar	۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت تاندون و رباط
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه محتویات یک ساشه را در یک لیوان آب، آبمیوه، شیر، سوپ یا اسموتی حل و میل نمایید. این پودر در مایعات گرم و سرد به‌خوبی حل می شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
بهترین زمان برای مصرف قبل از تاریخ انقضا است. در صورت مصرف هم‌زمان داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. در صورت داشتن مشکلات کبدی یا کلیوی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** کلاژن پپتید برای زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است. کلاژن هیدرولیز شده در افرادی که به محصولات حاوی این ترکیب حساسیت دارند، منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود - دور از دسترس کودکان




- **نام فرآورده:** کلاژل آفشن کلاژن پپتید
- **نام تجاری/ برند:** ColaGel® Afshan
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت آفشن (سهامی خاص) ایران
- **تولیدشده در:** کارخانه مفید دارو سلامت ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ ساشه ۲/۵ گرمی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Calories	۱۰ kcal
Protein	۲ g
Fat	۰
Sugar	۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه محتویات یک ساشه را در یک لیوان آب، آبمیوه یا شیر حل و میل نمایید. این پودر در مایعات گرم و سرد به‌خوبی حل می شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست
بهترین زمان برای مصرف قبل از تاریخ انقضا است. در صورت مصرف هم‌زمان داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. در صورت داشتن مشکلات کبدی یا کلیوی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** کلاژن پپتید برای زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است. کلاژن هیدرولیز شده در افرادی که به محصولات حاوی این ترکیب حساسیت دارند، منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگه داری شود.- دور از دسترس کودکان

Nature's Plenty
Pharmaceutical

شرکت داروسازی افق تدبیر سلامت





- **نام فرآورده: ایمیون اسنشال**
- **نام تجاری/ برند: IMMUNE ESSENTIAL**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول پلت در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول پلت
Vitamin C	۴۰۰ mg
Zinc	۱۰ mg
Selenium	۵۵ µg
Vitamin D۳	۱۰۰۰ IU
Vitamin E	۱۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Talc, Sugar Sphere, Povidon (pvp k-30), HPMC, Purified water, Ethyl Cellulose.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی‌اکسیدان و کمک به تقویت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول پلت همراه با آب کافی.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با هر نوع دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص، قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در کودکان و در زمان بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود. در صورت آسیب درپوش ظرف یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در زمان بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کپسول ویتافرو
- **نام تجاری/ برند:** VITA FERRO
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** کارخانه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول پلت در یک قوطی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰ mg
Vitamin B۶ (Pyridoxine Hcl)	۵ mg
Folic Acid	۵۰۰ mcg
Vitamin B۱۲ (Cyanocobalamin)	۱۰ mcg
Iron (Bis-Glycinate)	۴۵ mg
Zinc (Gluconate)	۱۲ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Microcrystalline Cellulose, Metocel, Hydroxypropyl Methylcellulose , Stearic Acid, Magnesium stearate, Silicon Dioxide, (HPMC,PEG Tablet film coating).
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تشکیل و بهبود عملکرد سلول‌های قرمز خون و کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه ۱ کپسول همراه غذا و یا طبق دستور پزشک.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک، خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص کی بون پلاس**
- **نام تجاری/ برند: Nature's Plenty - K Bone Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Calcium	۲۵۰ mg
Vitamin D۳	۴۰۰ IU
Magnesium	۱۵۰ mg
Vitamin K۲	۴۵ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکارالوز، اسید سیتریک، پی وی پی، رنگ خوراکی، اسانس مجاز، ال لئوسین.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو عدد قرص همراه با یک لیوان آب (بهتر است همراه با وعده غذایی باشد) و یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت مصرف همزمان با هر نوع دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص و در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در صورت آسیب درپوش یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت نارسایی کلیوی و یا سنگ کلیه زیرنظر پزشک متخصص مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان**
- **نام تجاری/ برند: Nature's Plenty - Kids MULTI VITAMIN**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان با طعم توت فرنگی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Calcium	۲۰۰ mg
Vitamin C	۱۰۰ mg
Vitamin B۳	۱۴/۵ mg
Vitamin B۵	۹ mg
Vitamin E	۷/۴ IU
Vitamin B۲	۲ mg
Vitamin B۱	۱/۲۵ mg
Vitamin B۶	۱/۲ mg
Vitamin A	۹۰۰ IU
Vitamin B۹	۲۰۰ mcg
Biotin	۷۰ mcg
Vitamin D۳	۴۰۰ IU
Vitamin B۱۲	۵ .۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکرالوز، اسید سیتریک، سدیم بی کربنات، لاکتوز مونو هیدرات، پوویدون کا 30، اسانس توت فرنگی، لئوسین.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌های مورد نیاز کودکان.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۴ سال روزانه یک عدد قرص جوشان را در آب حل کرده و یا و یا طبق دستور پزشک مصرف نمایند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس کودکان زیر ۴ سال نگهداری شود. در صورت مصرف هم زمان با هر نوع دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان منیزیم و ویتامین ب ۶**
- **نام تجاری/ برند: Nature's Plenty - Magnesium + B6**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان با طعم لیمو و پرتقال**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Magnesium	۲۵۰ mg
Vitamin B۶	۱/۴ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکارالوز، سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، پوویدن k30، ال لئوسین، اسانس مجاز خوراکی.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص و در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود در صورت آسیب درپوش یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ با طعم لیمو
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Vitamin C - ۵۰۰ mg - Lemon

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۵۰۰ میلی‌گرمی با طعم لیمو
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactose Monohydrate, Lemon Essence, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ تا ۲ عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در صورت مصرف همزمان با هرگونه دارو و ابتلا به هرگونه بیماری خاص قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. در صورت آسیب درپوش ظرف از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث ۵۰۰ با طعم پرتقال
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Vitamin C - ۵۰۰ mg - Orange

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۵۰۰ میلی‌گرمی با طعم پرتقال
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactose Monohydrate, Edible Essence, Povidone K30, L-Leucine.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث. کمک به تسریع روند بهبود زخم، کمک به رشد و ترمیم بافت‌ها.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ تا ۲ عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ با طعم لیمو
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Vitamin C - ۱۰۰۰ mg - Lemon

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۱۰۰۰ میلی‌گرمی با طعم لیمو
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactose Monohydrate, Lemon Essence, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با هرگونه دارو و ابتلا به هرگونه بیماری خاص قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. در صورت آسیب درپوش ظرف از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ با طعم زعفران**
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty- Vitamin C- ۱۰۰۰mg- Saffron

- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان ۱۰۰۰ میلی‌گرمی با طعم زعفران**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Saffron Flavor, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water, Color.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با هر گونه دارو و ابتلا به هرگونه بیماری خاص قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. در صورت آسیب درپوش ظرف از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ با طعم پرتقال
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Vitamin C ۱۰۰۰ mg - Orange

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۱۰۰۰ میلی‌گرمی با طعم زعفران
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Saffron Flavor, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water, Color.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با هر گونه دارو و ابتلا به هرگونه بیماری خاص قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. در صورت آسیب درپوش ظرف از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** منیزیم در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث با طعم توت فرنگی
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Vitamin C ۱۰۰۰ mg

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۱۰۰۰ میلی‌گرمی با طعم توت فرنگی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Vitamin C (Ascorbic Acid)	۱۰۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Strawberry Essence, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و کمک به سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان در یک لیوان آب حل و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان ویتامین ث + زینک با طعم پرتقال
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - ULTRA C + ZINC

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان ۵۰۰ میلی‌گرمی با طعم گیلاس
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
Ascorbic Acid	۵۰۰ mg
Zinc (Zinc Gluconate ۱۰V/۱۵ mg)	۱۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sucralose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactose Monohydrate, Edible Essence, Povidone K30, L-Leucine, Purified Water.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان و کمک به سلامت پوست، مو و ناخن و کمک به سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

- **نام فرآورده: کپسول زینک ب کمپلکس**
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty - Zinc B Complex

- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: تهران - ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد کپسول پلت**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر قرص جوشان
Zinc (as Zinc Citrate)	۱۵ mg
Vitamin C	۲۰۰ mg
Vitamin B۱	۲۰ mg
Vitamin B۲	۵ mg
Vitamin B۶	۶ mg
Vitamin B۱۲	۲۵ mcg
Biotin	۱۰۰۰ mcg
Folic Acid	۶۵۰ mcg
Pantothenic Acid	۵ mg
Niacin	۳۰ mg
Vitamin E	۱۰ mg
Magnesium	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکرالوز، سیتریک اسید، لاکتوز مونو هیدرات، سدیم بی کربنات، پوویدن k30، لئوسین، اسانس مجاز خوراکی، آب پیوریفاید.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی و کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد کپسول پلت همراه با یک لیوان آب میل نمایید و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت مصرف همزمان با هر نوع دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص و در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود در صورت آسیب درپوش یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای محیط در جای خشک و خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** مولتی ویتامین مینرال - بزرگسالان
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty -MULTIVITAMINS & MINERALS-ADULTS

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول پلت
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Lodine (Potassium Iodide)	۱۵۰ µg
Iron (Iron-Bis Glysinate)	۹ mg
Magnesium (Magnesium Oxide)	۳۰ mg
Copper	۰/۱۵ mg
Manganese	۱/۸ mg
Zinc (Zinc Gluconate)	۵ mg
Calcium (Calcium Carbonate)	۵۰ mg
Vitamin C	۸۰ mg
Folic Acid	۴۰۰ µg
Thiamin	۱/۱ mg
Riboflavin	۱/۱ mg
Nicotinamide	۱۲ mg
Pantothenic Acid	۶ mg

جز	مقدار در هر کپسول
Vitamin B۶	۱/۴ mg
Biotin	۵۰ µg
Vitamin B۱۲	۲/۵ µg
Beta Carotene (Vitamin A)	۸۰۰ IU
Vitamin E	۱۰ mg
Cholecalciferol (Vitamin D۳)	۴۰۰ IU
Menaquinone (Vitamin K۲)	۲۵ µg
Selenium (Sodium Selenite)	۵۵ µg
Molyddenum (Sodium Molybdate)	۴۵ µg
Chromium (Chromium Chloride)	۲۵ µg
Q۱۰	۲ mg
PABA	۲/۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Talc, Sugar Spheres, HPMC, Purified Water, Ethyl Cellulose, Isopropyl Alkohol, Shellac.
- **رده سنی:** بزرگسال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن برای بزرگسالان.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** به عنوان مکمل برای بزرگسالان روزانه ۱ عدد کپسول پلت، یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف هم‌زمان با هر گونه دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص و در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در صورت آسیب درپوش ظرف یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** مولتی ویتامین و مینرال - در دوران بارداری و شیردهی
- **نام تجاری/ برند:** Nature's Plenty-MULTIVITAMINS & MINERALS-PRENATAL
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول پلت
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Vitamin A	۲۵۰۰ IU
Vitamin E	۱۰ IU
Vitamin D۳	۸۰۰ IU
Vitamin K۲	۲۵ µg
Ascorbic Acid	۱۰۰ mg
Vitamin B۱	۱/۴ mg
Riboflavin	۱/۴ mg
Nicotinamide	۱۸ mg
Vitamin B۵	۶ mg
Vitamin B۶	۸ mg
Biotin	۵۰ µg
Folic Acid	۸۰۰ µg
Cyanocobalamin	۹ µg

جز	مقدار در هر کپسول
Iodine (Potassium Iodide)	۲۲۰ µg
Iron (Dried Ferrous Sulfate)	۲۷ mg
Magnesium (Magnesium Sulfate)	۵۰ mg
Copper	۱ mg
Zinc (Zinc Sulfate)	۱۲ mg
Manganese	۲ mg
Selenium (Sodium Selenite)	۶۰ µg
Calcium (Calcium Carbonate)	۳۵ mg
Chromium (Chromium Chloride)	۳۰ µg
Molybdenum (Sodium Molybdate)	۵۰ µg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sugar Spheres, Stearic Acid, Talc, PVP, K30, Ethyl Cellulose, Isopropyl Alkohol, Shellac.
- **رده سنی:** خانم های باردار و شیرده
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن بانوان در دوران قبل، حین و بعد از بارداری و شیردهی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** به عنوان مکمل برای بانوان روزانه ۱ عدد کپسول پلت همراه با آب کافی، یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف هم‌زمان با هرگونه دارو و یا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل‌دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در صورت آسیب درپوش ظرف یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** مولتی ویتامین و مینرال - خانم‌های بالای ۵۰ سال
- **نام تجاری/ برند:**

Nature's Plenty- MULTIVITAMINS & MINERALS- WOMEN 50+

- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت افق تدبیر سلامت
- **تولیدشده در:** تهران - ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول پلت
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Iron (Ferrous Sulfate)	mg ۱۰
Magnesium (Magnesium Sulfate)	mg ۳۰
Copper	mg ۱
Manganese	mg ۰/۵
Zinc (Zinc Sulfate)	mg ۱۵
Calcium (Calcium Carbonate)	۵۰ mg
Vitamin C	۶۰ mg
Folic Acid	µg ۴۰۰
Thiamin	mg ۴/۵
Riboflavin	۴ mg
Nicotinamide	۲۰ mg

جز	مقدار در هر کپسول
Pantothenic Acid	۶ mg
Vitamin B۶	۴ mg
Biotin	µg ۵۰
Vitamin B۱۲	µg ۵
Beta Carotene (Vitamin A)	۲۳۰۰ IU
Vitamin E	۱۰ IU
Cholecalciferol (Vitamin D۳)	۶۰۰ IU
Selenium (Sodium Selenite)	۲۰ µg
Molybdenum (Sodium Molybdate)	۴۵ µg
Chromium (Chromium Chloride)	۳۵ µg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** Sugar Spheres, HPMC, Ethyl Cellulose, Isopropyl Alkohol, Shellac.
- **رده سنی:** خانم‌های بالای ۵۰ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن خانم‌های بالای ۵۰ سال.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** به عنوان مکمل برای بانوان روزانه ۱ عدد کپسول پلت، یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت مصرف هم زمان با هرگونه دارو ویا در صورت ابتلا به هرگونه بیماری خاص با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در صورت آسیب دریوش ظرف یا جعبه از مصرف خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: اولترا بیت - بیوتین ۵۰۰۰ میکروگرم**
- **نام تجاری/ برند:**

ULTRA BIT BIOTIN 5000 MCG


- **شرکت صاحب پروانه: شرکت افق تدبیر سلامت**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سونا طب پارسه**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Biotin	۵۰۰۰ mcg

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** Microcrystalline Cellulose, Modified Cellulose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تقویـت پوسـت، مـو و ناخـن.
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد کپسـول بـه همـراه غـذا و یـا طبـق دسـتور پزشـک میـل نماییـد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد. از مصـرف ایـن مکمـل در زمـان بـارداری و شـیردهی خـودداری فرماییـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** از مصـرف ایـن مکمـل در زمـان بـارداری و شـیردهی خـودداری فرماییـد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای اتـاق و دور از دسـترس کـودکان نگهـداری شـود.

PHARMED EXXON

شرکت داروسازی اکسون فارمد





- **نام فرآورده: اولترا-د (Ultra-D)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۶۰ عددی (۳ بلیستر ۲۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین D۳ (به صورت کوله کلسیفرول)	۱۰۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** پیشگیری و رفع کمبود ویتامین D، حفظ سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها، بافت‌ها و کمک به تنظیم عملکرد سیستم ایمنی بدن، کاهش رشد سلول‌های سرطانی، کنترل عفونت‌ها و کاهش التهاب، کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲، مولتیپل اسکلروزیس (MS)، و برخی از انواع سرطان، بهبود خلق و خو و پیشگیری از افسردگی، کنترل فشار خون بالا، کاهش شدت علائم بیماری کووید-۱۹، کاهش ریسک تولد نوزاد نارس
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** از مصرف این مکمل در زمان بارداری و شیردهی خودداری فرمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:**

۱. آلومینیوم: آلومینیوم در بیشتر آنتی‌اسیدها وجود دارد. ویتامین دی می‌تواند میزان جذب آلومینیوم در بدن را افزایش دهد که ممکن است در مصارف طولانی مدت، برای افرادی که بیماری کلیوی دارند مشکل ساز شود. توصیه می‌شود. ویتامین دی را دو ساعت قبل یا چهار ساعت بعد از آنتی‌اسید مصرف کنید.

۲. داروهای دیگوکسین (Digoxin) با ویتامین دی تداخل دارند: مصرف ویتامین دی همراه با دیگوکسین ممکن است اثرات دیگوکسین را افزایش دهد و منجر به ضربان قلب نامنظم شود. اگر از دیگوکسین استفاده می‌کنید، قبل از مصرف مکمل ویتامین دی با پزشک خود مشورت کنید.

۳. مصرف مقادیر زیاد ویتامین دی همراه با داروهای دیلتیازم (Diltiazem) و وراپامیل (Verapamil) ممکن است اثربخشی دارو را کاهش دهد. قبل از مصرف با پزشک معالج مشورت کنید.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سیترامگ ب۶ (Citramag B6)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۶۰ عددی (۳ بلیستر ۲۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سه قرص
منیزیم (به صورت سیترات)	۳۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۳۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون K30
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی، کمک به کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش علائم سندروم پیش از قاعدگی (PMS)، کمک به درمان میگرن، بهبود علائم اختلال بیش فعالی کم توجهی (ADHD)، حفظ سلامت قلب و حفظ فشار خون طبیعی، درمان اختلالات گوارشی، بهبود خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه سه قرص یا مقدار توصیه شده توسط پزشک، ترجیحا همراه با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در بیماران فنیل کتونوریا و بیماری میوکارد با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** از مصرف این مکمل در زمان بارداری و شیردهی خودداری فرمایید.
- **موارد منع مصرف:** نارسایی شدید کلیوی
- **عوارض جانبی احتمالی:** منیزیم با دوز کمتر از ۳۵۰ میلی‌گرم در روز برای بزرگسالان، ایمن و بی‌خطر است. در بعضی از افراد، منیزیم ممکن است حالت تهوع، استفراغ یا اسهال ایجاد شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:**
مصرف مکمل منیزیم ممکن است اثر برخی آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش دهد، پس بهتر است با رعایت فاصله ۲ تا ۴ ساعت مصرف شوند.
داروهای پرفشاری خون: از آنجایی که مصرف منیزیم ممکن است فشار خون را پایین بیاورد، مصرف همزمان با داروهای کاهنده فشار خون ممکن منجر به کاهش بیش از حد فشار خون شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: زینک پلاس (Zinc Plus)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت- ۲۰۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱۰ میلی‌لیتر
ویتامین B1 (به صورت تیامین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B2 (به صورت ریبوفلاوین)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B3 (به صورت نیاسین آمید)	۱۲ میلی‌گرم
ویتامین B5 (به صورت کلسیم پانتوتنات)	۴ میلی‌گرم
ویتامین B6 (به صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B12 (به صورت سیانوکوبالامین)	۴ میکروگرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
ویتامین C (به صورت آسکوربیک اسید)	۸۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۳۰۰ میکروگرم
زینک (به صورت زینک سیترات)	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکاروز، آب خالص، سدیم بنزوات، طعم‌دهنده پرتقالی، کربوکسی متیل سلولز و اسید سیتریک
- **رده سنی:** کودکان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی، رشد قد در کودکان، محافظت از بدن در برابر بیماری‌ها و آلرژی‌ها، خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی، پیشگیری از کمبود روی، افزایش سطح انرژی روزانه، درمان اسهال
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

۱ تا ۸ سال: یک بار در روز، هر بار ۵ میلی‌لیتر
۹ تا ۱۸ سال: دو بار در روز، هر بار ۵ میلی‌لیتر
۱۹ تا ۵۰ سال: سه بار در روز، هر بار ۵ میلی‌لیتر

قبل از مصرف خوب تکان دهید. شربت زینک اگر حداقل ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف شود بیشترین تاثیر را دارد. با این حال، اگر شربت زینک باعث ناراحتی معده شد، می‌تواند همراه با غذا مصرف شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.

در صورت مصرف آنتی بیوتیک‌ها، آن را دو ساعت قبل یا چهار ساعت پس از مصرف زینک استفاده نمایید.

در صورت مصرف دارو یا مکمل‌های دیگر قبل از مصرف این فرآورده به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** جهت مصرف در دوران بارداری و شیردهی با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف بیش از حد زینک (بیش از ۴۰ میلی‌گرم در روز) می‌تواند منجر به عوارض گوارشی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، و دل‌درد شود. مصرف طولانی‌مدت دوزهای بالای زینک می‌تواند باعث کمبود مس در بدن و بروز مشکلاتی مانند ضعف عضلانی، بی‌حسی، و سوزش در دست‌ها و پاها شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فروکامپلیت (Ferro Complete)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
آهن (به صورت فروس گلایسین سولفات)	۴۵ میلی‌گرم
اسید فولیک	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۱۰ میکروگرم
ویتامین B۶	۵ میلی‌گرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
روی (به صورت سولفات)	۱۲ میلی‌گرم
مس	۱۰۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تامین ویتامین ب۱۲ مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب، پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن، کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن، پشتیبانی از سلامت عمومی و کاهش خستگی، پشتیبانی از سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول یا مقدار توصیه شده توسط پزشک همراه با یک لیوان آب میل شود. از جویدن کپسول خودداری گردد.

بهترین زمان مصرف مکمل آهن معمولاً با معده خالی، یعنی یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا است. با این حال، اگر مصرف آهن با معده خالی باعث مشکلات گوارشی مانند تهوع یا دل‌درد می‌شود، می‌توانید آن را همراه با یک وعده غذایی کم‌چرب مصرف کنید.
ویتامین C موجود در فرمولاسیون به افزایش جذب آهن کمک می‌کند، بنابراین نیازی به مصرف جداگانه ویتامین C نیست.
بهتر است از مصرف مکمل‌های آهن با لبنیات، قهوه، چای یا سایر مواد غذایی حاوی کلسیم اجتناب کنید، زیرا کلسیم می‌تواند جذب آهن را کاهش دهد.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** آهن برای زنان باردار و شیرده وقتی دوز کمتر از حد مجاز روزانه (UL) یعنی ۴۵ میلی‌گرم در روز آهن المنتال استفاده می‌شود کاملا بدون خطر است و در آن هیچ‌گونه عوارض جانبی مضر پیش بینی نمی‌شود. دوزهای بالاتر باعث عوارض جانبی گوارشی مانند تهوع و استفراغ و افزایش سطح هموگلوبین می‌شود. سطح بالای هموگلوبین در دوران بارداری با زایمان زودرس و کم‌وزنی نوزاد مرتبط است، بنابراین توصیه می‌شود مصرف آهن در دوران بارداری و شیردهی با نظارت پزشک صورت گیرد.

● **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: ۱.** مصرف همزمان مکمل آهن با تتراسایکلین و بیس فسفوناتها می‌تواند جذب هر دو را کاهش دهد. تتراسایکلین‌ها (مانند داکسی‌سایکلین) و بیس‌فسفونات‌ها (مانند آلندرونات) باید با فاصله از آهن مصرف شوند تا جذب هر دو بهینه شود.
۲. کلسیم، منیزیم و آلومینیوم (که در آنتی‌اسیدها یافت می‌شوند) می‌توانند جذب آهن را کاهش دهند. بنابراین، بهتر است مصرف آهن و این مواد معدنی حداقل با فاصله زمانی چند ساعت از هم انجام شود تا از تداخل در جذب جلوگیری شود.
۳. فلوروکینولون‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، نورفلوکساسین): جذب این آنتی‌بیوتیک‌ها در صورت مصرف همزمان با مکمل آهن به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین، توصیه می‌شود که فاصله زمانی حداقل ۲ ساعت بین مصرف مکمل آهن و این داروها رعایت شود.
۴. داروهای ضد سرطان (سیتواستاتیک‌ها)، سولفونامیدها، داروهای ضد صرع (آنتی اپی‌لپتیک‌ها)، و باربیتورات‌ها: این داروها می‌توانند جذب فولیک اسید را مختل کنند، بنابراین باید با فاصله از مکمل‌های حاوی فولیک اسید مصرف شوند. مصرف همزمان این داروها و فولیک اسید ممکن است تأثیر فولیک اسید را کاهش دهد.

● **تداخلات غذایی:** ترکیبات موجود در برخی مواد غذایی گیاهی (شامل فیتات‌ها، اگزالات و فسفات) و همچنین ترکیبات موجود در چای، شیر، قهوه و نوشیدنی‌های گازدار مانع جذب آهن می‌شوند.

● **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** حد مجاز روزانه (UL) معادل ۴۵ میلی‌گرم در روز آهن المنتال

● **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -

● **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده: زینک پلاس (Zinc Plus)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۶۰ عددی (۳ بلیستر ۲۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
زینک (به صورت سولفات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B1	۱/۳ میلی‌گرم
ویتامین B2	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B12	۳ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
نیکوتینامید	۹ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
ویتامین B6	۱/۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم فسفات دی بازیک، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، اینستامویست سفید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، رنگ خوراکی طلایی
- **رده سنی:** کودکان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی، کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب، اختلال کمبود روی (Acrodermatitis Eenteropathica)، اسهال، آکنه (جوش)، اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD)، کمک به افزایش انرژی و کاهش خستگی، حفظ عملکرد شناختی و عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص یک ساعت قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از غذا به همراه یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری و شیردهی مطابق با دستور پزشک مصرف شود.

روی در بیشتر زنان باردار و شیرده وقتی که در مقادیر توصیه شده روزانه (RDA) استفاده می‌شود، به احتمال زیاد ایمن است.

زنان باردار بالای ۱۸ سال نباید بیش از ۴۰ میلی‌گرم روی در روز مصرف کنند. زنان باردار ۱۴ تا ۱۸ ساله نباید بیش از ۳۴ میلی‌گرم در روز مصرف کنند.

زنان شیرده بیش از ۱۸ سال نباید بیش از ۴۰ میلی‌گرم روی در روز مصرف کنند.

زنان شیرده در سنین ۱۴ تا ۱۸ سال نباید بیش از ۳۴ میلی‌گرم در روز مصرف کنند.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: کلسیترا (Calcitra)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
سیترات کلسیم	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۲۵۰ واحد بین‌المللی
منیزیم (به صورت اکساید)	۸۰ میلی‌گرم
زینک (به صورت سولفات)	۷/۵ میلی‌گرم
مس	۱ میلی‌گرم
منگنز	۱ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلایکول 400، تیتانیوم دی اکساید {فاقد گلوتن، رنگ و طعم دهنده مصنوعی، مخمر و نگه دارنده}

توجه: این فرآورده فاقد گلوتن، رنگ و طعم دهنده مصنوعی، مخمر و نگهدارنده می‌باشد.

- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها، جبران کمبود کلسیم، حفظ سلامت پوست، مو و ناخن‌ها، تقویت تراکم استخوانی و حمایت از ساختار اسکلتی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ قرص یا مطابق دستور پزشک همراه با غذا یا بدون غذا با یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق نظر پزشک می‌تواند مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** تنها منع مصرف مکمل کلسیم با ملح سیترات، استفاده در بیماران دیالیزی می‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در مطالعات انجام شده برای این نوع مکمل کلسیم عارضه‌ای گزارش نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** این فرآورده می‌تواند با آنتی‌بیوتیک‌ها (مانند تتراسایکلین‌ها و فلوروکینولون‌ها)، داروهای ضدالتهاب و مسکن (کورتیکواستروئیدها) و داروهای پیشگیری از پوکی استخوان (مانند بیس‌فسفونات‌ها) تداخل داشته باشد. توصیه می‌شود این مکمل حداقل با فاصله ۲ تا ۴ ساعت از مصرف این داروها استفاده شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مکس ویژن (MaxVision)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A	۲۶۶۶ واحد بین‌المللی
ویتامین B۱	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۱/۶ میلی‌گرم
ویتامین B۳	۱۸ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۲ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۴ میکروگرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۰ میلی‌گرم
زینک	۷/۵ میلی‌گرم
سلنیوم	۳۵ میکروگرم
لوتئین	۱۰ میلی‌گرم
زاگزانتین	۱ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به‌عنوان آنتی‌اکسیدان و کمک به حفظ سلامت چشم، کاهش خطر ابتلا به بیماری ماکولای وابسته به سن (AMD) یا تخریب لکه زرد شبکیه، کاهش خطر ابتلا به آب مروارید و رتینوپاتی دیابتی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول همراه با غذای اصلی با مقدار کافی آب مصرف شود.
طول دوره مصرف تا زمان مورد نیاز می‌تواند ادامه یابد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در مورد دیگر مکمل‌های غذایی که در حال حاضر مصرف می‌کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** اطلاعات کافی در مورد استفاده از لوتئین و زاگزانتین در دوران بارداری یا شیردهی موجود نیست. پیش از مصرف، با پزشک خود مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** هیچ‌گونه منع مصرفی وجود ندارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** لوتئین و زاگزانتین هیچ تداخل شدید، جدی، متوسط یا خفیف با سایر داروها ندارند.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- نام فرآورده: مِنوپوز (Menopause)
- نام تجاری/ برند: Suprabion
- شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قـرص روکـش‌دار- ۳۰ عـددی (۳ بلیسـتر ۱۰ تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D	۱۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (منبع طبیعی)	۱۵ میلی‌گرم
ویتامین C	۵۰ میلی‌گرم
تیامین (ویتامین B1)	۱/۴ میلی‌گرم
ریبوفلاوین (ویتامین B2)	۱/۶ میلی‌گرم
نیاسین (ویتامین B۳)	۱۸ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۲ میلی‌گرم
فولاسین (فولیک اسید)	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۴ میکروگرم
ویتامین K	۵۰ میکروگرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۳۰ میلی‌گرم
آهن	۲۰ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
مس	۱۰۰۰ میکروگرم
سلنیوم	۱۰۰ میکروگرم
کروم	۵۰ میکروگرم
جنیستئین (Genistein)	۳۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز، نشاسته، سیلیکون دی‌اکساید، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی‌اتیلن گلایکول ۴۰۰، تیتانیوم دی‌اکساید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** سرشار از آنتی‌اکسیدان برای حفظ سلامت و بهبود علائم یائسگی شامل گرگرفتگی، تعریق شبانه، خشکی واژن، نوسانات خلقی (اضطراب، ضعف و افسردگی)، کاهش احتمال پوکی استخوان، سلامت پوست و مو، افزایش انرژی و حفاظت از قلب، کاهش ریسک اضافه وزن، دیابت و برخی از سرطان‌های ناشی از یائسگی، تنظیم فعالیت‌های هورمونی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص روزانه همراه غذا و آب فراوان میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.

در صورتی‌که تحت مراقبت پزشکی هستید یا در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی با پزشک مشورت نمائید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت استفاده از دوز توصیه شده عوارض جانبی مشاهده نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آنتی‌بیوتیک‌ها (تتراسایکلین‌ها و کینولون‌ها) با فاصله دو ساعت از این محصول استفاده شوند. در صورت مصرف وارفارین با پزشک مشورت نمایید.
- **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده: موبیفلکس (Mobiflex)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
گلوکزآمین هیدروکلراید	۱۰۰۰ میلی‌گرم
کندرویتین سولفات	۴۰۰ میلی‌گرم
متیل سولفونیل متان (MSM)	۵۰۰ میلی‌گرم
عصاره رزهیپ	۱۰۰ میلی‌گرم
پودر ریشه زنجبیل	۸۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۸۰۰ واحد بین‌المللی
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۲۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
منگنز	۴ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۲۰ میکروگرم
زینک (به صورت اکساید)	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلایکول ۴۰۰، کلوئیدال سیلیکون دی اکسید، پلی وینیل پیرولیدون، اینستا مویست، رنگ خوراکی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مفاصل، استئوآرتریت (آرتروز)، آرتریت روماتوئی (روماتیسم مفصلی)، آسیب‌های ورزشی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ قرص همراه با غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
قرص را به همراه آب یا نوشیدنی خنک میل نمایید و از جویدن آن خودداری کنید.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده اجتناب کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
بیماران مبتلا به دیابت و کسانی که داروی ضد انعقاد (رقیق کننده خون) استفاده می‌کنند قبل از مصرف فرآورده با پزشک مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به این موارد، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید؛ اختلالات خونریزی یا لخته شدن خون مانند هموفیلی، آسم یا آلرژی، سرطان پروستات، کلسترول بالا، فشار خون بالا
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی، بدون مشورت با پزشک از مصرف این فرآورده خودداری کنید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** نفخ، دل درد، تهوع، اسهال، یبوست، خارش و تحریک پوست
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** اگر از داروهای زیر استفاده می‌کنید، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید:
۱. داروی رقیق‌کننده خون از جمله وارفارین
۲. برخی از داروهای شیمی درمانی
۳. استروژن‌ها: میوه رز (Rose Hip) دارای مقدار زیادی ویتامین C است. ویتامین C می‌تواند میزان استروژن بدن را افزایش دهد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه ی سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مولتی پریناتال (Multi Prenatal)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین B1	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۴ میکروگرم
ویتامین B۲	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۳	۱۸ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۲/۶ میلی‌گرم
ویتامین C	۱۰۰ میلی‌گرم
کلسیم (به صورت کربنات)	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۱۱ واحد بین‌المللی
فولیک اسید	۸۰۰ میکروگرم
آهن (به صورت فروس فومارات)	۲۷ میلی‌گرم
زینک (به صورت اکساید)	۲۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، اینستامویست سفید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیتانیوم دی اکساید، پلی اتیلن گلایکول ۴۰۰، رنگ خوراکی صورتی
- **رده سنی:** بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** مکمل ویتامین‌ها و برخی املاح ضروری در خانم‌های باردار، حداقل ۳ ماه قبل از بارداری، دوران بارداری و دوران شیردهی، رشد سیستم عصبی جنین، تشکیل هموگلوبین، حمایت از رشد و تکامل جنین، حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها، حفظ سلامت پوست، مو و ناخن‌ها، بهبود عملکرد سیستم بینایی و ایمنی جنین و مادر، تامین انرژی مورد نیاز، تقویت سیستم ایمنی به‌عنوان آنتی اکسیدان جهت پیشگیری از سرطان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص همراه غذا با مقدار کافی آب، یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
از مصرف بیشتر از دوز پیشنهادی اجتناب کنید.
اگر مبتلا به بیماری هستید یا تحت درمان قرار دارید، قبلا از مصرف با پزشک متخصص خود مشورت کنید.
در مورد مکمل‌های غذایی دیگری که در حال حاضر مصرف

می‌کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با توجه به نیاز بدن به ویتامین‌ها و مواد معدنی متفاوت در زنان باردار و شیرده، قبل از مصرف، با پزشک معالج مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده در دوزهای توصیه‌شده برای اکثر افراد ایمن است، اما ممکن است در برخی افراد عوارض جانبی خفیفی مانند یبوست یا تهوع ایجاد کند. همچنین در موارد نادر علائم واکنش آلرژیک شامل علائمی مانند خارش، بثورات پوستی، تورم یا مشکلات تنفسی ممکن است در فرد رخ دهد که در این موارد حتما با پزشک خود مشورت کنید.
- به مقدار زیاد مایعات بنوشید.
- فیبر بیشتری را در رژیم غذایی خود قرار دهید.
- فعالیت بدنی را در برنامه روزانه خود بگنجانید، به شرطی که وضعیت مراقبت‌های بهداشتی شما خوب باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** برای جلوگیری از هرگونه تداخل هر نوع دارو یا مکمل دیگری که مصرف می‌کنید را به پزشک خود اطلاع دهید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده: مولتی دیلی (Multi Daily)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A پالمیتات	۴۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین B1	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B12	۶ میکروگرم
ویتامین B2	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B3	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B6	۲ میلی‌گرم
ویتامین C	۱۰۰ میلی‌گرم
کلسیم (کلسیم کربنات)	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین D3	۴۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۳۰ واحد بین‌المللی
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
آهن (فروس فومارات)	۱۸ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۱۰ میلی‌گرم
زینک (زینک سولفات)	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** رفع کمبود ویتامین ناشی از بیماری یا بارداری یا تغذیه نامناسب و یا اختلالات گوارشی، تأمین نیازهای تغذیه‌ای، تأمین انرژی مورد نیاز روزانه، تقویت سیستم ایمنی، افزایش متابولیسم بدن، افزایش انرژی و کاهش خستگی، پیشگیری از بروز کم‌خونی، سلامت قلب و عروق، حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها، حاوی آنتی‌اکسیدان برای پیشگیری از سرطان‌ها و تقویت سلامت دستگاه گوارش
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص به همراه غذا با مقدار آب کافی میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
قبل از استفاده از مولتی ویتامین، در مورد تمام شرایط پزشکی و آلرژی‌های خود با پزشک صحبت کنید.
از مصرف هم‌زمان بیش از یک محصول مولتی ویتامین خودداری کنید، مگر اینکه پزشک به شما گفته باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک معالج مشورت نمایید.
دوز مورد نیاز شما ممکن است در دوران بارداری متفاوت

باشد. برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی اگر در مقادیر زیاد مصرف شوند، می‌توانند به نوزاد متولد شده آسیب برساند. ممکن است لازم باشد از مولتی ویتامین‌های قبل از تولد، که مخصوص خانم‌های باردار تهیه شده‌اند، استفاده کنید.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** بسیاری از محصولات مولتی ویتامین حاوی مواد معدنی مانند کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و روی هستند. مواد معدنی (اگر در مقادیر زیاد مصرف شوند) می‌توانند باعث عوارض جانبی شوند.

در صورت مشاهده علائم واکنش آلرژیک مانند خارش، بثورات پوستی، مشکل تنفس و... به پزشک مراجعه نمایید: کهیر؛ مشکل تنفس؛ تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو

مولتی ویتامین‌ها اگر طبق دستور مصرف شوند، عوارض جانبی جدی ایجاد نمی‌کنند. عوارض جانبی شایع ممکن است شامل علائم گوارشی باشد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان سایر مولتی ویتامین ها خودداری کنید، مگر اینکه پزشک به شما گفته باشد.

قبل از مصرف، در مورد سایر داروها یا مکمل‌های مصرفی خود با پزشک مشورت کنید.

مولتی ویتامین‌ها می‌توانند با برخی داروها تداخل داشته باشند یا بر نحوه عملکرد داروها در بدن شما تأثیر بگذارند.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** علائم مصرف بیش از حد ممکن است شامل درد معده، استفراغ، اسهال، یبوست، کاهش اشتها، ریزش مو، پوست‌ریزی، احساس ضعف در دهان یا اطراف آن، تغییر در دوره‌های قاعدگی، کاهش وزن، درد کمر، خون در ادرار، پوست رنگ‌پریده و کبودی یا خونریزی آسان.

در صورت مشاهده این علائم، با پزشک مشورت نمایید.

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده: مولتی ویتامین آقایان (Multivitamin for Men)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش‌دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D۳	۲۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۲۹/۸ واحد بین‌المللی
ویتامین B۱	۱۲ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۹ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۹ میکروگرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۱۰ میلی‌گرم
کروم	۵۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
ید	۱۵۰ میکروگرم

جز	مقدار در هر قرص
آهن (به‌صورت فروس سولفات)	۶ میلی‌گرم
منیزیم (به صورت اکساید)	۶۰ میلی‌گرم
منگنز	۳ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۵۰ میکروگرم
زینک (به صورت سولفات)	۱۵ میلی‌گرم
ال-آرژینین	۲۰ میلی‌گرم
ال-کارنیتین	۳۰ میلی‌گرم
ال-متیونین	۲۰ میلی‌گرم
بیوفلاونوئیدها	۱۰ میلی‌گرم
جینسنگ	۲۰ میلی‌گرم
سیلیکون	۱۰ میلی‌گرم
کوآنزیم Q۱۰	۲ میلی‌گرم
پاراآمینوبنزوئیک اسید (PABA)	۲۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن	۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلایکول ۴۰۰، اینستامویست، رنگ خوراکی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن آقایان، افزایش انرژی و بهبود عملکرد جسمانی و تأمین ویتامین‌های مورد نیاز بدن آقایان، تقویت عملکرد جنسی و باروری، بهبود متابولیسم، حفظ سلامت قلب و عروق، تقویت سیستم ایمنی و مقابله با استرس اکسیداتیو در آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص

همراه با غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز یا جویدن قرص‌ها خودداری فرمایید.
بین مصرف مکمل و کافئین حداقل یک ساعت فاصله را رعایت کنید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف داروی دیابت، وارفارین و داروهای افسردگی قبل از مصرف مکمل آقایان با پزشک خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** جنسینگ می‌تواند باعث کاهش سطح قند خون شود، بنابراین توصیه می‌شود افراد دیابتی، این محصول را تحت نظر پزشک مصرف کنند.
در صورت مصرف داروهای ضدافسردگی، تیروئید، استنوکومارول و وارفارین با پزشک مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده: مولتی‌ویتامین خانم‌ها (Multivitamin for Women)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش دار- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
پودر روغن گل گاوزبان	۱۰۰ میلی‌گرم
پودر روغن گل مغربی	۱۰۰ میلی‌گرم
بایوفلاونوئیدهای سیتروس	۱۰ میلی‌گرم
A ویتامین	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
D ویتامین	۶۰۰ واحد بین‌المللی
E ویتامین	۴۴/۷ واحد بین‌المللی
C ویتامین	۹۰ میلی‌گرم
K ویتامین	۹۰ میکروگرم
تیامین (ویتامین B1)	۱۰ میلی‌گرم
ریبوفلاوین (ویتامین B2)	۵ میلی‌گرم
نیاسین (ویتامین B3)	۳۶ میلی‌گرم
B6 ویتامین	۱۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم

جز	مقدار در هر قرص
B12 ویتامین	۲۰ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
منیزیم	۱۰۰ میلی‌گرم
آهن	۱۲ میلی‌گرم
زینک	۱۲ میلی‌گرم
مس	۱۵۰۰ میکروگرم
منگنز	۲/۵ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۰۰ میکروگرم
کروم	۵۰ میکروگرم
پارا-آمینوبنزوئیک اسید (PABA)	۳۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن، زیبایی و شادابی پوست و مو و ناخن، تقویت سیستم ایمنی بانوان، رفع مشکلات دوران قاعدگی، پیشگیری از کم خونی، کمک به حفظ سلامت استخوان، قلب، اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص یا مقدار توصیه شده توسط پزشک همراه با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی با پزشک مشورت نمائید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک یا داروساز استفاده شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.




- **نام فرآورده: ویتامین ث ۵۰۰ میلی‌گرم (Vitamin C)**
- **نام تجاری/ برند: Suprabion**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اکسون فارمد ایرانیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کیش مدیفارم**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص جویدنی- ۳۶ عددی (۳ بلیستر ۱۲ تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جویدنی
آسکوربیک اسید	۲۰۰ میلی‌گرم
اسکوربات سدیم	۳۳۷/۴ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکارز، ساخارین سدیم، مانیتول، پوویدون، استئارات منیزیم، آمارانت، طعم‌دهنده پرتقال
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی، آنتی اکسیدان، مقاومت در برابر عفونت‌ها، افزایش جذب روده‌ای آهن، بهبود زخم و درمان استخوان، درمان کمبود ویتامین C (اسکوربوت)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص جویده شود
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
بیماران دیابتی و نارسایی کلیه از مصرف طولانی مدت و زیاد این محصول خودداری نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده در مقدار توصیه شده به خوبی تحمل می‌گردد. مصرف بیش از حد آن باید طبق دستور پزشک انجام گیرد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت دور و از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرکت داروسازی الحاوی





- **نام فرآورده: قرص ویتامین D۳**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vit D۳ (cholecalciferol)	۱۰۰۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، استارچ پرژلاتینه، منیزیم استئارات و کلوئیدال سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص به همراه مایعات خنک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از فرآورده را مصرف نکنید.
از مصرف همزمان مکمل با سایر ویتامین‌ها، مکمل‌های حاوی ویتامین D و ترکیبات آن خودداری کنید.
قبل از مصرف این فراورده موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:
o بالابودن مقادیر کلیسم در خون
o ابتلا به بیماری کلیوی
o بروز حساسیت نسبت به فرآورده
o مصرف در افراد سالمند مبتلا به بیماری قلبی و کلیوی
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** جهت مصرف با پزشک متخصص مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:**
وجود حساسیت نسبت به مصرف فراورده
در صورت بالا بودن مقدار کلسیم خون و ابتلا به بیماری‌های کلیوی، در مورد مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید.

- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** o **مسمومیت حاد:** درد در استخوان، یبوست (بیشتر در کودکان)، اسهال، خشکی دهان، سردرد طولانی مدت، احساس تشنگی، تکرر ادرار (بخصوص در شب)، ضربان قلب نامنظم، کاهش اشتها، درد عضلانی، تهوع و استفراغ
o **مسمومیت مزمن (ناشی از هایپرکلسمی):** درد در استخوان، عفونت‌های چشمی، کاهش میل جنسی، تب شدید، افزایش فشارخون، حساسیت چشم‌ها به نور، ضعف و خستگی، کاهش وزن و اشتها، درد عضلانی، تهوع و استفراغ
o در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود-دور از دسترس کودکان.



- **نام فرآورده: ال آرژنین**
- **نام تجاری/ برند: آرژی هیل**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۰ ساشه ۹۲ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
L-Arginine	۴/۵ g
Vitamin C	۱۵۶ mg
Vitamin E	۹۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سوکرالوز، رنگ زرد و اسانس پرتغال
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** جهت کمک به عضله‌سازی، تحریک ترشح هورمون رشد، تقویت سیستم ایمنی، کمک به گشادی عروق و افزایش خون، کمک به قوای جنسی، کمک به ترمیم زخم، شامل زخم پای دیابتی، زخم بستر، سوختگی و غیره مصرف می‌گردد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف این فراورده توسط پزشک و با توجه به میزان نیاز هر فرد تعیین می‌گردد. مقدار مصرف معمول این فراوده روزانه دو ساشه می‌باشد که باید به مدت حداقل دو هفته و یا تا بهبود یافتن کامل زخم مصرف گردد.

نحوه مصرف: محتوای هر ساشه باید در یک لیوان آب حل گردد. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مشاهده علائمی مانند راش، کهیر و قرمزی مصرف فراورده متوقف گردد و با پزشک مشورت نمایید. مصرف این فراورده در بیماران کلیوی و افراد با عدم تعادل الکترولیتی باید با احتیاط صورت گیرد

احتیاطات:

از مصرف داروهای تاریخ گذشته پرهیز کنید

در صورت مصرف این فراورده در افراد دیابتی میزان پتاسیم می‌بایست کنترل گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی بر اساس تشخیص پزشک معالج مشکلی ندارد.
- **موارد منع مصرف:**

- هرگونه حساسیت نسبت به ال آرژنین، ویتامین سی و یا هرکدام از اجزای فراورده
- انفارکتوس میوکارد، هایپرکالمی و نقص آنزیمی G۶PD

- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض جانبی نادر:

- کاهش پلاکت، خونریزی
- از دست دادن آگاهی، سوزن سوزن شدن
- واکنش‌های آنافیلاکتیک نظیر آریتم، کهیر، خارش
- افزایش پتاسیم خون

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید شده است با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای زیر با پزشک خود مشورت نمایید: ایزوسوربايد دی نیترات و ایزوسوربايد مونونیترات، نیکوراندیل، نیتروگلیسیرین،امپرازول، کلرپرومازین، وارفارین، هورمون‌های ضدبارداری، دفراسیروکس
- **تداخلات آزمایشگاهی:** قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی به پزشک یا آزمایشگاه اطلاع دهید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز تجویز شده، سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان- پس از حل شدن در آب به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و در ظرف درپوشیده قابل نگهداری می‌باشد.

- **نام فرآورده: کافئین**
- **نام تجاری/ برند: انرکاف ۲۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی حاوی ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر کپسول
caffeine	۲۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز، سیلیکون دی‌اکساید و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** برای سنین کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش هوشیاری و تاخیر خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** در بزرگسالان روزانه یک عدد و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:**

در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک مانند آنژیوادم، راش اریتماتوز، خارش و کهیر، فراورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از حد مجاز این فراورده، ممکن است حملات تشنج اتفاق بیوفتد.

احتیاطات:

در افراد با نارسایی کبدی، کلیوی و بیماران قلبی عروقی با احتیاط مصرف گردد.

از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز این فراورده اجتناب نمایید.

از مصرف فراورده‌های تاریخ گذشته پرهیز نمایید.

احتیاطات:

از مصرف داروهای تاریخ گذشته پرهیز کنید

در صورت مصرف این فراورده در افراد دیابتی میزان پتاسیم می‌بایست کنترل گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطالعات کافی بر روی مصرف این فراورده بر روی زنان باردار انجام نشده است، بنابرین مصرف این فراورده در زنان باردار در صورت نیاز باید تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

شیردهی: این فراورده در شیر ترشح می‌شود و ممکن است عوارض جدی بر نوزاد شیرخوار داشته باشد. در صورت نیاز باید تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

- **موارد منع مصرف:**

در صورت وجود حساسیت نسبت به فراورده قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد.

گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

عوارض قلبی عروقی: افزایش ضربان قلب، تپش قلب و سایر علایم قلبی

عوارض عصبی: بیخوابی، حملات تشنج، بی‌قراری، سردرد، لرزش عضلانی، احساس سبکی در سر، وزوز گوش و عصبانیت

ناراحتی‌های گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال و درد معده

عوارض متفرقه: واکنش‌های حساسیتی مانند آسم، درماتیت و کهیر، افت فشارخون و تکرر ادرار

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید شده است با پزشک یا داروساز مشورت نمایید

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان داروهای فنی‌تئوین، آلوپورینول، قرص‌های ضدبارداری خوراکی، آسپرین، لیتیوم، تئوفیلین و کلوزاپین با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت استفاده همزمان از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع نمایید.

تداخلات غذایی: بعضی از غذاها یا نوشیدنی‌ها ممکن است حاوی مقادیری از کافئین باشند که مصرف همزمان آن‌ها با این فراورده موجب افزایش ضربان قلب، بی قراری و عصبانیت گردد.

تداخل با آزمایشات کلینیکی: کافئین ممکن است باعث مثبت شدن کاذب اوره خون شود. در ضمن کافئین ممکن است باعث افزایش سطح ادراری وانیل ماندلیک اسید (VMA) شود که افزایش VMA ممکن است باعث افزایش کاذب تست‌های فئوکروموسایتوما یا نوروبلاستوما شود.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از اندازه، تحریک‌پذیری سیستم عصبی، حملات تشنج، بی‌قراری شدید، حساسیت شدید و تکان‌های شدید عضلانی و تاثیر بر سیستم قلبی عروقی قابل پیش بینی است.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان- در بسته‌بندی اصلی آن نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مکمل ناباروری بانوان**
- **نام تجاری/ برند: اوو-ایز**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۵ ساشه ۶/۵ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در ساشه
Myo-inositol	mg ۱۰۰۰
L-carnitine fumarate	mg ۸۶۰
Acetyl L-Carnitine HCl	mg ۳۷۲
L-Arginine	mg ۵۰۰
Ascorbic acid (vitamin C)	mg ۹۰
N-Acetyl cysteine	۱۰۰ mg
Vitamin E	۳۰ mg
Iron (as gluconate)	mg ۷
Vitamin B۵ (as calcium pantothenate)	mg ۶
Zinc (as gluconate)	۵ mg
Vitamin B۶	۲ mg
Copper (as sulfate)	۰/۵ mg
Methyl tetrahydrofolate (as calcium)	۴۱۶ mcg
Vitamin D۳	mcg ۵
Selenium (as sodium selenite)	mcg ۲۷/۵
Vitamin B۱۲ (cyanocobalamin)	mcg ۲/۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مانیتول، سیتریک اسید، سدیم سیترات، سوکرالوز، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، اسانس پرتقال و رنگ خوراکی
- **رده سنی:** مکمل باروری بانوان - زیر ۱۲ سال مصرف نشود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده به عنوان مکمل جهت بهبود و افزایش کیفیت باروری در بانوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف این فراورده توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد تعیین می‌گردد، اما مقدار مصرف معمول این فراورده روزانه یک عدد ساشه می‌باشد. محتوای هر ساشه می‌بایست در یک لیوان آب (۲۰۰ میلی لیتر) حل، سپس میل گردد. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری، آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و فراورده را مطابق قبل مصرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار آن خودداری نمایید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** فراورده در کودکان با سن کمتر از ۱۲ سال مصرف نشود.
از مصرف فراورده تاریخ گذشته خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر کدام از اجزای فراورده قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت استفاده از سایر فراورده‌ها حتما پزشک خود را مطلع نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگه‌داری شود.





- **نام فرآورده: ویتامین ب ۱۲**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص زیرزبانی درون قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص زیر زبانی
Vit B۱۲	۱۰۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، مانیتول، نشاسته ذرت، کراس پوویدون، پوویدون K30، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، سوکرالوز و اسانس آلبالو
- **رده سنی: -**
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده: -**
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو عدد قرص زیر زبانی مصرف شود. از بلعیدن یا جویدن قرص خودداری کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:**


از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.
قبل از مصرف این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید:
ابتلا به بیماری‌های کلیوی، کبدی یا حساسیت نسبت به فراورده.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص مصرف شود. مصرف طبق مقدار تجویز شده توسط پزشک معالج هیچگونه خطری به همراه ندارد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر کدام از اجزای فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. در صورت مشاهده هرگونه حساسیت مانند خارش، راش پوستی، گلودرد، سردرد، سرگیجه با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان داروهای فنی‌تئوین، آلوپورینول، قرص‌های ضدبارداری خوراکی، آسپرین، لیتیوم، تئوفیلین، کلوزاپین با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت استفاده همزمان از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع نمایید

تداخلات غذایی: در صورت مصرف همزمان داروهای زیر با پزشک خود مشورت نمایید: کلرامفنیکل و کلشی سیلین باعث کاهش سطح سرمی ویتامین ب ۱۲ می‌شود.
در صورت مصرف سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع کنید.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز: -**
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن: -**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مکمل کلسیم + زینک + منیزیوم + ویتامین D۳**
- **نام تجاری/ برند: تری‌دی‌تری**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شیشه سوپانسیون ۱۲۰ میلی لیتری به همراه پیمانه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱۰ میلی‌لیتر
Calcium (as tricalcium dicitrate)	۴۰۰ mg
Magnesium (as hydroxide)	۱۵۰ mg
Zinc (as gluconate)	۶ mg
Vit D۳	۴۰۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، کروموفور، زانتان گام، شکر، گلیسیرین، سدیم بنزوات، سوکرالوز، پروپیلن گلایکول، اسانس نعنا و پرتقال
- **رده سنی:** کودکان بالای دو سال (جهت مصرف کودکان زیر دوسال با پزشک مشورت نمایید)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قبل از مصرف حتما شیشه را تکان دهید. دوره درمان را کامل کنید.

مقدار مصرف:

○ ۲ تا ۸ سال روزانه ۵ میلی لیتر

○ ۸ تا ۱۲ سال روزانه ۱۰ میلی لیتر

○ بزرگسالان روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلی لیتر

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری، آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و فراورده را مطابق قبل مصرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار آن خودداری نمایید. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:**

از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه نارسایی کلیوی یا بیماری‌های قلبی با احتیاط مصرف شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر و با مشورت پزشک مختصص مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت شدید به کلسیم سیترات، منیزیوم و نمک‌های آن، زینک گلوکونات و ترکیبات حاوی ویتامین D۳
- **عوارض جانبی احتمالی:** به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **عوارض جانبی نادر:** افت فشارخون، ضربان قلب نامنظم قلبی، تهوع و استفراغ، تعریق و فلاشینگ
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف با مکمل‌ها یا غذاهای حاوی آهن باعث کاهش جذب آهن می‌شود.

از مصرف با فراورده‌های غنی از فیتات خودداری شود.

جذب زینک موجود در فراورده با غذا کاهش می‌یابد.

در صورت مصرف همزمان این داروها، با پزشک خود مشورت نمایید: آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیوم، آتنولول، کلسی تونین، مکمل‌های دیگر حاوی مواد ماشبه به دلیل سمیت دارویی به ویژه در بیماران کلیوی، دیجیتالیس گلیکوزید، استروژن، اتیدرونات، فلوروکینولون، گالیم نیترات، آهن، بلاکرهای نوروماسکولار بجز سوکسینیل کولین، سلولوز سدیم فسفات، نورفلوکساسین، سدیم بیکربنات، سدیم فلورید، سدیم پلی استیرن سولفونات، سدیم فلورایدد، تتراسایکلین، ویتامین آ بیشتر از ۲۵۰۰۰ واحد، دیورتیک‌های تیازیدی، وراپامیل و ویتامین D۳

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: گلوکوزآمین سولفات**
- **نام تجاری/ برند: سولوفلکس**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد ساشه ۴ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر ساشه
Glucosamine sulfate	۱۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید انیدروز، مانیتول، سوکرالوز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** -

این فرآورده مکمل می‌باشد که جهت بهبود عملکرد مفاصل و ترمیم آن‌ها در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مصرف می‌گردد.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف این فرآورده، توسط پزشک و با توجه به میزان نیاز هر فرد تعیین می‌گردد.

مقدار مصرف پیشنهادی این فرآورده روزانه یک ساشه می‌باشد.
محتوای هر ساشه می‌بایست در یک لیوان آب حل گردد و همراه با وعده غذایی اصلی مصرف گردد.
مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید.
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فرآورده، به محض یادآوری آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از خوردن نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و فرآورده را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو برابر کردن مقدار آن خودداری کنید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص مجاز می‌باشد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت گلوکوزامین سولفات یا هر کدام از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری شود.

- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فرآورده مشاهده نخواهد شد؛ اما به موازات اثرات مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته در بعضی افراد نیز بشود؛ لذا در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.
- **عوارض جانبی نادر:** تهوع، اسهال، یبوست، واکنش‌های پوستی، سوزش سر دل، سردرد، خواب‌آلودگی و افزایش قند خون.

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید شده است با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز تجویز شده، سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
برای مصرف مقادیر بیشتر، حتما با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.



- **نام فرآورده: منیزیوم سیترات**
- **نام تجاری/ برند: منیزیوم سیترات**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد ساشه ۳ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Magnesium (as citrate)	۳۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم سیترات، شکر، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، سوکرالوز، اسانس پرتقال، رنگ خوراکی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده مکمل بوده و جهت تامین نیاز روزانه منیزیوم، کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** این میزان را پزشک با توجه به نیاز هر فرد تعیین می‌کند اما مقدار مصرف معمول این فراورده روزانه یک ساشه در یک لیوان آب (۲۰۰ میلی‌لیتر) بعد از غذا می‌باشد.
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری، آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و فراورده را مطابق قبل مصرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار آن خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی تحت‌نظر پزشک مصرف شود.
از مصرف فراورده تاریخ گذشته خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص مجاز می‌باشد.
در بانوان شیرده نباید بیشتر از ۳۵۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود مگر تحت نظر پزشک.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد.
گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیشترین عارضه محتمل با این مکمل در صورت مصرف مقادیر اضافی اسهال می‌باشد.
با مصرف این مکمل بعد از غذا تا حد زیادی از بروز عوارض گوارشی جلوگیری می‌شود.
ممکن است عوارض متعاقب منیزیوم سیترات، در دوزهای بالاتر از ۳۵۰ میلی‌گرم رخ دهند.
بروز عوارض در افرادی که از عملکرد کلیوی طبیعی برخوردارند بسیار نادر می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** بیس فسفوناتها: آلندرونیت، رزیدرونیت، اتیدرونیت
کینولون‌ها: سیپروفلوکساسین، گاتیفلوکساسین، لووفلوکساسین، افلوکساسین
مکمل‌های حاوی بور، کلسیم، آهن، منگنز، سدیم آلژینات
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** افت فشار خون، گیجی، آریتمی قلبی، دپرسیون تنفسی
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان.



- **نام فرآورده: زینک سولفات**
- **نام تجاری/ برند: سوزین ۲۵**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی حاوی ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Zinc (as Sulfate)	۲۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز، منیزیوم استئارات، نشاسته ذرت و تالک
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده یک مکمل بوده که جهت کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و کمک به سلامت سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری آن را مصرف نموده؛ اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر نمایید و فراورده را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو یا چند برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.
این فراورده در دوزهای بالاتر از مقدار توصیه شده ممکن است منجر به مشکلات زیر گردد:
  - تهوع و استفراغ
  - اختلال در عملکرد لنفوسیت و لکوسیت، آنمی سیدروبلاستیک وابسته به کمبود مس و نوتروپنی
  - کاهش HDL
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص امکان مصرف فراورده وجود دارد.
- **موارد منع مصرف:** وجود هرگونه حساسیت نسبت به زینک یا هرکدام از اجزای فراورده (با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده با معده خالی ممکن است منجر به دردهای شکمی، التهاب معده، اسهال و تهوع و استفراغ گردد.
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: دارویی:** تتراسایکلین‌ها به جز داکسی سایکلین، فلوروکینولون‌ها، مکمل‌های حاوی آهن و مس
غذایی: ترکیبات حاوی سبوس، پروتئین، فیتات و برخی املاح که منجر به کاهش جذب زینک می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز، سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: زینک سولفات**
- **نام تجاری/ برند: سوزین ۵۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی حاوی ۳۰ قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار
Zinc (as Sulfate)	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس پوویدون، منیزیوم استئارات، میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت و روکش سفید رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده یک مکمل بوده که جهت کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و کمک به سلامت سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری آن را مصرف نموده؛ اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر نمایید و فراورده را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو یا چندبرابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.
این فراورده در دوزهای بالاتر از مقدار توصیه شده ممکن است منجر به مشکلات زیر گردد:
  - تهوع و استفراغ
  - اختلال در عملکرد لنفوسیت و لکوسیت، آنمی سیدروبلاستیک وابسته به کمبود مس و نوتروپنی
  - کاهش HDL
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک متخصص امکان مصرف فراورده وجود دارد.
- **موارد منع مصرف:** وجود هرگونه حساسیت نسبت به زینک یا هرکدام از اجزای فراورده (با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید)
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده با معده خالی ممکن است منجر به دردهای شکمی، التهاب معده، اسهال و تهوع و استفراغ گردد.
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر: دارویی:** تتراسایکلین‌ها به جز داکسی سایکلین، فلوروکینولون‌ها، مکمل‌های حاوی آهن و مس
غذایی: ترکیبات حاوی سبوس، پروتئین، فیتات و برخی املاح که منجر به کاهش جذب زینک می‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز، سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ال-آرژنین**
- **نام تجاری/ برند: تالی-آپ**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: بطری شیشه ۲۵۰ میلی لیتری به همراه قاشق پلاستیکی ۵ میلی لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
L-Arginine Hydrochloride	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** محلول سوربیتول ۷۰درصد، سوکرالوز، سدیم بنزوات، سدیم سیترات دی هیدرات، سیتریک اسید انیدروز، دی سدیم ادتات، گلیسیرین، اسانس چندمیوه، رنگ قرمز شماره۴۰، رنگ زرد شماره ۶
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فرآورده به‌عنوان مکمل جهت کمک به افزایش هورمون رشد تقویت سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این فرآورده یک مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری آن را مصرف نموده؛ اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر نمایید و فراورده را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو یا چند برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از شربت را مصرف نکنید.
فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف کوتاه مدت این فراورده خطری در طول بارداری ایجاد نمی‌نماید. در خصوص مصرف طولانی مدت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر کدام از اجزای فرآورده قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.
مصرف ال-آرژنین به صورت مکمل در افراد مبتلا به اختلال ژنتیکی نادر آرژنینمی منع مصرف دارد.
این فرآورده در افرادی که به هر یک از اجزای یک فرآورده حاوی آرژنین حساس هستند منع مصرف دارد.
از مصرف فرآورده، پس از تاریخ انقضاء آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن عوارض جانبی با مصرف این فرآورده مشاهده نخواهد شد، اما به موازات اثرات مطلوب، ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نظیر درد معده، نفخ و اسهال در بعضی افراد نیز بشود، لذا در صورت بروز آنها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از انجام آزمایش به پزشک خود و آزمایشگاه اطلاع دهید.
در صورت استفاده از سایر فرآورده‌ها حتما پزشک خود را مطلع نمایید.
در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد فشارخون، سیلدنافیل، داروهای رقیق‌کننده خون و داروهای کاهنده قند خون با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** مقدار مصرفی این فرآورده توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد تعیین می‌گردد. اما مقدار مصرفی معمول آن به صورت زیر می‌باشد:
کودکان ۴ تا ۷ سال: ۳ میلی لیتر در روز
کودکان بالای ۷سال: ۶ میلی لیتر در روز
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**
در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز، سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: شربت مولتی ویتامین + زینک**
- **نام تجاری/ برند: زیتوکید**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: بطری شیشه ۱۲۰ میلی لیتری به همراه قاشق پلاستیکی ۵ میلی لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Zinc (as gluconate)	۵ mg
Vit A	۱۰۰۰ IU
Vit D۳	۶۰۰ IU
Vit E	۹ IU
Vit B۱	۰/۶ mg
Vit B۲	۰/۶ mg
Vit B۶	۰/۶ mg
Vit B۱۲	۴/۵ mg
Vit C	۲۵ mg
Vit B۳ as Nicotinamide	۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، شکر، سوکرالوز، گلیسیرین، پروپیلن گلایکول، سدیم بنزوات، زانتن گام، دی سدیم ادتات، اسانس لیمو، کروموفور
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل جهت تقویت سیستم عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد. مقدار معمول در کودکان بالای دو سال روزانه ۱ پیمانه یا ۵ میلی‌لیتر می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از شربت را مصرف نکنید.
فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف کوتاه مدت این فراورده خطری در طول بارداری ایجاد نمی‌نماید. در خصوص مصرف طولانی مدت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر کدام از اجزای فرآورده قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.
مصرف ال-آرژنین به صورت مکمل در افراد مبتلا به اختلال ژنتیکی نادر آرژنینمی منع مصرف دارد.
این فرآورده در افرادی که به هر یک از اجزای یک فرآورده حاوی آرژنین حساس هستند منع مصرف دارد.
از مصرف فرآورده، پس از تاریخ انقضاء آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
خواب آلودگی، ضعف، سردرد و سرگیجه
افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
واکنش‌های آلرژیک مانند کهیر، خارش و التهاب پوستی، ضربان قلب نامنظم، اختلال در تنفس و احساس گرفتگی در قفسه سینه، تورم گره لنفاوی، تورم صورت، گردن، لب‌ها و دهان
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از انجام آزمایش به پزشک خود و آزمایشگاه اطلاع دهید
تداخلات دارویی: فنی توئین، لوودوپا، کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین، ترکیبات حاوی سایر ویتامین‌ها به‌خصوص ویتامین A و D و داروهای ضدانعقاد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** مقدار مصرفی این فرآورده توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد تعیین می‌گردد. اما مقدار مصرفی معمول آن به‌صورت زیر می‌باشد:
کودکان ۴ تا ۷ سال: ۳ میلی لیتر در روز
کودکان بالای ۷سال: ۶ میلی لیتر در روز
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: شربت زینک سولفات**
- **نام تجاری/ برند: شربت سوزین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت ۱۲۰ میلی لیتری به همراه یک پیمانه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Zinc (as heptahydrate sulfate)	۵ mg in ۵ ml
Saccharin Sodium	۱ mg

	میلی‌گرم	RDA٪ در هر ۵ میلی لیتر	مقدار مجاز توصیه شده روزانه شربت بر حسب میلی لیتر
مردان (۱۱-۱۸ سال)	۱۲	٪۸۳	۶
مردان (۱۹ سال به بالا)	۵/۹	٪۱۰۵	۵
زنان (۱۱-۱۸ سال)	۱۰	٪۱۰۰	۵
زنان (۱۹ سال به بالا)	۵/۶	٪۱۵۰	۳
باردار	۱۳-۷	٪۱۴۰ - ٪۷۷	۶/۵-۳/۵
شیردهی (۰-۶ ماه)	۱۹	٪۱۰۰	۹
شیردهی (بالاتر از ۶ ماه)	۱۶	٪۱۰۰	۷/۵
کودکان (۴-۶ سال)	۵	٪۲۰۰	۲/۵
۷-۹ سال	۱۰	٪۱۰۰	۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم ساخارین
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** -

به عنوان مکمل غذایی در پیشگیری و کمبود روی
- به عنوان مکمل در رژیم درمانی آکنه و آرتریت روماتوئید
- به تاخیر انداختن شروع زوال عقل در افراد مستعد این بیماری
- کمک به رشد نوزادان و اطفال
- کاهش ریزش مو
- کمک به التیام زخم‌ها

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود. در صورت تحریک گوارشی می‌توان آن را همراه غذا مصرف نمود.

از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم مانند شیر و لبنیات و کافئین و فسفر پرهیز شود.

در صورت ایجاد تهوع، اسهال، بثورات پوستی، استفراغ شدید، از دست رفتن آب بدن و بی‌قراری، مقدار مصرف باید کاهش یافته و یا تا کنترل علائم فوق قطع شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

در صورتی که بیمار دچار کمبود مس می‌باشد؛ مصرف روی کمبود مس را تشدید می‌کند.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** از آنجایی که کمبود روی در حاملگی به ندرت اتفاق می‌افتد، مصرف مکمل روی به طور کلی توصیه نمی‌گردد. در شیردهی به دلیل افت میزان روی بدن، مصرف ۱۹ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماه اول و ۱۶ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماهه دوم شیردهی توصیه می‌گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف مقادیر زیاد روی ندرتا ممکن است باعث بروز مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد ابتدای معده، تهوع و مشکلات خونی شود.
- **عوارض جانبی نادر:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مقادیر زیاد روی ممکن است جذب مس را از طریق روده مختل نماید. نمک‌های روی ممکن است جذب تتراسایکلین‌ها را از طریق ایجاد کمپلکس غیرمحلول کاهش دهند. از این رو فاصله زمانی حداقل ۲ ساعت بین تجویز مکمل‌های روی و تتراسایکلین‌ها ضروری است.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: شربت زینک گلوکونات**
- **نام تجاری/ برند: شربت نئوزینک**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: یک عدد شربت ۱۲۰ میلی لیتری به همراه یک پیمانه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Zinc (as gluconate)	۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم سیترات، شکر، رنگ خوراکی، سیتریک اسید، گلیسیرین، سدیم بنزوات، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سوکرالوز، اسانس پرتقال و اسانس لیمو
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده به عنوان مکمل تجویز می‌گردد. کمک به سلامت پوست، مو، ناخت و سلامت ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف پیشنهادی روزانه یک پیمانه (۵ میلی‌لیتر) تحت نظر پزشک می‌باشد. این مقدار را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید. بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود. در صورت تحریک گوارشی می‌توان آن را همراه غذا مصرف نمود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک مانند آنژیوادم، راش اریتماتوز، خارش و کهیر، فراورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت کنید. از مصرف فراورده‌های تاریخ گذشته پرهیز نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در بارداری از آنجایی که کمبود زینک به ندرت اتفاق می‌افتد مصرف این مکمل توصیه نمی‌شود. در دوران شیردهی به دلیل افت میزان زینک، مصرف ۷ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماهه اول شیردهی و ۴ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماهه دوم شیردهی توصیه می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **عوارض جانبی نادر:** مصرف مقادیر زیاد زینک ندرتا ممکن است باعث بروز مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد اپی گاستر، تهوع و مشکلات هماتولوژیک شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مقدار زیاد زینک ممکن است جذب مس از طریق روده را مختل نماید نمک‌های زینک ممکن است جذب تتراسایکلین‌ها را از طریق ایجاد کمپلکس‌های غیرمحلول کاهش دهند، از این رو فاصله زمانی حداقل ۲ ساعت بین تجویز مکمل‌های روی و تتراسایکلین ضروری است.
از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم مانند شیر و لبنیات و کافئین و فسفر و همچنین فرآورده‌های سبوس‌دار با این مکمل خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت ایجاد تهوع، اسهال، بثورات پوستی، استفراق شدید، از دست رفتن آب بدن و بی‌قراری، مقدار مصرف فراورده باید کاهش یافته و یا تا کنترل علائم فوق قطع شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** شربت مولتی ویتامین
- **نام تجاری/ برند:** شربت ویتوکید
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت الحاوی
- **تولیدشده در:** تهران- ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** بطری شیشه ۱۲۰ میلی لیتر ی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Vit A	۱۰۰۰ IU
Vit D۳	۶۰۰ IU
Vit E	۹ IU
Vit B۱	۰/۶ mg
Vit B۲	۰/۶ mg
Vit B۶	۰/۶ mg
Vit B۱۲	۴/۵ mg
Vit C	۲۵ mg
Vit as Nicotinamide	۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پروپیلن گلایکول، گلیسیرین، سوکرالوز، سدیم بنزوات، سوربیتول، دی سدیم ادتات، سدیم فسفات، کروموفور و اسانس پرتقال
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل جهت تقویت سیستم عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد. مقدار معمول در کودکان بالای دو سال روزانه ۱ پیمانه یا ۵ میلی‌لیتر می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از شربت را مصرف نکنید.
فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد.
گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
خواب آلودگی، ضعف، سردرد و سرگیجه
افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
واکنش‌های آلرژیک مانند کهیر، خارش و التهاب پوستی، ضربان قلب نامنظم، اختلال در تنفس و احساس گرفتگی در قفسه سینه، تورم صورت، لب‌ها و دهان
- **عوارض جانبی نادر:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از انجام آزمایش به پزشک خود و آزمایشگاه اطلاع دهید.
فنی توئین، لوودوپا، کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین، ترکیبات حاوی سایر ویتامین‌ها به خصوص ویتامین A و D و داروهای ضدانعقاد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مکمل باروری آقایان**
- **نام تجاری/ برند: فرتی اینفورس-ام**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۵ ساشه ۸/۵ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
L-Carnitine fumarate	۱۷۲۵ mg
Acetyl L-Carnitine HCl	۵۰۰ mg
Ascorbic acid (Vitamin C)	۹۰ mg
Coenzyme Q10	۲۰ mg
Selenium (as sodium selenite)	۵۰ mg
Zinc (as gluconate)	۱۰ mg
Folic acid	۲۰۰ mcg
Vitamin B12(cyanocobalamin)	۱/۵ mcg
Fructose	۱۰۰۰ mg

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** پلـی سـوربات ۸۰، سـوکرالوز، شـکر، کلوئیـدال سـیلیکون دی اکسـاید، اسـانس لیمـو
- **رده سنی:** آقایان بالای ۱۲ سال
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** ایـن فـراورده یـک مکمـل حـاوی ویتامین‌هـا و مـواد معدنـی بـه همـراه ال-کارنیتیـن و کوآنزیـم Q۱۰ می‌باشـد کـه جهـت بهبـود سـلامت، کارایـی و تولیـد اسـپرم در آقایـان بـه منظـور افزایـش احتمال بـاروری مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد.
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** مقدار مصـرف این فراورده توسـط پزشـک و بـا توجه بـه نیاز هر فـرد تعیین می‌گـردد، اما مقـدار مصرف معمـول ایـن فـراورده روزانـه دو عـدد ساشـه می‌باشـد. محتـوای هـر ساشـه می‌بایسـت در یـک لیـوان آب حل و صبـح ها و عصرهـا قبل از وعـده غذایـی مصرف گردد. توصیه می‌شـود فـراورده به مـدت حداقل ۶ مـاه و یـا تـا زمان تـلاش برای بـارداری مصـرف گردد. مقـدار توصیه شـده را بدون مشـورت با پزشـک یـا داروسـاز خود افزایـش ندهید.
در صـورت فرامـوش کـردن یـک نوبـت از مصـرف فـراورده، بـه محـض یـادآوری، آن را مصـرف نمـوده امـا اگـر تقریبـا زمـان نوبـت بعـدی فـرا رسـیده بـود از مصـرف نوبـت فرامـوش شـده صـرف نظـر کـرده و فـراورده را مطابـق قبـل مصـرف نمـوده و از دوبرابـر کـردن مقـدار آن خـودداری نماییـد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** فـراورده در کـودکان بـا سـن کمتـر از ۱۲ سـال مصرف نشـود.
از مصرف فراورده تاریخ گذشته خودداری کنید
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صـورت وجـود هر گونه حساسـیت نسـبت بـه هـر کـدام از اجـزای فـراورده قبـل از مصـرف دارو بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت نماییـد.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** در صـورت تجویـز پزشـک و اسـتفاده برحسـب نیـاز بـدن، عـوارض جانبـی بـا مصـرف ایـن فـراورده مشـاهده نخواهـد شـد؛ بـه مـوازات اثـرات مطلـوب درمانـی ممکـن اسـت باعـث بـروز بعضـی عـوارض ناخواسـته نیـز بشـود، عوارضـی کـه امـکان بـروز آن‌هـا نـادر ولـی جـدی می‌باشـد. گرچـه همـه ایـن عـوارض در یـک فـرد دیـده نمی‌شـود امـا در صـورت بـروز آن‌هـا بایـد بـا پزشـک یـا داروسـاز مشـورت نماییـد.
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** در صـورت اسـتفاده از سـایر فراورده‌هـا حتمـا پزشـک خـود را مطلـع نماییـد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** در صـورت مصـرف اتفاقـی مقادیـر بالاتـر از حداکثـر میـزان مجـاز سـریعا بـه پزشـک و مراکـز درمانـی مراجعـه کنیـد.
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیـر ۳۰ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود- دور از دسـترس کـودکان



- **نام فرآورده: آهن + فولیک اسید**
- **نام تجاری/ برند: فرفولیک**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکش‌دار یا کپسول پیوسته رهش**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Iron (as fumarate)	۶۰ mg
Folic acid	۴۰۰ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کم خونی ناشی از فقر آهن و کمبود اسید فولیک ناشی از رژیم غذایی ناکافی، سو جذب، بارداری و یا خونریزی. مشکلات ناشی از خونریزی، سوختگی، همودیالیز، بیماری روده، مشکلات معده و یا جراحی معده. استفاده از داروهایی که میزان آهن را کاهش می‌دهند.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک کپسول یا قرص مصرف شود، این مقدار متوسط مصرف می‌باشد.

قبل از مصرف فراورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

o حساسیت به غذاها، رنگ‌ها، مواد محافظ و فولیک اسید.
o ابتلا به هر نوع کم خونی به جز کم خونی ناشی از فقر آهن.
o مصرف همزمان با داروی دیگر مانند خانواده تتراسایکلین ها و پنی سیلین‌ها و پانکراتین‌ها.

این فراورده را با معده خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
فراورده را بلعیده و از جویدن، خرد کردن و یا باز کردن آن خودداری کنید.
در صورت وجود ناراحتی‌های گوارشی همراه غذا میل کنید.
این فراورده باعث تیره شدن رنگ مدفوع می‌گردد.
مصرف ویتامین سی با آهن به نسبت متناسب، جذب آهن را افزایش می‌دهد.
فراورده‌های حاوی آهن را یک ساعت قبل و یا دو ساعت پس از مصرف داروهای آنتی اسید و نیز غذاهایی مانند قهوه، چای، حبوبات و تخم‌مرغ مصرف نمایید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:**

از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.
علت کمبود آهن باید مشخص گردد. زیرا این کمبود ممکن است به دلیل بیماری‌های کم‌خونی جدی و خطرناک باشد.
در صورت داشتن هرگونه بیماری خاص و مشکلات زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

o مصرف الکل، انتقال خون، مشکلات کلیوی یا عفونت کلیه، مشکلات کبدی، بیماری پورفیریا، آرتریت روماتوئید، بیماری قلبی، کولیت روده، زخم معده و کم خونی به جز فقر آهن

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در زمان بارداری در ۳ ماهه دوم و سوم، مصرف فرآورده‌های حاوی آهن تحت نظر پزشک متخصص مفید خواهد بود.

در زمان شیردهی عوارضی برای مصرف آن در این دوران ثبت نشده است.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** درد یا کرامپ شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ، یبوست، سوزش سر دل، تیره شدن رنگ ادرار، خواب‌آلودگی، ضربان ضعیف یا سریع و غیرعادی قلب

عوارض شایع: یبوست، اسهال، کرامپ، تهوع و استفراغ

عوارض طولانی مدت: کبودی لب‌ها و ناخن‌ها و کف دست، تشنج، گیجی، رنگ پریدگی، پوست مرطوب، تنفس شدید، خستگی غیرطبیعی و ضعف، نبض به صورت کوتاه و تند

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از مصرف فراورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

o حساسیت به غذاها، رنگ‌ها، مواد محافظ و فولیک اسید
o ابتلا به هر نوع کم‌خونی به جز کم‌خونی ناشی از فقر آهن
o مصرف همزمان با داروی دیگر مانند خانواده تتراسایکلین‌ها و پنی سیلین‌ها و پانکراتین‌ها

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: فروس فومارات**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Iron (as fumarate)	۶۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز PH:۱۰۲، تالک، منیزیوم استئارات، کراس کارملوز سدیم، اینستاکوت قهوه‌ای
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کم خونی ناشی از فقر آهن و کمبود اسید فولیک ناشی از رژیم غذایی ناکافی، سو جذب، بارداری و یا خونریزی. مشکلات ناشی از خونریزی، سوختگی، همودیالیز، بیماری روده، مشکلات معده و یا جراحی معده. استفاده از داروهایی که میزان آهن را کاهش می‌دهند.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک قرص مصرف شود، این مقدار متوسط مصرف می‌باشد.
قبل از مصرف فراورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
o ابتلا به هر نوع کم‌خونی به جز کم‌خونی ناشی از فقر آهن
این فراورده را با معده خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
فراورده را بلعیده و از جویدن، خرد کردن و یا باز کردن آن خودداری کنید.
در صورت وجود ناراحتی‌های گوارشی همراه غذا میل کنید.
این فراورده باعث تیره شدن رنگ مدفوع می‌گردد.
مصرف ویتامین سی با آهن به نسبت متناسب، جذب آهن را افزایش می‌دهد.
- فراورده‌های حاوی آهن را یک ساعت قبل و یا دو ساعت پس از مصرف داروهای آنتی اسید و نیز غذاهایی مانند قهوه، چای، حبوبات و تخم‌مرغ مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

علت کمبود آهن باید مشخص گردد. زیرا این کمبود ممکن است به دلیل بیماری‌های کم خونی جدی و خطرناک باشد در صورت داشتن هرگونه بیماری خاص و مشکلات زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
o مصرف الکل، انتقال خون، مشکلات کلیوی یا عفونت کلیه، مشکلات کبدی، بیماری پورفیریا، آرتریت روماتوئید، بیماری قلبی، کولیت روده، زخم معده و کم خونی به جز فقر آهن
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** درد یا کرامپ شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ، یبوست، سوزش سردل، تیره شدن رنگ ادرار، خواب‌آلودگی، ضربان ضعیف یا سریع و غیرعادی قلب
- عوارض شایع: یبوست، اسهال، کرامپ، تهوع و استفراغ
- عوارض طولانی مدت: کبودی لب‌ها و ناخن‌ها و کف دست، تشنج، گیجی، رنگ‌پریدگی، پوست مرطوب، تنفس شدید، خستگی غیرطبیعی و ضعف، نبض به صورت کوتاه و تند
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از مصرف فراورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
o ابتلا به هر نوع کم خونی به جز کم خونی ناشی از فقر آهن
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: فموبرا (مکمل بارداری)**
- **نام تجاری/ برند: femobra**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
Vitamin B1	۱/۲ mg
Vitamin B2	۱/۶ mg
Vitamin B3	۱۵ mg
Vitamin B6	۱/۹ mg
Vitamin B12	۳/۵ mcg
Vitamin E	۱۳ mg
Vitamin C	۱۱۰ mg
Biotin	۶۰ mcg
Pantothenic Acid	۶ mg
Iodine	۱۵۰ mcg
Folic Acid	۴۰۰ mcg
L-Methylfolate	۴۱۶ mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مانیتول، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون، کراس پوویدون، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیوم استئارات و روکش صورتی رنگ
- **رده سنی:** بارداری
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** فراورده یک مکمل دوران بارداری بوده که حاوی فولیک اسید، ید و ویتامین‌های ضروری می‌باشد که نیازهای تغذیه‌ای در آمادگی جهت بارداری و نیز بارداری‌های سالم را تامین می‌کند.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد همراه غذای اصلی و یک لیوان آب مصرف شود.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری، آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و فراورده را مطابق قبل مصرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار آن خودداری نمایید. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مشاهده علائمی مانند راش، کهیر و قرمزی مصرف مکمل را متوقف کرده و با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف این مکمل در افرادی که سطح بالایی از ویتامین در بدنشان وجود دارد ممنوع است.
مصرف فراورده در افراد با مشکل تیروئیدی باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

• عوارض جانبی نادر:
خواب آلودگی، ضعف، سردرد و سرگیجه
افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
واکنش‌های آلرژیک مانند کهیر، خارش و التهاب پوستی، ضربان قلب نامنظم، اختلال در تنفس و احساس گرفتگی در قفسه سینه، تورم گره لنفاوی، تورم صورت، گردن، لب‌ها و دهان

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان دارو یا مکمل دیگر، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. همچنین قبل از انجام تست‌های آزمایشگاه به پزشک یا آزمایشگاه اطلاع دهید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود-دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: فولیک اسید +ید**
- **نام تجاری/ برند: فولیدین**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Folic acid	۵۰۰mcg
Iodine (as KI)	۱۵۰mcg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** پیش از بارداری، بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** مکمل تغذیه ای مخصوص دوران پیش از بارداری، بارداری و شیردهی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف را پزشک تعیین می‌نماید اما مقدار مصرف معمول این فراورده به شرح زیر است:
روزانه یک قرص فولیدین همراه غذا و حداقل یک لیوان کامل آب مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک یا چند دوز از مصرف این دارو، از مصرف دوز فراموش شده صرف‌نظر نمایید؛ دوز بعدی دارو را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو یا چند برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک این دارو قطع شود.
در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید:
حساسیت نسبت به فراورده
بیماری‌های تیروئیدی
همراه با سایر فراورده‌های حاوی فولیک اسید
آنمی‌های ناشناخته و آنمی کشنده
موارد احتیاط:
افراد با مشکلات خونی و تیروئیدی
از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز این فراورده اجتناب کنید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته پرهیز کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
تغییر ریتم خواب، مشکل تمرکز، تحریک‌پذیری، افزایش فعالیت، هیجان‌زدگی و گیجی
تهوع و استفراغ، ناراحتی‌های گوارشی و اسهال
راش‌های پوستی، تورم غدد بزاقی و یدیسم (احساس مزه فلزی در دهان، سوزش دهان و گلو)
واکنش‌های آلرژیک (تورم صورت، تنفس سخت) و گواتر
در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید شده است با پزشک یا داروساز مشورت نمایید
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان داروهای زیر با پزشک خود مشورت کنید:
فنی تئوین و سایر داروهای ضدصرع، قرص‌های ضدبارداری خوراکی، سولفاسالازین و لیتیوم
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز تجویز شده، سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مجاز سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان- دارو در بسته بندی اصلی نگه داری شود



- **نام فرآورده: قطره ویتامین آ + د**
- **نام تجاری/ برند: قطره آدوکید**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵ یا ۳۰ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
Vit A	۱۵۰۰ IU
Vit D۳	۴۰۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسکوربیک اسید، سیتریک اسید، ادتات دی سدیم، گلوکز مایع، گلیسرین، پروپیلن گلیکول، سدیم بنزوات، محلول سوربیتول، ویتامین E، کروموفور و رنگ و اسانس موز
- **رده سنی:** کودکان زیر سه سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل کمک به تامین ویتامین‌های A و D و سلامت پوست و بینایی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** -
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از شربت را مصرف نکنید
فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نما یید .
از مصرف همزمان مکمل با سایر ویتامین‌ها، مکمل‌های آهن، ویتامین D و ترکیبات آن خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: قطره آهن**
- **نام تجاری/ برند: قطره آیروکید**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قطره خوراکی ۱۵ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
Fe (as Ferrous Fumarate)	۱۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکرالوز، اسید سیتریک، سدیم سیترات، سوربیتول، گلیسیرین، سدیم بنزوات، ویتامین E، کروموفور، آویسل، زانتان گام، لسیتین و اسانس موز و آلبالو
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل جهت تقویت سیستم عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد. مقدار معمول به شرح زیر است:
- کودکان از ۷ تا ۱۲ ماهگی: روزانه یک میلی‌لیتر
- کودکان از ۱ تا ۳ سالگی: روزانه نیم میلی‌لیتر
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فرآورده، به محض یادآوری، سریعا آن را مصرف نموده اما اگر تقریبا زمان نوبت فراموش شده صرف نظرکرده و فرآورده را مطابق قبل، مصرف نمایید و از دو برابر کردن مقدار آن خودداری کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از شربت را مصرف نکنید
از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید
این فراورده ممکن است باعث بروز ناراحتی‌های گوارشی مانند تهوع شود که در این صورت می‌توان دارو را همراه یا بعد از غذا مصرف کرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقادیر تجویز شده توسط پزشک معالج در دوران بارداری و شیردهی خطری به همراه ندارد
- **موارد منع مصرف:** هموکروماتوزیس، هموسیدروزیس، کم خونی همولیتیک، زخم گوارشی فعال و کولیت اولسراتیو
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
تیره شدن رنگ دندان‌ها که می‌توان با رقیق کردن آن با مایعات خوراکی از این کار تا حد زیادی جلوگیری کرد.
علائم گوارشی نظیر درد شکمی، یبوست، اسهال، تحریک دستگاه گوارشی، تهوع و استفراغ و تیره شدن مدفوع.
عوارض جانبی نادر: در صورت مصرف مقادیر بالای آهن به ویژه در کودکان کمتر از ۶ سال احتمال مسمومیت با آن وجود دارد
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آنتی اسیدهای حاوی منیزیوم و آلومینیوم، لوودوپا، لووتیروکسین، کاپتوپریل، متیل دوپا
مصرف آهن با غذا ممکن است جذب آن را کاهش دهد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بیش از حد، به سرعت به پزشک مراجعه نمایید
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** قطره مولتی ویتامین + زینک
- **نام تجاری/ برند:** قطره زیتوکید
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت الحاوی
- **تولیدشده در:** تهران- ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قطره خوراکی ۱۵ یا ۳۰ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
Zinc (as gluconate)	۲۰/۹ mg
Vit A	۱۵۰۰ IU
Vit D۳	۴۰۰ IU
Vit E	۵ IU
Vit B۱	۰/۵ mg
Vit B۲	۰/۶ mg
Vit B۶	۰/۴ mg
Vit B۱۲	۱/۵ mg
Vit C	۳۵ mg
Vit as Nicotinamide	۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ادتات دی سدیم، سوکرالوز، گلیسیرین، پروپیلن گلیکول، سدیم بنزوات، سوربیتول، کروموفور، زانتان گام و اسانس لیمو
- **رده سنی:** کودکان زیر دو سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به‌عنوان مکمل جهت تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش التهاب، بهبود رشد مو و استحکام ناخن‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** توسط پزشک و با توجه به نیاز هر فرد. مقدار معمول روزانه یک میلی لیتر است.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مقادیر بالاتر از مقدار تجویز شده از قطره را مصرف نکنید.
فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نمایید.
از مصرف همزمان مکمل با سایر ویتامین‌ها، مکمل‌های آهن، ویتامین D و ترکیبات آن خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقادیر تجویز شده توسط پزشک معالج در دوران بارداری و شیردهی خطری به همراه ندارد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** - هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** فنی توئین، لوودوپا، کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و داروهای ضدانعقاد
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** قطره مولتی ویتامین
- **نام تجاری/ برند:** قطره ویتوکید
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت الحاوی
- **تولیدشده در:** تهران- ایران
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قطره خوراکی ۱۵ یا ۳۰ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
Vit A	۱۵۰۰ IU
Vit D۳	۴۰۰ IU
Vit E	۵ IU
Vit B۱	۰/۵ mg
Vit B۲	۰/۶ mg
Vit B۶	۰/۴ mg
Vit B۱۲	۱/۵ mg
Vit C	۳/۵ mg
Vit as Nicotinamide	۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ادتات دی سدیم، سوکرالوز، گلیسیرین، پروپیلن گایکول، سدیم بنزوات، سوربیتول، کروموفور، اسانس پرتقال
- **رده سنی:** کودکان زیر دو سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل جهت تقویت سیستم عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** اطفال تا ۱۲ ماه: یک میلی‌لیتر یک بار در روز
اطفال یک تا ۳ سال: ۲ میلی لیتر یکبار در روز
- **هشدار و احتیاط‌ها:** فراورده را تا حداکثر یک ماه پس از باز شدن درب آن مصرف نمایید.
از مصرف همزمان مکمل با سایر ویتامین‌ها، مکمل‌های آهن، ویتامین D و ترکیبات آن خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** فنی توئین، لوودوپا، کینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین و داروهای ضدانعقاد
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: منیزیم+ ویتامین B۶**
- **نام تجاری/ برند: مگندوکس**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: سه بلیستر ده عددی قرص روکش دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
Magnesium (as Oxide)	۳۰۰ mg
Vitamin B۶(pyridoxine HCl)	۳۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون، میکروکریستالین سلولز، کراس پوویدون، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات و روکش سفید رنگ
- **رده سنی:** بزرگسالان روزانه یک عدد همراه با غذا
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به عنوان مکمل غذایی به منظور جهت کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** فراورده همراه با غذا مصرف شود.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف فراورده، به محض یادآوری آن را مصرف نمودە؛ اما اگر تقریبا زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر نمایید. دوز بعدی دارو را مطابق قبل مصرف نمایید و از دو یا چند برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

هشدارها:

در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی، بروز حساسیت نسبت به فراورده، ابتلا به اسهال و ابتلا به بیماری‌های کبدی؛ قبل از مصرف این فراورده این موارد را به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

احتیاطات:

از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز این فراورده اجتناب نمایید.

از مصرف فراورده‌های تاریخ گذشته پرهیز نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** مصرف مقادیر تجویز شده توسط پزشک معالج هیچ‌گونه خطری به همراه ندارد. خطرات احتمالی ناشی از مصرف مقادیر بیش از حد مجاز مشخص نمی‌باشد. در صورت بارداری یا تصمیم به بارداری در مورد مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید.

شیردهی:

ویتامین ب ۶ به‌طور مستقیم در شیرمادر ترشح می‌شود. در زمان شیردهی، در مورد مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید.

- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** منیزیم باعث کاهش جذب داروهای تتراسایکلین و بیس فسفونات می‌شود؛ بنابرین باید با چند ساعت فاصله زمانی مصرف شوند.

در صورت استفاده همزمان با داروهای لوودوپا و فنی‌توئین با احتیاط مصرف شود.

در صورت استفاده همزمان از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع نمایید.


- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**

در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بالاتر از حداکثر میزان مصرف مجاز سریعا به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمایید.

علائم حاد مسمومیت: از بین رفتن رفلکس تاندون‌ها و دپرسیون تنفسی

علائم مزمن مسمومیت: تهوع، استفراغ، گرگرفتگی، تشنگی، افت فشار خون، سرگیجه، گیجی، صحبت کردن بریده بریده، دوبینی، ضعف عضلات، برادی کاردی، کما و سکته قلبی

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین + مینرال**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲ بلیستر ۱۵ عددی حاوی ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Vitamin A	۵۰۰۰ IU
Vitamin E	۳۰ IU
Vitamin BD	۴۰۰ IU
Vitamin B۱	۱/۵ mg
Vitamin B۲	۱/۷ mg
Vitamin B۶	۲ mg
Vitamin B۱۲	۶ mcg
Vitamin C	۶۰ mg
Nicotinamide	۲۰ mg
Folic Acid	۰/۴ mg
Iodine	۰/۱۵ mg
Calcium	۱۲۵ mg
Magnesium	۱۰۰ mg
Iron	۱۸ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک و کلوئیدال سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** به‌عنوان مکمل تغذیه‌ای جهت تقویت سیستم عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد همراه غذای اصلی و یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف فراورده، پس از تاریخ انقضای آن خودداری نمایید. در صورت مشاهده علائمی مانند راش و کهیر و قرمزی مصرف فراورده را متوقف نمایید و با پزشک خود مشورت کنید. این فراورده در افراد با مشکلات تیروئیدی باید با احتیاط بیشتری مصرف شود. در افرادی که سطح فسفات پایینی دارند فراورده باید با احتیاط مصرف گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **عوارض جانبی نادر:** خواب آلودگی، ضعف، سردرد و سرگیجه افزایش ترشح اشک و بزاق، احساس درد و گرفتگی در شکم، تغییر رنگ مدفوع، اسهال و حالت تهوع
واکنش‌های آلرژیک مانند کهیر، خارش و التهاب پوستی، ضربان قلب نامنظم، اختلال در تنفس و احساس گرفتگی در قفسه سینه، تورم گره لنفاوی، تورم صورت، گردن، لب‌ها و دهان
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از انجام تست‌های آزمایشگاه به پزشک یا آزمایشگاه اطلاع دهید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای زیر، با پزشک خود مشورت نمایید:
  - ○ ترکیبات حاوی سایر ویتامین‌ها خصوصا ویتامین D و A
  - ○ فنی توئین، کاربامازپین، لیتیوم و لوودوپا
  - ○ تتراسایکلین‌ها و کینولون‌ها
  - ○ داروهای ضدانعقاد مثل آسپرین
  - ○ متفورمین، کاپتوپریل، دیگوکسین و ایزونیازید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: زینک گلوکونات**
- **نام تجاری/ برند: نئوزینک**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی کپسول حاوی ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
Zinc (as gluconate)	۲۵ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک، لاکتوز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده به عنوان مکمل تجویز می‌گردد. کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و سلامت ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مجاز مصرف روزانه یک عدد کپسول (۲۵ الی ۵۰ میلی‌گرم) همراه با غذای اصلی می‌باشد. مقدار مصرف پیشنهادی روزانه یک عدد کپسول تحت نظر پزشک می‌باشد. این مقدار را بدون مشورت با داروساز خود افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت بروز هرگونه حساسیت با پزشک مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد.

گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **عوارض جانبی نادر:** مصرف مقادیر زیاد زینک ندرتاً ممکن است باعث بروز مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد اپی گاستر، تهوع و مشکلات هماتولوژیک شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مقدار زیاد روی ممکن است جذب مس از طریق روده را مختل نماید.

نمک‌های روی ممکن است جذب تتراسایکلین‌ها را از طریق ایجاد کمپلکس های غیر محلول کاهش دهند. از این رو فاصله زمانی حداقل ۲ ساعت بین تجویز مکمل‌های روی و تتراسایکین‌ها ضروری است.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: ویتامین سی+ زینک**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین سی + زینک - الحاوی**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت الحاوی**
- **تولیدشده در: تهران- ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ ساشه سه گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه
Zinc (as gluconate)	۱۰ mg
Vit C	۵۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مانیتول، سیتریک اسید، سدیم بیکربنات، سوکرالوز، رنگ خوراکی و اسانس چند میوه
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** این فراورده به عنوان مکمل تجویز می‌گردد. آنتی اکسیدان؛ جهت کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و سلامت ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف معمول روزانه یک ساشه است. محتوای هر ساشه می‌بایست در یک لیوان آب حل و سپس میل گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. از مصرف فراورده‌های تاریخ گذشته پرهیز نمایید. در بیماران مبتلا به هایپراگزالوریا با احتیاط و با تجویز پزشک معالج مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک متخصص می‌تواند مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به هر کدام از اجزای فراورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت تجویز پزشک و استفاده برحسب نیاز بدن، عوارض جانبی با مصرف این فراورده مشاهده نخواهد شد؛ به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید
- در صورت مصرف بیش از حد این فراورده اسهال، مشکلات گوارشی، هایپراگزالوریا، سنگ‌های کلیوی اگزالاتی ناشی از دریافت دوز بالای ویتامین سی محتمل می باشد
- مصرف بیش از حد ویتامین سی می‌تواند منجر به همولایزیس در بیماران مبتلا به نقص عملکردی G۶PD گردد
- در صورت مصرف این مکمل با معده خالی ممکن است عوارض گوارشی نظیر دردهای شکمی، سوهاضمه، تهوع، استفراغ و اسهال التهابات لوله گوارشی بروز یابد. به همین دلیل می‌توان این فراورده را بعد از غذا میل کرد تا ریسک بروز آن‌ها را کاهش دهد.

مصرف بیش از مقدار تعیین شده در این فرآورده در دراز مدت به واسطه‌ی مقادیر اضافی زینک و کاهش جذب مس می‌تواند منجر به کمبود مس در بدن گردد همچنین ممکن است سمیت حاصل از زینک منجر به بروز آنمی سیدروبلاستیک در افراد گردد.


- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** - عدم مصرف همزمان با دفروکسامین، ضدبارداری‌های خوراکی، هورمون درمانی، فلوفنازین و وارفارین به دلیل تداخل با جز ویتامین سی در صورت مصرف همزمان داروهای زیر، با پزشک خود مشورت نمایید:
- آهن، مس و فسفر
- تتراسایکلین
- فلوروکینولون‌ها نظیر سیپروفلوکساسین
- پنی سیلامین


• تداخلات آزمایشگاهی: قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی به پزشک یا آزمایشگاه اطلاع دهید

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ELSHAN DARU

شرکت داروسازی الشن دارو





- **نام فرآورده: هیدروکسی تریپتوفان**
- **نام تجاری/ برند: 5HTP ELSH**
- **شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت الشـن دارو مکمـل سـرزمین پـارس**
- **تولیدشده در: شرکت رفسنجان دارو**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قوطـی حـاوی ۳۰ عـدد کپسـول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
۵ -HTP	۱۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه آرامـش و القـای خـواب
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** در بزرگسـالان روزانـه یـک کپسـول ۱۰۰ میلی‌گرمـی ۲ تـا ۳ بـار در روز یـا طبـق دسـتور پزشـک مصـرف شـود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** در دوران بـارداری و شـیردهی طبـق دسـتور پزشـک مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** مصـرف همزمـان ایـن فـرآورده بـا داروهـای MAO inhibitor و SSRI ممنـوع می‌باشـد. در صـورت داشـتن بیمـاری پوسـتی scleroderma از مصـرف ایـن مکمـل خـودداری کنید.
- **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای پاییـن تـر از ۲۵ درجـه و دور از دسـترس کـودکان، نـور نگهداری شـود



- **نام فرآورده:** L-CARNITINE+ PANTHOTENIC ACID
- **نام تجاری/ برند:** فت برنر الشن
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت الشن دارو مکمل سرزمین پارس
- **تولیدشده در:** شرکت زاویه دارویی طب آریانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** محلول خوراکی ۲۴۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
ال-کارنیتین	۱۵۰۰ mg
کلسیم پانتوتنات	۱۰ mg


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به متابولیسم چربی‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱۰ سی سی محلول خوراکی در یک نوبت
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در زمان بارداری و شیردهی منعی ندارد. با این وجود مصرف این فراورده در بارداری فقط طبق دستور پزشک صورت گیرد.
- **موارد منع مصرف:** در بیماران هموفیلی مصرف فراورده ممنوع می‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض گوارشی مانند تهوع، اسهال و دل‌درد در شروع مصرف مخصوصا با دوزهای بالا محتمل است که با ادامه درمان رفع می‌شود. به منظور کاهش عوارض گوارشی مکمل در دوزهای منقسم، ترجیحا همراه یا بعد از غذا مصرف شود.


عوارض نادرتر مانند کاهش اشتها، سردرد، ضعف و مشکلات بینایی نیز وجود دارد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فراورده مکمل فت برنر الشن در دمای اتاق (کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد)، در جای خشک و خنک نگهداری شود. همچنین از یخ زدگی محافظت گردد.

Behsazan Pazhohan Omid Arya

شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا





- **نام فرآورده: قرص سلنیم پلاس (Selenium Plus Tablet)**
- **نام تجاری/ برند: سلنووُیا (Selenowoya)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش‌دار - ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
ویتامین A	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۱۰ واحد بین‌المللی
ویتامین C	۱۲۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت سولفات)	۴ میلی‌گرم
سلنیم (به‌صورت سدیم سلنیت)	۲۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
- **رده سنی:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص، ترجیحا با معده پر با آب کافی بلعیده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد. در صورت داشتن هرگونه بیماری یا مصرف هرگونه دارو یا مکمل دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید. در نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود. در صورت حساسیت به اجزای این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید. از مصرف همزمان این فرآورده با فراورده‌های حاوی مقادیر بالای کلسیم یا فیتات خودداری نمایید. این فرآورده را می‌توان در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** این فرآورده را می‌توان در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **موارد منع مصرف:** در نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود. در صورت حساسیت به اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فراورده با فراورده‌های حاوی مقادیر بالای کلسیم یا فیتات خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- **نام فرآورده:** قرص کلسیم + منیزیم + زینک + ویتامین د۳ (Calcium Magnesium Zinc & vit. D3)
- **نام تجاری/ برند:** Behsazan
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص روکش‌دار - ۶۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۱۰۰۰ میلی‌گرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم هیدروکساید)	۳۰۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک سولفات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص دو بار در روز بعد از غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیماران با عملکرد ضعیف کلیوی، بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت و هایپرکلسمی این فرآورده را با احتیاط مصرف کنند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص کلسیم + منیزیم + زینک + ویتامین د۳ (Calcium Magnesium Zinc & vit. D3)**
- **نام تجاری/ برند: Behsazan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش‌دار - ۹۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۱۰۰۰ میلی‌گرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم هیدروکساید)	۳۰۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک سولفات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص دو بار در روز بعد از غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیماران با عملکرد ضعیف کلیوی، بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت و هایپرکلسمی این فرآورده را با احتیاط مصرف کنند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص کلسیم + منیزیم + زینک + ویتامین د۳ (Calcium Magnesium Zinc & vit. D3)**
- **نام تجاری/ برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش‌دار - ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص روکش‌دار
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۱۰۰۰ میلی‌گرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم هیدروکساید)	۳۰۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک سولفات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص دو بار در روز، بعد از غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در بیماران با عملکرد ضعیف کلیوی، در بیماران مبتلا به hyperphosphatemia (میزان بالای فسفات خون)، hypophosphatemia (میزان پائین فسفات خون)، و یا هایپرکلسمی از مصرف مکمل‌های حاوی کلسیم بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، خودداری نمایند.

بیماران روماتوئید آرتریت به علت حضور زینک این فرآورده را با احتیاط مصرف کنند.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** می‌توان طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این مکمل در صورت مصرف مطابق دستور پزشک بی‌خطر است و به خوبی تحمل می‌شود. با این حال، ممکن است همراه با عوارض گوارشی از جمله تهوع و استفراغ، یبوست، درد معده، نفخ و اسهال نیز باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** برخی آنتی بیوتیک‌ها (سیپرو فلوکساسین، لووفلوکساسین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین) و همچنین لووتیروکسین با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم تداخل اثر دارند. کلسیم می‌تواند به علت خاصیت شلات‌کنندگی، جذب این داروها را کاهش دهد. این داروها باید حداقل ۲ ساعت قبل یا ۴ ساعت بعد از مصرف کلسیم میل شوند.


بیس فسفونات‌ها (آلندرونات) با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم تداخل اثر دارند، کلسیم میتواند جذب این داروها را کاهش دهد. باید با فاصله مصرف شود.

آهن: افراد در معرض فقر آهن، بهتر است مکمل‌های کلسیم را شب، هنگام خواب مصرف نمایند تا با جذب آهن تداخل نداشته باشد.

این محصول میتواند باعث کاهش اثر بخشی پنیسیلامین گردد و باید با ۲ ساعت فاصله از آن مصرف شود.

زینک به لحاظ تئوری می‌تواند اثر داروهای کاهنده قند خون را افزایش دهد.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- **نام فرآورده:** قرص کلسیم + ویتامین د۳ (Calcium vitamin D۳)
- **نام تجاری/ برند:** Behsazan
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص روکش‌دار - ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۲۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص دو بار در روز، بعد از غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در بیماران با عملکرد ضعیف کلیوی، در بیماران مبتلا به hyperphosphatemia (میزان بالای فسفات خون)، hypophosphatemia (میزان پائین فسفات خون)، و یا هایپرکلسمی از مصرف مکمل‌های حاوی کلسیم بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، خودداری نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** می‌توان طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این مکمل در صورت مصرف مطابق دستور پزشک بی‌خطر است و به خوبی تحمل می‌شود. با این حال، ممکن است همراه با عوارض گوارشی از جمله تهوع و استفراغ، یبوست، درد معده، نفخ و اسهال نیز باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** برخی آنتی بیوتیک‌ها (سیپرو فلوکساسین، لووفلوکساسین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین) و همچنین لووتیروکسین با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم تداخل اثر دارند. کلسیم می‌تواند به علت خاصیت شلات کنندگی، جذب این داروها را کاهش دهد. این داروها باید حداقل ۲ ساعت قبل یا ۴ ساعت بعد از مصرف کلسیم میل شوند.
بیس فسفونات‌ها (آلندرونات) با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم تداخل اثر دارند، کلسیم می‌تواند جذب این داروها را کاهش دهد. باید با فاصله مصرف شود.
آهن: افراد در معرض فقر آهن، بهتر است مکمل‌های کلسیم را شب، هنگام خواب مصرف نمایند تا با جذب آهن تداخل نداشته باشد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- **نام فرآورده:** قرص مولتی ویتامین جوشان با طعم لیمو (Multivitamin)
- **نام تجاری/ برند:** Woya Plus
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص جوشان - ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص جوشان
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۸۰ میلی‌گرم
نیاسین	۱۶ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۸ واحد بین‌المللی
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (به‌صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (به‌صورت تیامین هیدروکلراید)	۱/۱ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۲/۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم بی کربنات، سیتریک اسید، پلی وینیل پیرولیدون (PVP)، سوکرالوز، سوکروز، سوربیتول، پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰، طعم‌دهنده لیمو، رنگ سان ست زرد (Sunset Yellow)، سدیم بنزوات، لاکتوز
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۲ سال و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: روزانه ۱ عدد قرص در یک لیوان آب حل شود و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در کودکان زیر ۱۲ سال با نظر پزشک مصرف گردد.
در صورت مصرف هم زمان سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- نام فرآورده: قرص مولتی ویتامین روزانه
- نام تجاری/ برند: دیلی وُیا (Daily Woya)
- نام برند: Woya Plus
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا
- تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص روکش‌دار - ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
A ویتامین	۶۰۰۰ واحد بین‌المللی
C ویتامین	۶۰ میلی‌گرم
D ویتامین	۴۰۰ واحد بین‌المللی
E ویتامین	۳۰ واحد بین‌المللی
K ویتامین	۲۵ میکروگرم
ویتامین B1 (به‌صورت تیامین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B2 (به‌صورت ریبوفلاوین)	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B3 (به‌صورت نیاسین)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B6 (به‌صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۴ میلی‌گرم
ویتامین B12	۶ میکروگرم
بیوتین	۰/۰۴۵ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به‌صورت کلسیم پانتوتنات)	۱۰ میلی‌گرم
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۱۶۲ میلی‌گرم
آهن (به‌صورت فروس فومارات)	۱۸ میلی‌گرم

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
فسفر (به‌صورت سدیم فسفات)	۱۲۵ میلی‌گرم
ید (به‌صورت پتاسیم یدید)	۱۷۴ میکروگرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم اکساید)	۱۰۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک اکساید)	۱۵ میلی‌گرم
سلنیم (به‌صورت سلنیت سلنیت)	۱۵ میکروگرم
مس (به‌صورت کوپر اکساید)	۲ میلی‌گرم
منگنز (به‌صورت منگنز اکساید)	۲/۵ میلی‌گرم
کروم (به‌صورت کرومیوم کلراید)	۱۵ میکروگرم
مولیبدن (به‌صورت سدیم مولیبدات)	۱۵ میلی‌گرم
کلراید (به صورت پتاسیم کلراید)	۳۵ میلی‌گرم
پتاسیم (به‌صورت پتاسیم کلراید)	۴۰ میلی‌گرم
نیکل	۵ میکروگرم
قلع	۱۰ میکروگرم
سیلیکون	۸۰ میلی‌گرم
وانادیم	۱۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، مالتودکسترین، هایپرومولوز، پروپیلن گلیکول، تالک
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۲ سال و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان روزانه یک عدد قرص روکش‌دار همراه غذا میل شود و یا اینکه طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت داشتن هرگونه بیماری با مصرف هرگونه دارو با مکمل دیگر، در دوران بارداری یا شیردهی و همچنین در بیماران کلیوی، در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون و یا ضد فشار خون قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف این فرآورده در کودکان توصیه نمی‌شود.

بیش از مقدار توصیه شده از مکمل‌ها استفاده نکنید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثرات مطلوب ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از آن‌ها با پزشک با داروساز خود مشورت کنید. شایع‌ترین عوارض جانبی که با مصرف ویتامین‌ها دیده می‌شود شامل تهوع، اسهال، خستگی و یا سردرد می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** اورلیستات می‌تواند جذب ویتامین‌های محلول در چربی از جمله ویتامین A را کاهش دهد. فاصله زمانی اورلیستات با این فرآورده حداقل ۲ ساعت باشد.

کلستیرامین و کلستیپول، جذب فسفر و ویتامین D را مختل می‌نماید. بنابر این بین مصرف کلستیرامین و مکمل‌ها دو ساعت فاصله بیندازید.


فولیک اسید موجود در این فرآورده باعث کاهش اثر سولفونامیدها و متوترکسات می‌شود.

پنیسیلامین، متیل دوپا، لوودوپا، لووتیروکسین، سفالکسین، آنتی بیوتیک‌های تتراسیکلینی و کینولون‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، داکسی سیکلین، ...)، بیس فسفونات‌ها (آلندرونات)، داروهای HIV (از جمله Dolutegravir و Elvitegravir) با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم، آهن، زینک، مس و منیزیم تداخل اثر دارند (کاهش جذب داروها). فاصله مصرف بین این داروها با فرآورده حداقل ۳ ساعت باشد. ید موجود در این فرآورده با داروهای آنتی تیروئید (مانند متی مازول) ممکن است باعث افزایش اثر این داروها شود.

استفاده از آنتی اکسیدان‌ها مانند ویتامین C و E در طول شیمی درمانی می‌تواند فعالیت برخی از داروهای شیمی درمانی که رادیکال آزاد ایجاد می‌کنند را کاهش دهد. مصرف مکمل‌ها در بیماران سرطانی فقط با تجویز پزشک متخصص و درمانگر بلامانع است.

ویتامین K۲ اثر وارفارین را خنثی (آنتاگونیزه) می‌کند. همزمان با هم مصرف نشوند.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- نام فرآورده: قرص مولتی ویتامین روزانه
- نام تجاری/ برند: دیلی وُیا (Daily Woya)
- نام برند: Woya Plus
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت داروسـازی به‌سـازان پژوهـان امیـد آریـا
- تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قـرص روکـش‌دار - ۶۰ عـددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
A ویتامین	۶۰۰۰ واحد بین‌المللی
C ویتامین	۶۰ میلی‌گرم
D ویتامین	۴۰۰ واحد بین‌المللی
E ویتامین	۳۰ واحد بین‌المللی
K ویتامین	۲۵ میکروگرم
ویتامین B1 (به صورت تیامین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (به‌صورت ریبوفلاوین)	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (به‌صورت نیاسین)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (به‌صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۴ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۶ میکروگرم
بیوتین	۰/۰۴۵ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به صورت کلسیم پانتوتنات)	۱۰ میلی‌گرم
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۱۶۲ میلی‌گرم

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
آهن (به‌صورت فروس فومارات)	۱۸ میلی‌گرم
فسفر (به‌صورت سدیم فسفات)	۱۲۵ میلی‌گرم
ید (به‌صورت پتاسیم یدید)	۱۷۴ میکروگرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم اکساید)	۱۰۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک اکساید)	۱۵ میلی‌گرم
سلنیم (به‌صورت سلنیم سلنیت)	۱۵ میکروگرم
مس (به صورت کوپر اکساید)	۲ میلی‌گرم
منگنز (به‌صورت منگنز اکساید)	۲/۵ میلی‌گرم
کروم (به صورت کرومیوم کلراید)	۱۵ میکروگرم
مولیبدن (به‌صورت سدیم مولیبدات)	۱۵ میلی‌گرم
کلراید (به‌صورت پتاسیم کلراید)	۳۵ میلی‌گرم
پتاسیم (به‌صورت پتاسیم کلراید)	۴۰ میلی‌گرم
نیکل	۵ میکروگرم
قلع	۱۰ میکروگرم
سیلیکون	۸۰ میلی‌گرم
وانادیم	۱۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، مالتودکسترین، هایپرومولوز، پروپیلن گلیکول، تالک
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۲ سال و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان روزانه یک عدد قرص روکش‌دار همراه غذا میل شود و یا اینکه طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت داشتن هرگونه بیماری یا مصرف هرگونه دارو با مکمل دیگر، در دوران بارداری یا شیردهی و همچنین در بیماران کلیوی، در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون و یا ضد فشار خون قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف این فرآورده در کودکان توصیه نمی‌شود.

بیش از مقدار توصیه شده از مکمل‌ها استفاده نکنید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثرات مطلوب ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از آن‌ها با پزشک با داروساز خود مشورت کنید. شایع‌ترین عوارض جانبی که با مصرف ویتامین‌ها دیده می‌شود شامل تهوع، اسهال، خستگی و یا سردرد می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** اورلیستات می‌تواند جذب ویتامین‌های محلول در چربی از جمله ویتامین A را کاهش دهد. فاصله زمانی اورلیستات با این فرآورده حداقل ۲ ساعت باشد.

کلستیرامین و کلستیپول، جذب فسفر و ویتامین D را مختل می‌نماید. بنابراین بین مصرف کلستیرامین و مکمل‌ها دو ساعت فاصله بیندازید.

فولیک اسید موجود در این فرآورده باعث کاهش اثر سولفونامیدها و متوترکسات می‌شود.

پنیسیلامین، متیل دوپا، لوودوپا، لووتیروکسین، سفالکسین، آنتی بیوتیک‌های تتراسیکلینی و کینولون‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، داکسی سیکلین، ...)، بیس فسفونات‌ها (آلندرونات)، داروهای HIV (از جمله Dolutegravir و Elvitegravir) با این فرآورده به دلیل حضور کلسیم، آهن، زینک، مس و منیزیم تداخل اثر دارند (کاهش جذب داروها). فاصله مصرف بین این داروها با فرآورده حداقل ۳ ساعت باشد. ید موجود در این فرآورده با داروهای آنتی تیروئید (مانند متی مازول) ممکن است باعث افزایش اثر این داروها شود.

استفاده از آنتی اکسیدان‌ها مانند ویتامین C و E در طول شیمی درمانی می‌تواند فعالیت برخی از داروهای شیمی درمانی که رادیکال آزاد ایجاد می‌کنند را کاهش دهد. مصرف مکمل‌ها در بیماران سرطانی فقط با تجویز پزشک متخصص و درمانگر بلامانع است.

ویتامین K۲ اثر وارفارین را خنثی (آنتاگونیزه) می‌کند. همزمان با هم مصرف نشوند.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- **نام فرآورده:** قرص ملاتونین ۳ میلی‌گرم
- **نام تجاری/ برند:** وُیا اسلیپ (Woya Sleep)
- **نام برند:** Woya Plus
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص- ۱۰۰ عددی (۱۰ بلیستر ده تایی)
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ملاتونین (ان-استیل-۵-متوکسی تریپتامین)	۳ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، کلسیم کربنات، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکسید، استئاریک اسید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان شبی یک (۱) قرص، یک ساعت قبل از خواب و یا هنگام خواب میل شود یا طبق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
برای ادامه‌ی مصرف بیش از ۲ ماه با پزشک خود مشورت نمائید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف هرگونه دارو، مکمل یا گیاهان دارویی و یا در صورت ابتلا به هر نوع بیماری، و در کودکان کمتر از ۱۲ سال قبل از مصرف با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمائید.
در صورت بروز عوارض جانبی مصرف فرآورده را قطع و با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمائید.
پس از مصرف ملاتونین حدود ۴ تا ۵ ساعت از فعالیت‌های نیازمند به هشیاری مانند رانندگی یا کار با دستگاه‌ها پرهیز نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** از آنجائیکه اطلاعات قابل اطمینان در مورد ایمنی مصرف ملاتونین در بارداری و شیردهی در دسترس نیست از مصرف آن در بارداری و شیردهی اجتناب گردد.
- **موارد منع مصرف:** این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود.
مصرف ملاتونین به صورت خوراکی در دوزهای توصیه شده روزانه معمولا ایمن و بی‌عارضه است با اینحال ممکن است در برخی افراد موجب بروز برخی عوارض جانبی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خواب آلودگی و راش‌های خفیف پوستی و دردهای شکمی شود اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** ملاتونین ممکن است باعث تشدید اثر داروهای ضد انعقاد خون و ضد پلاکت مانند وارفارین، هپارین، کلوپیدوگرل، آسپیرین و NDASIها) گردد و در صورت مصرف همزمان بهتر است با احتیاط مصرف شوند.
ملاتونین ممکن است با کاهش اثر داروهای ضد تشنج همراه باشد و در صورت مصرف همزمان بهتر است با احتیاط مصرف شوند.
ملاتونین اثر داروهای کاهنده‌ی فشار خون، بنزودیازپین‌ها و الکل را افزایش می‌دهد.
ملاتونین باعث تحریک سیستم ایمنی شده و در روند درمان افراد دریافت کننده داروهای سرکوبگر ایمنی (مانند آزاتیوپورین، سیکلوسپورین، پردنیزون، داکلیزومب، ...) اختلال ایجاد می‌کند. از مصرف همزمان آنها اجتناب گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- **نام فرآورده:** قرص ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰ میکروگرم (Vtitamin B12 ۱۰۰۰ mcg)
- **نام تجاری/ برند:** وُیابی ۱۲ (WoyaB12®)
- **نام برند:** Woya Plus
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص - ۶۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین B12	۱۰۰۰ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، دی کلسیم فسفات، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات، سیلیکا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ب۱۲ موردنیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** افراد بالای ۱۲ سال روزانه یک عدد قرص میل شود. در صورت نیاز می‌توان مصرف را تا ۲ عدد قرص در روز افزایش داد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده به دلیل حضور ویتامین ب ۱۲ برای افرادی که استنت کرونری دریافت کرده‌اند، به علت احتمال ایجاد تنگی مجدد، توصیه نمی‌شود. در بیمارنی که حساسیت به کبالت یا کبالامین دارند، منع مصرف دارد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** بدون مشورت با پزشک توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص مولتی ویتامین مینرال دوران بارداری و شیردهی(Multivitamin mineral during pregnancy & lactation)
- **نام تجاری/ برند:** وُیاپرگنا (WoyaPregna®)
- **نام برند:** Woya Plus
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی بهسازان پژوهان امید آریا
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قرص - ۹۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین A (بصورت استات)	۴۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینC	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۱۱ واحد بین‌المللی
ویتامین B1 (بصورت هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۳	۱۸ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (بصورت هیدروکلراید)	۲/۶ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۸ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۴ میکروگرم
کلسیم (بصورت کربنات)	۲۰۰ میلی‌گرم
آهن (بصورت فومارات)	۲۷ میلی‌گرم
زینک (بصورت اکساید)	۲۵ میلی‌گرم
ید (بصورت پتاسیم)	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، PVP، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی موردنیاز بدن در بانوان باردار و شیرده
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** طبق تجویز پزشک و یا: از ۳ ماه قبل از بارداری تا پایان شیردهی، روزانه یک قرص همراه با غذا میل شود.
از مصرف بیش از مقدار توصیه شده بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر و یا در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید. در بیماران دیابتی این فرآورده ممکن است در کنترل سطح قند خون تاثیر گذار باشد، لذا قبل از مصرف این مکمل پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.






- **نام فرآورده: کپسول کافئین ۲۰۰ میلی‌گرم (mg ۲۰۰ caffeine)**
- **نام تجاری/ برند: وُیاکافئین® (WoyaCaffeine®)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول - ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
کافئین	۲۰۰میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش هوشیاری و تاخیر خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف هرگونه دارو یا مکمل دیگر، در صورت ابتلا به بیماری پارکینسون و یا بیماری‌های مزمن قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید. مصرف مقادیر بالاتر از حد مجاز روزانه باید حتما با تجویز پزشک انجام شود. این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- نام فرآورده: قرص مولتی ویتامین مینرال بالای ۵۰ سال (multivitamin and mineral ۵۰+)
- نام تجاری/ برند: وُیالایف (Woyalife®)
- نام برند: Woya Plus
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت داروسـازی به‌سـازان پژوهـان امیـد آریـا
- تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص - ۳۰عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
(به‌صورت استات) A ویتامین	۲۵۰۰واحد بین‌المللی
E ویتامین	۳۴ واحد بین‌المللی
(کوله کلسیفرول) D ویتامین	۱۰۰۰ واحد بین‌المللی
K ویتامین	۳۰ میکروگرم
C ویتامین	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (به‌صورت تیامین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (به‌صورت ریبوفلاوین)	۱/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (به‌صورت نیکوتینامید)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (به صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۳ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۲۵ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به‌صورت کلسیم پانتوتنات)	۱۰ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰میکروگرم

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم اکساید)	۵۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک سولفات)	۱۱ میلی‌گرم
مس (به‌صورت مس سولفات)	۵۰۰ میکروگرم
کلسیم (به‌صورت کلسیم کربنات)	۲۲۰ میلی‌گرم
فسفر (به‌صورت سدیم فسفات)	۲۰ میلی‌گرم
کروم (به‌صورت کلرید کروم)	۵۰ میکروگرم
ید (به‌صورت پتاسیم یدید)	۱۵۰ میکروگرم
منگنز (به‌صورت منگنز سولفات)	۲/۳ میلی‌گرم
سلنیم (به‌صورت سدیم سلنات)	۱۹ میکروگرم
مولیبدن (به‌صورت سدیم مولیبدات)	۴۵ میکروگرم
کلراید (به صورت پتاسیم کلراید)	۷۲/۵ میلی‌گرم
پتاسیم (به صورت پتاسیم کلراید)	۸۰ میلی‌گرم
لوتئین	۲۵۰ میکروگرم
لیکوپن	۳۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، پوویدون، منیزیم استئارات و نشاسته ذرت، روکش رنگی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن در افراد بالای ۵۰ سال
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه وعده غذایی اصلی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد. در صورت مصرف همزمان با سایر فراورده‌ها/ داروهای دیگر و یا در صورت ابتلا به صرع، اختلالات تیروئید، هموکروماتوز، آلرژی به اجزای تشکیل‌دهنده فرآورده و در دوران بارداری و شیردهی، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.






- **نام فرآورده: قرص بیوتن بپانتن (Biotin + Bepanthen Tablet)**
- **نام تجاری/ برند: وُیاهیر® (Woyahair®)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص - ۳۰عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
بیوتین	۵ میلی‌گرم
بپانتن (به‌صورت کلسیم پنتوتنات)	۵۰۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، استئاریک اسید، تیتانیوم دی اکساید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** در افراد بزرگسال هفته‌ای ۲ عدد قرص همراه با غذا و امکان مصرف قرص طبق دستور پزشک تا روزی یک عدد
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت بروز حساسیت به اجزاء این فرآورده، از مصرف آن خودداری کنید. این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** تحت نظر پزشک بلامانع است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص لوتئین پلاس (Lutein Plus Tablet)**
- **نام تجاری/ برند: وُیاویژن® (Woyavision®)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص - ۳۰عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص روکش‌دار
ویتامین E	۴۵واحد بین‌المللی
ویتامین C	۱۸۰ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۴/۲ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت اکساید)	۱۵ میلی‌گرم
زیگزانتین	۵ میلی‌گرم
لوتئین	۱۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز مونوهیدرات، دی کلسیم فسفات، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، پوویدون
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان و کمک به سلامت چشم
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان روزانه یک عدد قرص میل نمایند.
مقدار مصرف این فرآورده در بزرگسالان می‌تواند تا ۲ قرص در روز افزایش یابد و یا طبق نظر پزشک معالج مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف هرگونه دارو، مکمل یا گیاهان دارویی، در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمائید. در صورت بروز حساسیت به اجزاء این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید. بیش از مقدار توصیه شده از این فرآورده استفاده نکنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** فقط تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سافت ژل ویتامین ای ۴۰۰ واحد بین‌المللی (IU ۴۰۰ vitamin E)**
- **نام تجاری/ برند: وُیاویژن® (Woyavision®)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ای	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ای و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد سافت ژل همراه وعده غذایی اصلی و یا طبق دستور پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به بیماری‌های عروقی (مانند بیماری قلبی یا سابقه سکته)، افراد مبتلا به دیابت و سابقه ابتلا به بیماری‌های انعقادی خون، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** فقط تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سافت ژل ویتامین ای ۴۰۰ واحد بین‌المللی (IU ۴۰۰ vitamin E)**
- **نام تجاری/ برند: ای- وُیا (E-Woya)**
- **نام برند: Woya Plus**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۹۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ای	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ای و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد سافت ژل همراه وعده غذایی اصلی و یا طبق دستور پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به بیماری‌های عروقی (مانند بیماری قلبی یا سابقه سکته)، افراد مبتلا به دیابت و سابقه ابتلا به بیماری‌های انعقادی خون، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** فقط تحت نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جویدنی ویتامین ث ۱۰۰۰ میلی‌گرم (Vitamin C ۱۰۰۰ mg)**
- **نام تجاری/ برند: Behsazan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص جویدنی - ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، سیلیکون دی اکساید، استئاریک اسید، منیزیم استئارات، سوکرالوز، آهن اکساید، طعم دهنده پرتقال طبیعی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث، کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص جویده شود و یا اینکه طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
بیماران مبتلا به سرطان و نارسایی کلیوی قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هم زمان با داروهای ضد انعقاد خون، داروهای شیمی درمانی یا سایر فراورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** حداکثر میزان مجاز دریافت در بزرگسالان ۲۰۰۰ میلی‌گرم است و دریافت ویتامین C بالاتر از این مقدار در طولانی مدت باعث به خطر انداختن سلامتی می‌شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** دریافت بیش از حد ویتامین C با افزایش دفع اگزالات ادرار و اوریک اسید همراه است که در افراد مستعد سنگ کلیه می‌تواند باعث تشکیل سنگ شود. همچنین در افراد مبتلا به هموکروماتوز ارثی با افزایش جذب آهن می‌تواند باعث آسیب بافتی شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جویدنی ویتامین ث ۱۰۰۰ میلی‌گرم (mg ۱۰۰۰ Vitamin C)**
- **نام تجاری/ برند: Behsazan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص جویدنی - ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین C	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، سیلیکون دی اکساید، استئاریک اسید، منیزیم استئارات، سوکرالوز، آهن اکساید، طعم دهنده پرتقال طبیعی
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث، کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص (بعد از غذا) جویده شود و یا اینکه طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خون، ضدبارداری و داروهای حاوی آلومینیوم یا داروهای شیمی درمانی یا سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. بیماران مبتلا به سرطان و نارسایی کلیوی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** می‌توان طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. از مهمترین عوارض جانبی این فرآورده میتوان به سردرد، سنگ کلیه در افراد مستعد سنگ کلیه و همچنین اختلالات گوارشی خفیف مانند تهوع، اسهال و دل درد اشاره نمود که با مصرف فرآورده همراه غذا این مشکل برطرف می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** استفاده از آنتی اکسیدان‌ها مانند ویتامین C در طول شیمی‌درمانی می‌تواند فعالیت داروهای شیمی درمانی را کاهش دهد.
مصرف همزمان داروهای حاوی آلومینیوم با ویتامین C ممکن است منجر به زیادی آلومینیوم خون، به ویژه در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی گردد.
مصرف همزمان داروهای ضدبارداری با ویتامین C ممکن است سطح استروژن را در خون افزایش دهد. مصرف همزمان دوز بالای ویتامین C با وارفارین ممکن است اثر ضدانعقادی آن را کاهش دهد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده درون جعبه در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. فرآورده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.




- **نام فرآورده: ویتامین ث جوشان ۱۰۰۰ میلی‌گرم با طعم پرتقال (Vitamin C)**
- **نام تجاری/ برند: Behsazan**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی به‌سازان پژوهان امید آریا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قرص جوشان - ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**


جز	مقدار در هر قرص جوشان
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم بی کربنات، سیتریک اسید، شکر، سوکرالوز، لاکتوز، طعم دهنده پرتقال، رنگ مجاز خوراکی، سوربیتول، پوویدون، پلی اتیلن گلیکول و سدیم بنزوات
- **رده سنی:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن، کمک به تامین ویتامین ث
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: روزانه ۱ عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و میل نمایند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
همچنین افراد مبتلا به نارسایی کلیوی و بیماری‌های مزمن مانند سرطان قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هم زمان با داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد بارداری یا سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

PARS HAYAN
Pharmaceuticals

شرکت داروسازی پارس حیان





- **نام فرآورده: درمکس اگزوتین (Dermax Eczotin)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی-۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
زینک (به‌صورت زینک سیترات)	۱۰ میلی‌گرم
سلنیوم (به‌صورت سلنومتیونین)	۱۰۰ میکروگرم
اسیدهای چرب امگا۳ (برگرفته از پودر روغن ماهی امگا۳)	۲۰ میلی‌گرم
پودر برگ گیاه کنگرفرنگی	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره دانه انگور	۱۰۰ میلی‌گرم
پودر دانه گیاه خار مریم	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره برگ زیتون	۱۰۰ میلی‌گرم
گاما لینولئیک اسید (برگرفته از گل گاو زبان)	۲۰ میلی‌گرم
کلاژن هیدرولیزشده نوع دو	۳۰۰ میلی‌گرم
کندرویتین سولفات	۱۰۰ میلی‌گرم
هیالورونیک اسید	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید، میکروکریستالین سلولز، دی بازیک کلسیم فسفات، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست خشک
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو بار، صبح و عصر، هر بار یک عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک همراه با یک لیوان آب مصرف گردد. جهت حصول نتیجه بهتر مصرف فرآورده می‌بایست به مدت ۴۵ الی ۶۰ روز ادامه یابد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به اجزای فرمولاسیون این فرآورده از مصرف آن خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هم زمان با داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد بارداری یا سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور، رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس پیگمنتا (Dermax Pigmenta)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
ال-گلوتاتیون	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین C	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۰۰ واحد بین‌المللی
آلفا-لیپوئیک اسید	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره دانه انگور	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به روشن نمودن لکه‌های تیره و نقاط کدر پوست، کمک به روشن نمودن پوست و کاهش چین و چروک، کمک به رفع جای جوش، کمک به محافظت از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از اکسیداسیون سلولی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ عدد کپسول یا مطابق دستور پزشک همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت وجود سنگ‌های کلیوی کلسیمی و اگزالوریا با احتیاط مصرف گردد. در صورت بروز حساسیت مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت نمایید. در افراد مبتلا به بیماری‌های کبدی، کلیوی، دیابت خون، فشار خون بالا یا پایین، افرادی که تحت شیمی درمانی قرار دارند با مشورت و تحت نظر پزشک مصرف شود. در صورت مصرف برخی داروها از جمله ضد پلاکت، ضد انعقاد و رقیق‌کننده خون قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف فرآورده برای کودکان توصیه نمی‌گردد. در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف فرآورده مجاز نمی‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی معمولا به ندرت دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به دلیل تداخل فرآورده با برخی داروها از جمله ضد پلاکت و رقیق کننده خون مثل وارفارین، آسپیرین، کاهنده چربی خون از قبیل استاتین‌ها، شیمی درمانی، میدازولام، انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون در صورت مصرف همزمان با پزشک یا داروساز مشورت گردد.

تداخلات آزمایشگاهی:
فرآورده ممکن است باعث کاهش کاذب میزان کلسترول HDL در آزمایش خون گردد.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**

مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است عوارض جانبی زیر را به همراه داشته باشد: (در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض با پزشک مشورت نمایید)

۱. واکنش‌های آلرژیک پوستی چون کهیر، راش، خارش و پوسته پوسته شدن.

۲. عوارض گوارشی از جمله اسهال، تهوع، استفراغ، نفخ و کرامپ شکمی، زخم گوارشی و سایر عوارض خونی چون افزایش ریسک خونریزی به خصوص در افراد دریافت کننده داروهای رقیق کننده خون و ضد پلاکت

۳. افزایش احتمال تشکیل سنگ کلیه بخصوص در افراد مستعد

۴. سرگیجه، سردرد، افزایش فشار خون، کاهش قند خون بخصوص در افراد دیابتی و مصرف کننده انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون

۵. عوارض تنفسی و قلبی عروقی بخصوص برای افراد مستعد و دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.



- نام فرآورده: درمکس رجوا (Dermax Rejuva)
- نام تجاری/ برند: Dermax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: کپسـول خوراکـی- ۳۰ عـددی (۳ بلیسـتر ده تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین A (به‌صورت رتینیل استات)	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین C (به‌صورت آسکوربیک اسید)	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۸۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (به‌صورت توکوفریل سوکسینات)	۱۵ واحد بین‌المللی
ویتامین B۱ (تیامین هیدروکلراید)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲ (به‌صورت سیانوکوبالامین)	۵۰ میکروگرم
بیوتین	۵۰۰۰ میکروگرم
زینک (به‌صورت زینک اکساید)	۱۱ میلی‌گرم
مس (به‌صورت مس سولفات)	۲ میلی‌گرم
منگنز (به‌صورت منگنز کربنات)	۲ میلی‌گرم
ال-سیستئین هیدروکلراید	۲۵ میلی‌گرم
کلاژن دریایی	۲۵ میلی‌گرم
لوتئین (برگرفته از گل همیشه بهار)	۱۰ میلی‌گرم
هیالورونیک اسید	۵ میلی‌گرم
آلفا-لیپوئیک اسید	۱۰ میلی‌گرم
عصاره دم اَسب	۳ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک کمک به تقویت و رشد مو، کمک به تقویت و استحکام ناخن‌ها، کمک به حفظ شادابی و سلامت پوست
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد کپسول یا مطابق دستور پزشک، همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

• در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروها دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در افراد مبتلا به بیماری‌های دیابتی، کبدی یا تیروئیدی با مشورت پزشک مصرف شود.

در صورت بروز هرگونه علایم آلرژی، مصرف فرآورده را متوقف نموده و به پزشک مراجعه فرمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیش از میزان توصیه شده مصرف نگردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در افراد مبتلا به کمبود ویتامین K به دلیل احتمال بدتر شدن و ایجاد مشکلات لخته خون مصرف این مکمل مجاز نمی‌باشد.

در افراد مبتلا به مشکلات انعقادی خون و خونریزی، آلرژی و آسم مصرف این مکمل مجاز نمی‌باشد.

دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف این مکمل مجاز نمی‌باشد.

برای کودکان کمتر از ۴ سال مصرف این مکمل مجاز نمی‌باشد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی معمولا به ندرت دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد و رقیق کننده خون از جمله وارفارین، برخی از آنتی بیوتیک‌ها مشابه سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین حتما با مشورت پزشک مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است عوارض جانبی زیر را به همراه داشته باشد: (در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض با پزشک مشورت نمایید.)

عوارض گوارشی از جمله اسهال، سردرد، درد شکمی، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ


عوارض پوستی از جمله خارش بدن

عوارض نادر از جمله اختلال در بلع، تب، سرگیجه، سرفه، درد و التهاب مفاصل، قرمزی و تغییر رنگ پوست، جوش‌های جلدی

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت و حرارت نگهداری شود.

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: درمکس سولاریس (Dermax Solarice)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین A (به صورت مخلوط کاروتن‌ها)	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین C (به صورت آسکوربیک اسید)	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین E (به صورت آلفا-توکوفرول استات)	۱۰۰ واحد بین‌المللی
زینک (به صورت زینک سیترات)	۱۰۰ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت ال-سلنومتیونین)	۵۰ میلی‌گرم
مخلوط ترکیبات آنتی اکسیدان (عصاره برگ گیاه polypodium leucotomos، عصاره چای سبز، اسیدهای چرب امگا۳، عصاره دانه انگور، لیکوپن، لوتئین، آستاگزانتین(Astaxanthin)، زاگزانتین(Zeaxanthin)، مخلوط کاروتن‌ها)	۵۴۸ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**

کمک به تقویت ساختار دفاعی پوست و محافظت از پوست و چشم‌ها در برابر اشعه‌های مضر نور خورشید، کمک به جلوگیری از ایجاد چین و چروک و پیری زودرس پوست، کمک به تولید طبیعی ویتامین D۳ از طریق پوست، کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر اثرات زیانبار رادیکال‌های آزاد

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ الی ۲ عدد کپسول یک ساعت قبل از قرارگیری در معرض تابش نور خورشید همراه با یک لیوان آب و یا طبق دستور پزشک مصرف گردد. جهت حصول نتیجه بهتر و حداکثر اثر، حتی در صورت عدم قرارگیری در معرض نور خورشید، مصرف فرآورده را بطور روزانه و به مدت چند هفته ادامه دهید. در صورت قرارگیری طولانی مدت در معرض نور خورشید مصرف ۲ کپسول در روز توصیه می‌گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت وجود سابقه حساسیت به ویتامین A یا مشتقات آن (کاروتن‌ها)، کافئین، انگور، گوجه فرنگی یا ویتامین E از مصرف فرآورده پرهیز گردد.

در صورت ایجاد واکنش‌های حساسیتی حین مصرف فرآورده مصرف را قطع نموده و با پزشک مشورت نمایید.

بیش از میزان توصیه شده مصرف نگردد.

مصرف فرآورده برای کودکان توصیه نمی‌گردد.

در صورت مصرف همزمان دارو یا مکمل دیگر، قبل از مصرف فرآورده با پزشک مشورت نمایید.

این فرآورده جایگزین محصولات ضد آفتاب نمی‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف فرآورده در بیماران با اختلال هایپرویتامینوز A ممنوع می‌باشد.

دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف این مکمل مجاز نمی باشد .


- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی معمولا به ندرت دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به دلیل تداخل فرآورده با برخی داروها از قبیل ضد پلاکت‌ها و رقیق کننده‌های خونی مثل وارفارین، آسپرین و ضد دردهایی مانند استامینوفن، برخی آنتی بیوتیک‌ها مانند تتراسایکلین‌ها و فلوئوروکینولون‌ها،

استروژن و ضد بارداری‌های خوراکی، کاهنده چربی خون مانند استاتین‌ها و کلستیرامین، پنی سیلامین، دیورتیک‌های تیازیدی مانند کلرتالیدون و هیدروکلروتیازید، داروهای محرک و ضد افسردگی، شیمی درمانی از جمله سیس پلاتین، پنی سیلامین، آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم، برخی املاح چون آهن، مس، کلسیم، منیزیم، منگنز، EDTA و املاح آن در صورت مصرف همزمان، با پزشک یا داروساز مشورت گردد.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است عوارض جانبی زیر را به همراه داشته باشد: (در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض با پزشک مشورت نمایید)

۱. ایجاد حساسیت به فرآورده و هر یک از مواد درون فرآورده
۲. عوارض گوارشی از جمله اسهال، تهوع، استفراغ، نفخ و کرامپ شکمی، اولسر گوارشی و غیره
۳. عوارض پوستی از جمله راش و حساسیت پوستی، خارش، پوسته پوسته شدن و درماتیت
۴. سردرد، خستگی، ضعف و بی‌اشتهایی، دو بینی، ایجاد مزه فلزی و بوی سیر در دهان
۵. تاری دید، التهابات و درد استخوانی و مفاصل و علایم شبیه سرماخوردگی
۶. اختلالات عصبی از جمله بی قراری، اضطراب
۷. رقیق شدن خون و افزایش خونریزی بخصوص در افراد دریافت کننده داروهای رقیق کننده خون

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: درمکس لاکتوزینک (Dermax Lactozinc)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
عصاره خشک بنفشه سه رنگ (viola tricolor)	۲۶۲/۵ میلی‌گرم
عصاره خشک گزنه (Urtica dioica)	۲۶/۲۵ میلی‌گرم
عصاره دانه گیاه دم اسب (Equisetum arvense)	۲۶/۲۵ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک اکساید)	۱۰ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت سدیم سلنات)	۲۵ میکروگرم
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات)	۷۰۰ میکروگرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۸۰۰ میکروگرم
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۵ (دی-کلسیم پانتوتنات)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی‌گرم
ویتامین E استات (دی-ال آلفا توکوفرول استات)	۱۰ واحد بین‌المللی
بتا-کاروتن ۲۰٪	۱۰۰۰ میکروگرم
لاکتوفرین (مشتق شده از شیر خشک)	۲۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، میکروکریستالین سلولز {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت و پاکسازی پوست، کمک به کاهش آکنه و کاهش التهابات ناشی از آن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با آب فراوان، به مدت ۳۰ روز و یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به‌ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس هلیوبرنز (Dermax Helio Bronze)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
بتا-کاروتن طبیعی	۳۰ میلی‌گرم
ویتامین E (به صورت دی-آلفا توکوفرول)	۱۲ میلی‌گرم
لوتئین (برگرفته از گل همیشه بهار)	۳ میلی‌گرم
لیکوپن (برگرفته از گوجه‌فرنگی)	۲ میلی‌گرم
آستاگزانتین (Astaxanthin) (عصاره کارتنوئید جلبک)	۱ میلی‌گرم
زاگزانتین (Zeaxanthin) (برگرفته از گل همیشه بهار)	۰/۳۳ ۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** افزایش سرعت و کیفیت برنزه شدن پوست توسط نور خورشید و کمک به ماندگاری رنگ برنزه پوست، کمک به حفظ سلامت پوست در برابر پرتوهای مضر نور خورشید، کمک به محافظت از پوست در برابر اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد با دارا بودن خواص آنتی‌اکسیدانی قوی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ بار، هر بار دو عدد کپسول همراه غذا و با یک لیوان آب به مدت دو هفته و پس از آن جهت ادامه مصرف، روزانه ۲ بار، هر بار یک عدد کپسول و یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت ایجاد تنش های حساسیتی حین مصرف فرآورده مصرف را قطع نموده و با پزشک مشورت نمایید
در افراد دیابتی، مبتلا به بیماری کلیوی، کبدی و ریوی، فشار خون بالا یا پایین، آریتمی قلبی و یا دارای سابقه سکته قلبی با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود.
در صورت مصرف برخی داروها از جمله داروهای ضد پلاکت و رقیق کننده خون یا مکمل‌های تغذیه‌ای دیگر مانند جینکگو بیلوبا قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان توصیه شده مصرف نگردد.
مصرف فرآورده برای کودکان توصیه نمی‌گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در افراد با مشکلات شدید کبدی مصرف فرآورده ممنوع می‌باشد.
مصرف فرآورده در بیماران با اختلال هایپرویتامینوز A ممنوع می‌باشد.
در صورت وجود سابقه حساسیت به ویتامین A یا مشتقات آن (کاروتن‌ها)، گوجه فرنگی یا ویتامین E از مصرف فرآورده پرهیز گردد.
دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف این مکمل مجاز نمی‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی معمولا به ندرت دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به دلیل تداخل دارویی فرآورده با برخی داروها از جمله داروهای ضد پلاکت و رقیق کننده خون مثل وارفارین، آسپرین، تیکلوپیدین، کلوپیدوگرل، هپارین، دالتپارین، انوکساپارین، کاهنده چربی خون از جمله استاتین‌ها و کلستیرامین و ارلیستات، کلشی‌سین، داروهای محرک و ضد افسردگی، ضد تشنج، داروهای بیهوش کننده، داروهای قلیایی کننده اسید معده از قبیل امپرازول و لانسوپرازول، داروهای شیمی درمانی از جمله سیس پلاتین، پنی سیلامین در صورت مصرف همزمان، با پزشک یا داروساز مشورت گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است عوارض جانبی زیر را به همراه داشته باشد: (در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض با پزشک مشورت نمایید)
۱. عوارض گوارشی از جمله اسهال، تهوع، استفراغ، نفخ و کرامپ شکمی و سایر عوارض.
۲. عوارض پوستی شامل راش، حساسیت پوستی و خارش.
۳. سردرد، خستگی، ضعف، بی‌اشتهایی و دو بینی
۴. رنگ پریدگی و زرد شدن یا پرتقالی شدن رنگ پوست
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
پس از هر بار مصرف درب بطری را محکم ببندید.



- نام فرآورده: نوتراکس پرِگناسِیف (Nutrax Pregnasafe)
- نام تجاری/ برند: Nutrax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قـرص- ۳۰ عـددی (۲ بلیسـتر ۱۵ تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر کپسول
ال-آرژینین	۱۰۰ میلی‌گرم
اینوزیتول	۵۰ میلی‌گرم
ان-استیل سیستئین	۵۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن ۲۰٪	۳ میلی‌گرم
ویتامین D۳ (کوله کلسی فرول)	۶۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی-ال آلفا توکوفرول استات)	۴ واحد بین‌المللی
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۹۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (تیامین مونونیترات)	۸ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۲۰ میکرو گرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به صورت کلسیم دی-پانتوتنات)	۶ میلی‌گرم
منیزیم (به صورت منیزیم اکساید)	۶۰ میلی‌گرم
آهن (به صورت فروس فومارات)	۱۴ میلی‌گرم
زینک (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۱۵ میلی‌گرم
مس (به صورت کوپر سولفات پنتاهیدرات)	۱۰۰۰ میکروگرم
سلنیوم (به صورت سدیم سلنات)	۵۰ میکروگرم
ید (به صورت پتاسیم یدید)	۱۵۰ میکروگرم

● **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلرو فنول، اتیل سلولز، پوویدون، سدیم استارچ گلیکولات، سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، میکروکریستالین سلولز، هیپروملوز (Hypromellose)، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، رنگ قرمز پونسیو (CI ۱۶۲۵۵) {{فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}

● **رده سنی:** بزرگسالان

● **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت قدرت باروری بانوان، کمک به تامین مواد مغذی ضروری قبل از بارداری

● **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص و یا طبق دستور پزشک همراه با غذا و یک لیوان آب، ترجیحا سه ماه قبل از تصمیم به باردار شدن مصرف نمایید.

● **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
برای افراد زیر ۱۸ سال با توصیه پزشک یا داروساز مصرف گردد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.
مصرف همزمان فرآورده با داروهای دیگر ممکن است اثربخشی این مکمل و یا داروی مصرفی را تحت تاثیر قرار داده و سبب تشدید اثرات جانبی گردیده و یا کم شدن یا از بین رفتن تاثیر مکمل بر بدن را به همراه داشته باشد. لذا در صورت مصرف هر گونه دارو یا مکمل دیگر، قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
تغییر در چرخه ماهانه توسط برخی از زنان، همزمان با استفاده از این محصول ممکن است مشاهده گردد. در این صورت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

● **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

● **موارد منع مصرف:** -

● **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.


● **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -

● **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -

● **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

● **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: نوتراکس پروستافورت (Nutrax Prostafort)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
عصاره دانه کدو تنبل	۳۶۰ میلی‌گرم
ویتامین E استات (دی-ال آلفا توکوفرول استات)	۳۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید، تالک{فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پروستات
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول یا طبق دستور پزشک همراه با یک لیوان آب و ترجیحا با غذا مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

مصرف فرآورده برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌گردد مگر با توصیه پزشک.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.


در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت پیدایش هرگونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف این فرآورده مجاز نمی‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت و حرارت نگهداری شود. این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس پریوتین (Nutrax Priotin)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
بیوتین	۲۰۰ میکروگرم
ال-سیستئین	۶ میلی‌گرم
عصاره ارزن چمنی (Millet Extract)	۴۲۰ میلی‌گرم
کلسیم دی-پانتوتنات (Vitamin B5)	۳۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید، اتیل سلولز، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۴ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت مو، ناخن و پوست
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** جهت بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۴ سال روزانه دو عدد کپسول به مدت ۳ الی ۶ ماه یا طبق دستور پزشک همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد. در صورت لزوم، این مکمل می‌تواند به مدت یکسال مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
مصرف فرآورده برای افراد زیر ۱۴ سال توصیه نمی‌گردد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هرگونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی، مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت و حرارت نگهداری شود. این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس سلنوزینک (Nutrax SelenoZinc)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین A (به‌صورت رتینیل پالمیتات)	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (به‌صورت آلفا-توکوفرول)	۱۵ واحد بین‌المللی
ویتامین C (به صورت آسکوربیک اسید)	۹۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (به‌صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱/۶ میلی‌گرم
سلنیوم (به‌صورت ال-سلنومتیونین)	۱۰۰ میکروگرم
زینک (به‌صورت زینک گلوکونات)	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک ترجیحا همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هرگونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- نام فرآورده: نوتراکس فیمِیل بوست (Nutrax Female Boost)
- نام تجاری/ برند: Nutrax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: کپسـول خوراکـی- ۳۰ عـددی (۳ بلیسـتر ده تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۱۰ میلی‌گرم
زینک (به‌صورت زینک سیترات)	۸/۳۳ میلی‌گرم
عصاره خارخاسک (Tribulus terrestris)	۲۰۰ میلی‌گرم
عصاره گیاه بز شاخدار (Epimedium grandiflorum)	۳۳/۳۳ میلی‌گرم
عصاره گیاه تونکات علی (Eurycoma longifolia)	۳۳/۳۳ میلی‌گرم
ال-آرژینین	۳۳/۳۳ میلی‌گرم
عصاره ریشه گیاه ماکا (Lepidium meyenii)	۲۵ میلی‌گرم
DHEA (پراسترون)	۱۶/۶۷ میلی‌گرم
عصاره شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)	۲۰۰ میلی‌گرم
عصاره لوبیا مخملی (Mucuna pruriens)	۱۲/۵ میلی‌گرم
عصاره جینسنگ (panax ginseng)	۲۵ میلی‌گرم
پروتئین آب پنیر	۱۶/۶۷ میلی‌گرم
آسپارتیک اسید	۸/۳۳ میلی‌گرم
بورون (سدیم متا-بورات تتراهیدرات)	۰/۳۳ میلی‌گرم

● **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {{فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
● **رده سنی:** بزرگسالان
● **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش قدرت و میل جنسی بانوان، کمک به حفظ تعادل هورمون‌ها
● **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول (حداکثر چهار کپسول در هفته) و یا طبق دستور پزشک، همراه با یک لیوان آب مصرف گردد. بیش از ۴ کپسول در هفته مصرف نگردد.
● **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
برای افراد زیر ۱۸ سال با توصیه پزشک یا داروساز مصرف گردد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ایجاد آکنه افزایش ترشح چربی یا التهاب پوست دوز مصرف را کاهش دهید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

این فرآورده جهت درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی بالینی در نظر گرفته نشده است.
● **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
● **موارد منع مصرف:** -
● **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
● **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان فرآورده با داروهای دیگر ممکن است اثربخشی این مکمل و یا داروی مصرفی را تحت تاثیر قرار داده و سبب تشدید اثرات جانبی می‌گردد، لذا در صورت مصرف هرگونه دارو به ویژه داروهای اعصاب از جمله بازدارنده مونوآمین اکسیدان (MAO)، مهارکننده انتخابی سروتونین (SSRI) و یا مکمل دیگر، قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
● **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
● **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
● **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: نوتراکس کوبالین (Nutrax Cobalyn)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۱۰۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تامین ویتامین B۱۲ مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز خون، بهبود فعالیت سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک با داروساز مشورت نمایید. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک افزایش ندهید.
در صورت پیدایش هرگونه علائم حساسیت مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک تماس گرفته شود. در کم خونی‌های ناشی از کمبود آهن یا اسید فولیک زیر نظر پزشک معالج مصرف گردد.
همچنین مصرف فرآورده در بیماران با کم خونی پلی‌سیتمی ورا (Polycythemia Vera) با احتیاط و زیر نظر پزشک باشد.
مصرف فرآورده در بیماران با کمبود پتاسیم سرم خون (هایپوکالمی) با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام گیرد. در این افراد بررسی میزان پتاسیم خون ضروری است و در صورت نیاز بایستی همزمان با مصرف این فرآورده، پتاسیم نیز تجویز گردد.
به دلیل مشکل جذب فرآورده در افراد با اختلالات جذب غذایی، پانکراتیت، سابقه جراحی معده/روده، بیماری‌های معده/روده مانند کرون و کولیت و نیز سابقه پرتوزدگی روده کوچک، مصرف این فرآورده توصیه نمی‌گردد.
مصرف فرآورده برای کودکان توصیه نمی‌گردد.
در صورت وجود عفونت و اورمی مصرف فرآورده با احتیاط زیر نظر پزشک انجام گیرد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود سابقه حساسیت به ویتامین B۱۲ و کبالت از مصرف فرآورده پرهیز گردد.

مصرف فرآورده در بیماران دارای کم‌خونی با عامل ناشناخته ممنوع است.
مصرف فرآورده در افراد با بیماری نوروپاتی ارثی عصب بینایی لبر (LHON) ممنوع می‌باشد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** فرآورده ایمن می‌باشد.

در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی حتی اگر در برگه راهنما بیان نشده است با پزشک یا داروساز در میان بگذارید.


- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به دلیل تداخل B۱۲ با آنتی بیوتیک‌های گلیکوزیدی (جنتامایسین، نئومایسین و توبرامایسین)، کلشی‌سین، آمینوسالسیلیک اسید و املاح آن، محصولات ضد تشنج (فنی‌توئین، فنوباربیتال و پریمیدون)، الکل، کلرامفنیکل، متفورمین، داروهای مهارکننده مغز استخوان (متوتروکسات، پیریمتامین) و دوز بالای ویتامین ث، در صورت مصرف همزمان با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
برخی از داروها نظیر مهار کننده‌های پمپ پروتون (لنزوپرازول، امپرازول و ...) و آنتاگونیست‌های H۲ مانند فاموتیدین و رانیتیدین می‌توانند جذب B۱۲ را کاهش دهند.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در دوزهای بالاتر عوارضی می‌دهد که آن هم به‌ندرت در برخی مشاهده می‌گردد:

۱. حساسیت به فرآورده چون حساسیت پوستی، کهیر و خارش
۲. عوارض گوارشی چون تهوع، استفراغ و اسهال موقت
۳. خستگی، سرگیجه و ضربان نامنظم قلب
۴. بی‌قراری و اضطراب

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، رطوبت و تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بعد از هربار مصرف درب خوش را محکم ببندید.




- **نام فرآورده: نوتراکس کیوتن پلاس سلنیوم (Selenium+Nutrax Q۱۰)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
زینک (به‌صورت زینک اکساید)	۲ میلی‌گرم
سلنیوم (به‌صورت ال-سلنومتیونین)	۱۰۰ میکروگرم
کوآنزیم Q۱۰	۵۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن	۴/۵ میلی‌گرم
ویتامین E (به‌صورت توکوفریل سوکسینات)	۱۶ میلی‌گرم
ویتامین C (به‌صورت کلسیم آسکوربات)	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -{فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به محافظت در برابر رادیکال‌های آزاد، بهبود سلامت سیستم قلبی عروقی، افزایش توان باروری آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک، همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت مصرف دارو یا مکمل تغذیه‌ای دیگر، قبل از مصرف فرآورده با پزشک مشورت نمایید.
میزان مصرف را بدون مشورت با پزشک افزایش ندهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس مود پلاس (Nutrax Mood Plus)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۲ بلیستر پانزده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۵ میلی‌گرم
منیزیم (به‌صورت منیزیم سیترات)	۴۰ میلی‌گرم
ال-تیروزین	۱۵۰ میلی‌گرم
عصاره ریشه گیاه آشواگاندا (Withania Somnifera)	۱۰۰ میلی‌گرم
تریپتوفان (۵-HTP ۵۰٪)	۷۵ میلی‌گرم
عصاره گل ساعتی (Passiflora incarnata)	۷۵ میلی‌گرم
گابا (به‌صورت گاما آمینوبوتیریک اسید)	۵۰ میلی‌گرم
ال- تیانین	۵۰ میلی‌گرم
عصاره ریشه گیاه Rhodiola rosea	۲۵ میلی‌گرم
عصاره گل بابونه	۱۰ میلی‌گرم
عصاره بادرنجبویه	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید، کراس کارملوز سدیم، اتیل سلولز، پوویدون K۳۰، تالک، منیزیم استئارات، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، هیپرومولوز (Hypromellose)، آهن اکساید زرد (CI ۷۷۴۹۲) {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به ایجاد آرامش، کمک به بهبود خلق و خو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ الی ۲ بار هر بار یک عدد قرص و یا طبق دستور پزشک همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.

در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها داروهای دیگر به ویژه داروهای اعصاب از جمله بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIS) و مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

این فرآورده جهت درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی بالینی در نظر گرفته نشده است.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس مِیل بوست (Nutrax Male Boost)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۲ بلیستر پانزده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ال-آرژینین	۲۱۰ میلی‌گرم
عصاره ریشه گیاه ماکا (Lepidium meyenii)	۲۰۰ میلی‌گرم
عصاره گیاه آشواگاندا (withania somnifera)	۲۰۰ میلی‌گرم
عصاره دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)	۱۰۵ میلی‌گرم
عصاره میوه خارخاسک (Tribulus terrestris)	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره گزنه (Urtica dioica)	۸۵ میلی‌گرم
عصاره ریشه جینسنگ (panax ginseng)	۷۵ میلی‌گرم
عصاره ریشه زنجبیل (Zingiber officinale)	۷۵ میلی‌گرم
عصاره دانه کاکائو	۵۰ میلی‌گرم
عصاره دانه کرفس (Apium graveolens)	۲۵ میلی‌گرم
عصاره میوه قارچ کرم ابریشم (Ophiocordyceps sinensis)	۲۵ میلی‌گرم
کوئرستین	۲۵ میلی‌گرم
عصاره برگ گیاه دامیانا (Turnera diffusa)	۲۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۱۶ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اتیل سلولز، پوویدون K۳۰، میکروکریستالین سلولز، سدیم استارچ گلیکولات، سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، رنگ ایندیگو کارمین (CI ۷۳۰۱۵)، رنگ برلیانت بلو (CI ۴۲۰۹۰) {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش میل جنسی آقایان، کمک به افزایش سلامت جنسی آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قبل از خواب ۲ عدد قرص و یا طبق دستور پزشک، همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
برای افراد زیر ۱۸ سال با توصیه پزشک یا داروساز مصرف گردد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت

فرمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
مصرف همزمان فرآورده با داروهای دیگر ممکن است اثربخشی این مکمل و یا داروی مصرفی را تحت تأثیر قرار داده و سبب تشدید اثرات جانبی گردد. لذا در صورت مصرف هرگونه دارو یا مکمل دیگر، قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود. این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- نام فرآورده: نوتراکس وایتا-شی (Nutrax Vita-She)
- نام تجاری/ برند: Nutrax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: کپسـول خوراکـی- ۳۰ عـددی (۲ بلیسـتر پانـزده تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص
روغن گل گاو زبان	۱۰۰ میلی‌گرم
روغن گل مغربی	۱۰۰ میلی‌گرم
بایوفلاونوئیدهای مرکبات	۱۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن ٪۲۰	۲ میلی‌گرم
پارا-آمینو بنزوئیک اسید (PABA)	۳۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳ (کوله کلسی فرول)	۲۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی-ال آلفا توکوفرول استات)	۳۰ واحد بین‌المللی
ویتامین K۲ (مناکینون ۷)	۹۰ میکروگرم
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (تیامین مونونیترات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۳۶ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۲۰ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به صورت کلسیم-دی پانتوتنات)	۶ میلی‌گرم
منیزیم (به صورت منیزیم اکساید)	۱۰۰ میلی‌گرم
آهن (به صورت فروس فومارات)	۱۲ میلی‌گرم
زینک (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۱۲ میلی‌گرم
مس (به صورت مس سولفات پنتاهیدرات)	۱۵۰۰ میکروگرم
منگنز (به صورت به صورت منگنز سولفات)	۲/۵ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت سدیم سلنات)	۱۰۰ میکروگرم
کروم (به صورت کرومیوم پیکولینات)	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پوویدون، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، اتیل سلولز، تالک، منیزیم استئارات، رنگ اکسید آهن قرمز (CI ۷۷۴۹۱)، رنگ اکسید آهن زرد (CI ۷۷۴۹۲) {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، کمک به تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بانوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق دستور پزشک، همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد. از جویدن قرص خودداری فرمایید (این قرص جویدنی نمی‌باشد). با معده خالی مصرف نشود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
مصرف این فرآورده برای کودکان مناسب نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر به ویژه داروهای رقیق کننده خون از جمله وارفارین قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت داشتن آلرژی به برخی داروها و غذاها یا وجود هر گونه بیماری از قبیل صرع و هموکروماتوز قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
این فرآورده جایگزین رژیم غذایی روزانه نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.






- نام فرآورده: نوتراکس وایتا-هی (Nutrax Vita-He)
- نام تجاری/ برند: Nutrax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: کپسـول خوراکـی- ۳۰ عـددی (۲ بلیسـتر پانـزده تایـی)
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص
عصاره جینسنگ	۲۰ میلی‌گرم
کوآنزیم Q۱۰	۲ میلی‌گرم
ال-کارنیتین	۳۰ میلی‌گرم
بایوفلاونوئیدهای مرکبات	۱۰ میلی‌گرم
ال-آرژینین	۲۰ میلی‌گرم
ال-متیونین	۲۰ میلی‌گرم
سیلیکون	۱۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن ۲۰٪	۲ میلی‌گرم
پارا-آمینو بنزوئیک اسید (PABA)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین A	۲۵۰۰ واحد بین‌المللی (معادل ۷۵۰ میکروگرم Retinol equivalent)
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی (معادل ۱۰ میکروگرم)
ویتامین E (آلفا توکوفرول)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (تیامین)	۱۲ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (نیاسین)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۹ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۹ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۱۰ میلی‌گرم
منیزیم	۶۰ میلی‌گرم
آهن	۶ میلی‌گرم
زینک	۱۵ میلی‌گرم
مس	۱۰۰۰ میکروگرم

جز	مقدار در هر قرص
منگنز	۳ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۵۰ میکروگرم
کروم	۵۰ میکروگرم
ید	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پوویدون، میکروکریستالین سلولز، اتیل سلولز، سدیم استارچ گلیکولات، منیزیم استئارات، تالک، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، رنگ اکسید آهن قرمز (CI ۷۷۴۹۱)، رنگ اکسید آهن مشکی (CI ۷۷۴۹۹){فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی و تأمین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق دستور پزشک، همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد. از جویدن قرص خودداری فرمایید. با معده خالی مصرف نشود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
مصرف این فرآورده برای کودکان مناسب نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت داشتن آلرژی به برخی داروها و غذاها یا وجود هر گونه بیماری از قبیل دیابت، صرع، پرکاری تیروئید و هموکروماتوز قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
مصرف همزمان فرآورده با داروهای دیگر ممکن است اثربخشی این مکمل و یا داروی مصرفی را تحت تأثیر قرار داده و سبب تشدید اثرات جانبی گردد.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
این فرآورده جایگزین رژیم غذایی روزانه نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.






- **نام فرآورده: نوتراکس وایتا-هی کانسپشن (Nutrax Vita-He Conception)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: کپسـول خوراکـی- ۳۰ عـددی (۲ بلیسـتر پانـزده تایـی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
عصاره ریشه جینسنگ (Panax Ginseng)	۳۰ میلی‌گرم
عصاره ماکای پرویی (Peruvian Maca)	۲۵۰ میلی‌گرم
کوآنزیم Q۱۰	۲ میلی‌گرم
ال-کارنیتین (ال-کارنیتین ال-تارترات)	۵۰ میلی‌گرم
بایوفلاونوئیدهای مرکبات	۱۰ میلی‌گرم
ال-آرژینین	۱۰ میلی‌گرم
عصاره لیکوپن	۱/۵ میلی‌گرم
عصاره پوست درخت کاج	۳۰ میلی‌گرم
اوکتاکوزانول (Octacosanol)	۳ میلی‌گرم
اینوزیتول	۴۰ میلی‌گرم
ال-گلوتاتیون	۲/۵ میلی‌گرم
ویتامین A استات	۲۱۸۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D۳ (کوله کلسی فرول)	۶۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی-ال آلفا توکوفرول استات)	۳۰ واحد بین‌المللی
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۹۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱ (تیامین مونونیترات)	۱۲ میلی‌گرم
ویتامین B۲ (ریبوفلاوین)	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۳ (نیاسین آمید)	۱۸ میلی‌گرم
ویتامین B۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین)	۷۵ میکروگرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید (به صورت کلسیم-دی پانتوتنات)	۱۰ میلی‌گرم
منیزیم (به صورت منیزیم اکساید)	۶۰ میلی‌گرم
آهن (به صورت فروس فومارات)	۶ میلی‌گرم

جز	مقدار در هر قرص
زینک (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۱۵ میلی‌گرم
مس (به صورت مس سولفات پنتاهیدرات)	۱۰۰۰ میکروگرم
منگنز (به صورت به صورت منگنز مونوهیدرات)	۰/۵ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت سدیم سلنات)	۱۵۰ میکروگرم
کروم (به صورت کرومیوم پیکولینات)	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، اتیل سلولز، پوویدون، سدیم استارچ گلیکولات، کراس کارملوز سدیم، سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، رنگ اکسید آهن قرمز (CI ۷۷۴۹۱)، رنگ اکسید آهن زرد (CI ۷۷۴۹۲){{فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، شیرین کننده و نگه دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت قدرت باروری آقایان، کمک به افزایش تعداد تحرک و کیفیت اسپرم، کمک به افزایش سطح انرژی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص و یا طبق دستور پزشک، همراه با غذا و یک لیوان آب، ترجیحا سه ماه قبل از تصمیم به باردار شدن همسر مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در افراد زیر ۱۸ سال با مشورت پزشک مصرف گردد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت داشتن آلرژی به مواد غذایی یا ابتلا به هر گونه بیماری به خصوص بیماری صرع و هموکروماتوز با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی، مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: نوتراکس ویزیمکس (Nutrax Visimax)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۲ بلیستر پانزده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین C (به صورت آسکوربیک اسید)	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین E (به صورت دی-ال آلفا-توکوفرول استات)	۱۳۴ واحد بین‌المللی
زینک (به صورت زینک اکساید)	۲۵ میلی‌گرم
مس (به صورت مس گلوکونات)	۲ میلی‌گرم
لوتئین	۱۰ میلی‌گرم
زاگزانتین(Zeaxanthin)	۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، میکروکریستالین سلولز، پوویدون، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، اتیل سلولز، تالک، آهن اکساید زرد (CI ۷۷۴۹۲) {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به حفظ سلامت چشم و تقویت بینایی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق دستور پزشک، همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در افراد زیر ۱۸ سال با توصیه پزشک یا داروساز مصرف گردد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت و حرارت نگهداری شود.
این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس آی-لش (Dermax I-LASH)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
سدیم (به‌صورت سدیم سیترات)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین آ (به‌صورت ویتامین آ استات)	IU ۱۸۳۱
ویتامین ث	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	IU ۴۰۰
ویتامین ای (توکوفرول استات)	IU ۷/۴
ویتامین ب ۶ (به‌صورت پریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی‌گرم
ویتامین ب ۱۲	۶ میکروگرم
بیوتین	۴۵۰۰ میکروگرم
ویتامین ب ۵ (به‌صورت دی کلسیم پانتوتنات)	۵/۲ میلی‌گرم
ید (به‌صورت پتاسیم یدید)	۴۲ میکروگرم
زینک (به‌صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۲/۷ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۶۰ میکروگرم
کولین (به‌صورت کولین بیتارترات)	۴۰ میکروگرم
اینوزیتول	۴۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگهدارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت مو ، کمک به تقویت مژه و ابرو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با غذا و یک لیوان آب و یا مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس سوریاتیون (Dermax Psoriathione)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
گلوتاتیون لیپوزومال	۱۵۶/۲۵ میلی‌گرم
کمپلکس فیتوسرامید (مشتق شده از عصاره گندم)	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پوویدون کا ۳۰، آسکوربیک اسید، تالک، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگهدارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست خشک، کمک به مهار عملکرد رادیکال‌های آزاد و کمک به کاهش التهابات پوستی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول همراه با غذا و یک لیوان آب و یا مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس کراتوژن (Dermax Keratogen)**
- **نام تجاری/ برند: Dermax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
ویتامین ث	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین ب ۳	۹ میلی‌گرم
ویتامین ب ۶ (به صورت پریدوکسین هیدروکلراید)	۱ میلی‌گرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
پنتوتنیک اسید (ویتامین ب ۵) (به صورت دی کلسیم پانتوتنات)	۶/۸ میلی‌گرم
زینک (به صورت زینک اکساید)	۷/۵ میلی‌گرم
مس (به صورت مس گلوکونات)	۰/۸۳ میلی‌گرم
کلاژن پپتاید	۷۵۰ میلی‌گرم
کراتین	۲۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، پوویدون کا ۳۰، کراس پوویدون، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگهدارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت مو، کمک به افزایش استحکام ساقه مو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول همراه با غذا و یک لیوان آب و یا مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علایم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- نام فرآورده: نوتراکس اسپکتروم (Nutrax Spectrum)
- نام تجاری/ برند: Nutrax
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان
- تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: قـرص خوراکـی- قوطـی ۳۰ عـددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین آ استات	۲۳۲۵ IU
ویتامین ای (دی ال- آلفا توکوفرول استات)	۱۵ IU
ویتامین ث (اسکوربیک اسید)	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین کا ۲ (مناکینون ۷)	۳۰ میکروگرم
ویتامین ب ۱ (تیامین مونونیترات)	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین ب ۲ (ریبوفلاوین)	۱/۷۵ میلی‌گرم
ویتامین ب ۶ (پریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی‌گرم
ویتامین ب ۱۲(سیانوکوبالامین)	۲/۵ میکروگرم
ویتامین د ۳ (کوله کلسیفرول)	۲۰۰ IU
بیوتین	۶۲/۵ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
نیاسینامید (ویتامین ب ۳)	۲۰ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید (به صورت کلسیم دی پانتوتنات)	۷/۵ میلی‌گرم
کلسیم (به صورت کلسیم فسفات)	۱۶۲ میلی‌گرم
فسفر (به صورت کلسیم فسفات)	۱۲۵ میلی‌گرم
منیزیم (به صورت منیزیم اکساید)	۱۰۰ میلی‌گرم
آهن (به صورت فروس فومارات)	۵ میلی‌گرم
ید (به صورت پتاسیم یدید)	۱۰۰ میکروگرم
مس (به صورت کوپر سولفات پنتا هیدرات)	۵۰۰ میکروگرم
منگنز (به صورت منگنز سولفات)	۲ میلی‌گرم
کروم (به صورت کرومیوم پیکولینات)	۴۰ میکروگرم
مولیبدن (به صورت سدیم مولیبدات)	۵۰ میکروگرم
سلنیوم (به صورت سدیم سلنات)	۳۰ میکروگرم
زینک (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** سدیم استارچ گلیکولات، پوویدون، میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی اکساید، تالک، منیزیم استئارات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، دی اتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، اتیل سلولز، CI ۷۳۰۱۵ {فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگهدارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، کمک به تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص یا طبق دستور پزشک همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد. از جویدن قرص خودداری فرمایید (این قرص جویدنی نمی‌باشد). با معده خالی مصرف نشود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی‌باشد.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر به ویژه سایر مولتی ویتامین‌ها و مواد معدنی، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

از مصرف این فرآورده همراه با شیر، سایر لبنیات، مکمل‌های کلسیم و آنتی اسیدهای حاوی کلسیم خودداری نمایید.

مصرف این فرآورده در کودکان زیر ۱۱ سال توصیه نمی‌گردد.

بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد دور از نور رطوبت ،حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود. پس از هربار مصرف درب قوطی را محکم ببندید.





- **نام فرآورده: نوتراکس والتونین (Nutrax Valetonin)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
عصاره ریشه سنبل الطیب	۱۵۰ میلی‌گرم
گابا (به صورت گاما آمینوبوتیریک اسید)	۱۰۰ میلی‌گرم
تریپتوفان	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره گل بابونه	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره گل ساعتی	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره بادرنجبویه	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره رازک	۱۰۰ میلی‌گرم
ملاتونین	۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دو عدد کپسول همراه با یک لیوان آب، ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خواب و یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و برای تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
برای افراد زیر ۱۸ سال در صورت نیاز به مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها داروهای دیگر به ویژه داروهای اعصاب از جمله بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs) و مهار کننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
به دلیل اثرات خواب‌آوری در زمان مصرف، از رانندگی و یا کار با ماشین‌آلات حساس پرهیز نمایید. مصرف این فرآورده جهت کمک به رفع بی‌خوابی‌های گاه‌به‌گاه توصیه می‌گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس بتا پاپیلو (Nutrax B-papillo)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
ویتامین C (به صورت کلسیم آسکوربات)	۴۰۰ میلی‌گرم
بتاگلوکان	۲۵۰ میلی‌گرم
زینک (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۱۵ میلی‌گرم
عصاره گیاه آقطی سیاه یا انگور کولی	۴۹/۸ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت ال-سلنومتیونین)	۱۲۵ میکروگرم
مس (به صورت کوپر گلوکونات)	۱۵۰۰ میکروگرم
ویتامین D۳ (به صورت کوله کلسیفرول)	۲۰۰۰ IU

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، اسانس شکلات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن، آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول، همراه با غذا و یک لیوان آب یا مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها / داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس سی دی-فلو (Nutrax CD-Flu)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
ویتامین C (به صورت کلسیم آسکوربات)	۴۰۰ میلی‌گرم
بتا-او۳/ ۱و۶ گلوکان‌ها (برگرفته از مخمر)	۲۵۰ میلی‌گرم
زینک (به صورت سولفات)	۱۵ میلی‌گرم
عصاره گیاه آقطی سیاه یا انگور کولی	۴۹/۸ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت ال-سلنومتیونین)	۱۲۵ میکروگرم
مس (به صورت گلوکونات)	۱۵۰۰ میکروگرم
ویتامین D۳ (به صورت کوله کلسی فرول)	۲۰۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی بدن، کمک به تامین ویتامین‌های C و D
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول یا طبق دستور پزشک ترجیحا همراه با غذا و یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.
مصرف همزمان فرآورده با داروهای دیگر ممکن است اثربخشی این مکمل و یا داروی مصرفی را تحت تاثیر قرار داده و سبب تشدید اثرات جانبی گردیده و یا کم شدن یا از بین رفتن تاثیر مکمل بر بدن را به همراه داشته باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
مصرف برای کودکان با توصیه پزشک صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس کیوتن پلاس سلنیوم (Selenium+Nutrax Q۱۰)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
زینک (به صورت زینک اکساید)	۲ میلی‌گرم
سلنیوم (به صورت ال-سلنومتیونین)	۱۰۰ میکروگرم
کوآنزیم Q۱۰	۱۰۰ میلی‌گرم
بتا-کاروتن	۴/۵ میلی‌گرم
ویتامین E (به صورت دی ال- آلفا توکوفرول استات)	IU ۱۶
ویتامین C (کلسیم آسکوربات)	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت قلب و عروق، کمک به محافظت در برابر رادیکال‌های آزاد و کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک یا داروساز همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس والتونین (Nutrax Valetonin)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول- ۲۰ عددی (۲ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
عصاره ریشه سنبل الطیب	۱۵۰ میلی‌گرم
گابا (به صورت گاما آمینوبوتیریک اسید)	۱۰۰ میلی‌گرم
تریپتوفان	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره گل بابونه	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره گل ساعتی	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره بادرنجبویه	۱۰۰ میلی‌گرم
عصاره رازک	۱۰۰ میلی‌گرم
ملاتونین	۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اتیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دو عدد کپسول همراه با یک لیوان آب، ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از خواب و یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

برای افراد زیر ۱۸ سال در صورت نیاز به مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت حساسیت به فرآورده و یا هر یک از اجزای آن قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.

در صورت پیدایش هر گونه علائم حساسیت و یا عوارض گوارشی مصرف فرآورده را قطع نموده و با پزشک مشورت فرمایید.

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها داروهای دیگر به‌ویژه داروهای اعصاب از جمله بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIS) و مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.

به دلیل اثرات خواب آوری در زمان مصرف، از رانندگی و یا کار با ماشین‌آلات حساس پرهیز نمایید. مصرف این فرآورده جهت کمک به رفع بی‌خوابی‌های گاه به گاه توصیه می‌گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: درمکس رجوا پلاتینیوم (Dermax Rejuva Platinium)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
گلوتاتیون لیپوزومال	۱۲۵ میلی‌گرم
ال سیستئین (به صورت ال سیستئین هیدروکلراید مونوهیدرات)	۱۰۰ میلی‌گرم
آستاگزانتین ۱۰٪	۱ میلی‌گرم
آلفا لیپوئیک اسید	۲۵ میلی‌گرم
عصاره دانه انگور ۹۵٪ (ویتیس وینیفرا)	۲۵ میلی‌گرم
ویتامین ث	۱۲۵ میلی‌گرم
روی (به صورت زینک سولفات مونوهیدرات)	۲/۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی اکساید، اتیل سلولز، تالک، منیزیم استئارات، کراس کارملوز سدیم {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به حفظ سلامت و استحکام پوست
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با غذا و و یک لیوان آب و یا طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت حساسیت به فرآورده و یا بروز هر گونه عوارض گوارشی، مصرف فرآورده را قطع نموده و به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: نوتراکس ان ای دی + (Nutrax NAD+)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول خوراکی- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ان ای دی + (نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید)	۲۵ میلی‌گرم
ان ام ان (نیکوتین آمید مونو نوکلئوتید)	۵۰ میلی‌گرم
رزوراترول ۵۰٪	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، تالک، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن، کمک به متابولیسم طبیعی، کمک به سلامت سیستم عصبی و تقویت حافظه
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول همراه با غذا و یک لیوان آب یا طبق دستور پزشک یا داروساز، مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف فرآورده برای افراد کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی گردد مگر با دستور پزشک.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.




- **نام فرآورده: نوتراکس کتو بوست (Nutrax Ketoboost)**
- **نام تجاری/ برند: Nutrax**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی پارس حیان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: کپسول - بطری ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
منیزیم بتا هیدروکسی بوتیرات	۲۶۰ میلی‌گرم
کلسیم بتا هیدروکسی بوتیرات	۲۸۰ میلی‌گرم
سدیم بتا هیدروکسی بوتیرات	۲۶۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم فسفات دی بازیک، اتیل سلولز، منیزیم استئارات، کراس کارملوز سدیم {فاقد سویا، شیر، گندم، تخم‌مرغ، شیرین‌کننده و نگه‌دارنده}
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تسریع فرآیند کتوزیس در افراد دارای رژیم‌های کتوژنیک، کمک به افزایش متابولیسم چربی‌ها و کمک به کاهش وزن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد کپسول، یا مطابق دستور پزشک همراه با یک لیوان آب مصرف گردد. جهت حصول نتیجه بهتر ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از غذا مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص ، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
بیش از میزان ذکر شده مصرف نگردد مگر با توصیه پزشک.
در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده و یا بروز هرگونه عوارض گوارشی، مصرف را متوقف و به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی این فرآورده معمولا به ندرت و خفیف دیده می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف طولانی مدت و بیشتر از میزان توصیه شده این فرآورده ممکن است برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. در صورت ادامه یا بدتر شدن عوارض جانبی مصرف را قطع نموده و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، حرارت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

TACHRA
DAROU

شرکت داروسازی تچرا فارمد





- **نام فرآورده: آلاتریت ۳۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: آلاتریت**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تچرا فارمد**
- **تولیدشده در: تولید قراردادی در شرکت داروسازی روژین (برای محل‌های ساخت دیگر IRC اخذ شده است)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو کپسول
آلفا لیپوئیک اسید	۳۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلوئیدال سیلیکون دی‌اکسید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** آلفالیپوئیک اسید مختص استفاده در بزرگسالان می‌باشد با توجه به اینکه درخصوص مصرف این مکمل در کودکان مطالعه‌ای انجام نشده است، لذا مصرف آن در اطفال توصیه نمی‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، بهبود سلامت عصبی در بیماران دیابتی، کمک به کاهش کلسترول، کمک به کاهش وزن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک الی دو عدد کپسول همراه غذا مصرف شود.
از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده روزانه خودداری نما یید .
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد. مکمل‌ها نباید به عنوان جایگزینی برای یک رژیم غذایی متعادل و سالم در نظر گرفته شوند. آلفالیپوئیک اسید می‌تواند سطح قند خون را کاهش دهد، بنابراین در بیماران دیابتی یا افراد با قند خون پایین باید تحت نظارت پزشک مصرف گردد. در صورت بروز عوارض و علائم کاهش قند خون شامل تعریق، رنگ پریدگی، لرز، سردرد، سرگیجه و گیجی مصرف مکمل را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید. آلفالیپوئیک اسید مختص استفاده در بزرگسالان می‌باشد و با توجه به اینکه درخصوص مصرف این مکمل در کودکان مطالعه‌ای انجام نشده است، لذا مصرف آن در اطفال توصیه نمی‌شود. در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌های دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** اطلاعات کافی در خصوص مصرف آلفا لیپوئیک اسید در دوران بارداری و شیردهی در انسان وجود ندارد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض ناخواسته جدی ناشی از مصرف آلفالیپوئیک اسید گزارش نشده است. عوارض جانبی به طور کلی نادر بوده و ممکن است شامل بی خوابی، خستگی، اسهال و راش پوستی باشد. هپاتیت کلستاتیک شدید در یک بیمار که آلفالیپوئیک اسید برای درمان نوروپاتی دیابتی مصرف نموده بود، مشاهده گردید که با قطع مصرف عوارض برطرف شدند.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- نام فرآورده: نوروکر
- نام تجاری/ برند: نوروکر
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تچرا فارمد
- تولیدشده در: تولید تحت لیسانس در محل کارخانه زاویه دارویی طب آریانا و میم دارو
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در یک قوطی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر دو کپسول
ویتامین آ	۲۵۰۰ IU
ویتامین ث	۹۰ میلی‌گرم
ویتامین د	۱۰۰۰IU
ویتامین ای	۳۶ IU
ویتامین ب۱	۱۲ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۱/۶ میلی‌گرم
نیاسین	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۲۵ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۵ میلی‌گرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
منیزیم	۱۰۰ میلی‌گرم
مس	۱۰۰۰ میکروگرم
زینک	۱۵ میلی‌گرم
منگنز	۳ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۰۰ میکروگرم
ید	۱۵۰ میلی‌گرم
جینسنوزید (KOREAN GINSENG)	۴۰۰ میکروگرم
ال-آرژینین	۲۰ میلی‌گرم
ال-متیونین	۲۰ میلی‌گرم
کوآنزیم کیو۱۰	۵ میلی‌گرم
PABA	۲۰ میلی‌گرم
لیکوپن	۱۳۳ میکروگرم
لوتئین	۱۳۳ میکروگرم
گزانتین	۶۶/۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم هیدروژن فسفات دی هیدرات، میکروکریستالین سلولز، هیپرومولوز، پوویدون، کراس کارملوز سدیم، کلوئیدال سیلیکا انهیدروس، منیزیم استئارات، لاکتوز مونوهیدرات و طعم‌دهنده
- **رده سنی:** آلفالیپوئیک اسید مختص استفاده در بزرگسالان می‌باشد، با توجه به اینکه درخصوص مصرف این مکمل در کودکان مطالعه‌ای انجام نشده است، لذا مصرف آن در اطفال توصیه نمی‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود عملکرد ذهنی مناسب و حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ترجیحا با غذا به همراه آب میل شود و از جویدن قرص خودداری گردد. لطفا از مصرف بیش از مقدار مجاز توصیه‌شده خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:**

متیونین: مطالعات کافی قابل استناد در مورد ایمنی مصرف متیونین در بارداری و شیردهی وجود ندارد. بنابراین در دوران بارداری و شیردهی مصرف نگردد.

پاناکس جینسینگ: مصرف پاناکس جینسینگ در دوران بارداری توصیه نمیشود که این امر به دلیل وجود یک ماده شیمیایی در پاناکس جینسینگ می‌باشد که منجر به بروز نواقص مادرزادی در حیوانات شده است.

- **موارد منع مصرف:** این محصول حاوی ویتامین A می‌باشد. بنابراین در خانم‌های باردار و یا خانم‌هایی که قصد باردار شدن را دارند فقط با دستور پزشک باید مصرف شود.


در صورت بروز هرگونه واکنش حساسیتی به این محصول با پزشک خود مشورت نمایید.

- **عوارض جانبی احتمالی:** مکمل غذایی نباید به عنوان جایگزین رژیم غذایی متعادل یا شیوه زندگی سالم باشد. اگر باردار یا شیرده هستید یا داروی خاصی را مصرف می‌کنید قبل از مصرف همه مکمل‌ها با پزشک خود مشورت نمایید. در صورت بروز عوارض جانبی مصرف مکمل را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



Tehran Darou
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی تهران دارو





- **نام فرآورده: ال-آرژنین ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ال-آرژنین	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، منیزیم استئارات، هیپرومولوز، پوویدون، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک، PEG، کراس پوویدون، اتانول
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال - در افراد زیر ۱۸ سال با صلاحدید پزشک تجویز می‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به عضله‌سازی، تحریک ترشح هورمون رشد و تقویت سیستم ایمنی و کمک به انبساط عروق و افزایش جریان خون و کمک به بهبود قوای جنسی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک تا سه عدد قرص هر بار یک عدد به همراه غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- در صورت سابقه بیماری کلیوی، آلرژی تنفسی، اختلالات الکترولیتی، دیابت، داشتن هرنوع سابقه ناراحتی و حمله قلبی، یائسگی، اختلالات ایمنی، مشکلات مربوط به فشار خون و بیماری‌های خونی، بعد از عمل جراحی و هرگونه سابقه حساسیت نسبت به این فرآورده یا سایر فرآورده های مشابه حاوی این ماده، و حساسیت به هر ماده رنگی، غذایی و مواد محافظ، قبل از مصرف این محصول یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید- مصرف این مکمل با داروهایی مثل سیلدنافیل، داروهای تنظیم کننده سطح پتاسیم خون، انسولین، داروهای آزاد کننده نیترات توصیه نمی‌شود- این فرآورده را در فواصل زمانی منظم مصرف نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** به‌دلیل عدم انجام مطالعات کافی، مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌گردد. در صورت نیاز به مصرف حتما با پزشک متخصص یا داروساز مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده- افراد با سابقه ابتلا به هرپس (امکان تکثیر ویروس)- افراد مبتلا به اختلالات کلیوی شدید
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از علائم تهوع، استفراغ، گرگرفتگی، سردرد و بی‌حسی با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. در صورت تشدید علائم، سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هم زمان با داروهای رقیق‌کننده خون مانند وارفارین، کلوپیدوگرل و انوکساپارین، داروهای فشار خون، داروهای اختلال نعوظ مانند سیلدنافیل و تادالافیل، نیترات‌ها و داروهای مدر با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** دوز توصیه شده روزانه ۲ تا ۶ گرم می‌باشد. از مصرف بیش از ۹ گرم ال-آرژینین در روز اجتناب کنید مگر با دستور پزشک
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از حد توصیه شده می‌تواند باعث بروز علائمی از قبیل ناراحتی‌های گوارشی، اسهال، استفراغ، انقباضات شکمی، افت فشار خون، گرفتگی عضلات، بر هم خوردن تعادل آب و الکترولیت در افراد مبتلا به اختلالات کلیوی شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ال-کارنیتین ۵۰۰**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ال-کارنیتین	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، کراس پوویدون، منیزیم استئارات، پوویدون، اتانول ۹۶ درصد، هیپروملوز، PEG، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، PG
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال - در افراد زیر ۱۸ سال مصرف با صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به متابولیسم چربی‌ها- بهبود عملکرد ورزشی- کمک به سلامت قلب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک تا دو عدد قرص همراه با غذا یا نیم تا یک ساعت پیش از انجام فعالیت ورزشی مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- در صورت بروز مشکلاتی نظیر نارسایی شدید کلیوی، دیابت، تشنج، اختلالات تیروئید، بیماری‌های قلبی و هرگونه حساسیت نسبت به این فرآورده یا سایر فرآورده‌های مشابه، رنگ‌ها، غذاها، مواد محافظ و مصرف داروهای نظیر والپروئیک اسید و ضدانعقادها، قبل از مصرف این محصول یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید- این فرآورده را در فواصل زمانی منظم مصرف نمایید و در صورت فراموشی از دوبرابر کردن دوز آن در نوبت بعدی، خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌گردد، در صورت نیاز با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود- اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید- در صورت گرفتگی شکم، اسهال، تهوع و استفراغ، اختلالات گوارشی، بوی غیرطبیعی بدن، در صورتی که ادامه‌دار و یا بدتر شدند، به پزشک یا داروساز خود مراجعه کنید- در صورت بروز عوارضی نظیر افزایش فشار خون، تب، افزایش ضربان قلب و تشنج (به خصوص در افراد با سابقه تشنج) سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر، قبل از مصرف این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، کلوپیدوگرل، آسپرین، داروهای مربوط به اختلالات تیروئید، داروهای ضدتشنج
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** دوز توصیه شده روزانه ال-کارنیتین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌گرم می‌باشد از مصرف بیش از ۳۰۰۰ میلی‌گرم در روز اجتناب کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از حد توصیه شده، می‌تواند باعث بروز علائمی از قبیل: تهوع، اسهال، انقباضات شکمی و بوی بد بدن شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ال-کارنیتین ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ال-کارنیتین	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، کراس پوویدون، منیزیم استئارات، پوویدون، اتانول ۹۶ درصد، هیپروملوز، PEG، تالک، تیتانیوم دی‌اکسید، PG
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال - در افراد زیر ۱۸ سال مصرف با صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به متابولیسم چربی‌ها- بهبود عملکرد ورزشی- کمک به سلامت قلب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک تا دو عدد قرص همراه با غذا یا نیم تا یک ساعت پیش از انجام فعالیت ورزشی مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- در صورت بروز مشکلاتی نظیر نارسایی شدید کلیوی، دیابت، تشنج، اختلالات تیروئید، بیماری‌های قلبی و هرگونه حساسیت نسبت به این فرآورده یا سایر فرآورده‌های مشابه، رنگ‌ها، غذاها، مواد محافظ و مصرف داروهای نظیر والپروئیک اسید و ضدانعقادها، قبل از مصرف این محصول یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید- این فرآورده را در فواصل زمانی منظم مصرف نمایید و در صورت فراموشی از دوبرابر کردن دوز آن در نوبت بعدی، خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌گردد، در صورت نیاز با پزشک متخصص مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود- اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید- در صورت گرفتگی شکم، اسهال، تهوع و استفراغ، اختلالات گوارشی، بوی غیرطبیعی بدن، در صورتی که ادامه‌دار و یا بدتر شدند، به پزشک یا داروساز خود مراجعه کنید- در صورت بروز عوارضی نظیر افزایش فشار خون، تب، افزایش ضربان قلب و تشنج (به خصوص در افراد با سابقه تشنج) سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر، قبل از مصرف این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، کلوپیدوگرل، آسپرین، داروهای مربوط به اختلالات تیروئید، داروهای ضدتشنج
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** دوز توصیه شده روزانه ال-کارنیتین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌گرم می‌باشد از مصرف بیش از ۳۰۰۰ میلی‌گرم در روز اجتناب کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از حد توصیه شده، می‌تواند باعث بروز علائمی از قبیل: تهوع، اسهال، انقباضات شکمی و بوی بد بدن شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: امگا ۳ / ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: امگا ۳ / ویتامین د۳- تداژل®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد کپسول در ۳ بلیستر ۱۰ عددی- ۶۰ عدد کپسول در ۶ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
روغن ماهی	۱۰۰۰ میلی‌گرم
EPA	۱۸۰ میلی‌گرم
DHA	۱۲۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۱۰۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آلفا توکفریل استات- ژلاتین - آب - گلیسیرین
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال (مقدار مصرف برای کودکان طبق نظر پزشک می‌باشد.)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کاهش سطح تری گلیسیرید- پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی- پیشگیری از حوادث ثانویه پس از سکته قلبی- کاهش احتمال لختگی خون- کمک به حفظ سلامت استخوان‌ها و سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد کپسول با یک لیوان آب همراه یا بعد از غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. در بیماران هموفیلی و بیمارانی که از داروهای رقیق کننده خون استفاده می‌کنند با احتیاط مصرف شود. در افراد با سابقه حساسیت به ماهی یا صدف با احتیاط مصرف شود. یک هفته قبل از عمل‌های جراحی مصرف را قطع کنید. در صورت ابتلا به اختلالات کبدی و کلیوی و هایپرکلسمی (سطوح بالای کلسیم در خون) قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. در صورت مصرف همزمان داروهایی مانند داروهای ضدانعقاد خون، بتابلاکرها مثل آتنولول، متوپرولول و پروپرانولول، استروژن، تیازید و مکمل‌های حاوی ویتامین د یا کلسیم همراه با این فرآورده پزشک یا داروساز را مطلع سازید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف امگا ۳ و ویتامین د۳ در دوران بارداری و شیردهی مجاز است و توصیه می‌شود با این‌حال در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده- هایپرکلسمی (سطح بالای کلسیم در خون)- سطح بالای ویتامین د در خون
- **عوارض جانبی احتمالی:** این محصول در دوزهای توصیه شده به طور معمول به خوبی تحمل می‌شود با این حال احتمال بروز عوارضی از قبیل ناراحتی‌های خفیف گوارشی (تهوع، اسهال)، آروغ و بوی بد دهان و در موارد نادر واکنش‌های حساسیتی از قبیل راش‌های پوستی، تورم صورت، لب و گلو وجود دارد. در صورت بروز عوارض حساسیتی به پزشک خود مراجعه کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: داروهای ضدانعقاد خون مانند وارفارین و آسپرین، مکمل‌های حاوی کلسیم، متابولیت‌ها یا آنالوگ‌های ویتامین D (مانند کلسی ترپول)، داروهای مدر، داروهای ضد دیابت (به علت اثر امگا ۳ بر کاهش قند خون)
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی برای بزرگسالان ۳-۴ گرم (روغن ماهی) در روز است. ماکزیمم دوز مصرفی ویتامین د ۳ برای بزرگسالان سالم ۴۰۰۰ واحد بین‌المللی است (دوز توصیه شده روزانه ۲۰۰۰-۱۰۰۰ واحد بین‌المللی است)
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد ممکن است علائم گوارشی از قبیل سو هاضمه، استفراغ و مدفوع شل، طعم بد در دهان و واکنش‌های پوستی دیده شود و در موارد نادرتر احتمال خون ریزی وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: امگا ۳ ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: امگا ۳ - تداژل®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
روغن ماهی	۱۰۰۰ میلی‌گرم
EPA	۱۸۰ میلی‌گرم
DHA	۱۲۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آلفا توکفریل استات- ژلاتین- آب - گلیسیرین
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۸ سال (مقدار مصرف برای کودکان طبق نظر پزشک می‌باشد.)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کاهش سطح تری گلیسیرید- پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی- پیشگیری از حوادث ثانویه پس از سکته قلبی- کاهش احتمال لختگی خون
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ عدد کپسول همراه یا بعد از غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. در بیماران هموفیلی و بیمارانی که از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند با احتیاط مصرف شود. در افراد با سابقه حساسیت به ماهی یا صدف با احتیاط مصرف شود. یک هفته قبل از عمل‌های جراحی مصرف را قطع کنید. در صورت ابتلا به اختلالات کبدی و کلیوی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف امگا ۳ در دوران بارداری و شیردهی مجاز است و مصرف آن توصیه می‌شود با این حال در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیل‌دهنده
- **عوارض جانبی احتمالی:** ناراحتی‌های خفیف گوارشی (تهوع، اسهال)، آروغ و بوی بد دهان، درد قفسه سینه، کمر درد
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، آسپرین و کلوپیدوگرل، داروهای ضد فشار خون (به دلیل اثر امگا ۳ بر کاهش فشار خون)، داروهای ضد دیابت (به دلیل اثر مثبت امگا ۳ بر کاهش قند خون)، تاکرولیموس، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی برای بزرگسالان ۳-۴ گرم (روغن ماهی) در روز است.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد ممکن است علائم گوارشی از قبیل سوهاضمه، استفراغ و مدفوع شل، طعم بد در دهان و واکنش‌های پوستی دیده شود و در موارد نادرتر احتمال خون ریزی وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: قرص روکشدار گلوکزآمین / کندروئیتین / متیل سولفونیل متان**
- **نام تجاری/ برند: تدافلکس®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
گلوکزآمین (به صورت هیدروکلراید)	۵۰۰ میلی‌گرم
کندروئیتین سولفات سدیم	۴۰۰ میلی‌گرم
متیل سولفونیل متان	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز- پویدون k۳۰- کراس پوویدون- ائروزیل- منیزیم استئارات- اتانول- هیدروکسی پروپیل متیل سلولز- تیتانیوم دی اکساید- تالک- PEG
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال- در افراد زیر ۱۸ سال یا صلاحدید پزشک تجویز می‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت و بهبود عملکرد مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** سه بار در روز، هر بار یک عدد به همراه وعده غذایی مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این محصول مکمل بوده و برای تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نیست. مصرف این فرآورده را دو هفته قبل از هر گونه جراحی قطع کنید. در صورت سابقه ابتلا به بیماری دیابت، آلرژی و تنگی نفس، کلسترول بالا، فشار خون بالا و یا هر گونه سابقه حساسیت نسبت به این فراورده یا سایر فرآورده‌های مشابه حاوی این مواد قبل از مصرف این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فرمولاسیون از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید: ناراحتی‌های گوارشی از قبیل نفخ، سوزش سر دل و کرامپ‌های شکمی، سردرد، خواب‌آلودگی، التهاب در ناحیه پا و قوزک و واکنش‌های پوستی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین، داروهای کاهنده قند خون
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** گلوکزآمین: ۱۵۰۰ میلی‌گرم در روز- کندروئیتین ۱۲۰۰-۸۰۰ میلی‌گرم در روز- متیل سولفونیل متان ۲-۶ گرم در روز- به‌طور کلی بیش از سه عدد تدافلکس® در روز مصرف نشود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد امکان بروز علائمی از جمله تهوع، استفراغ، اسهال و دردهای شکمی وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: قرص روکشدار سیستین / ب۶ / زینک / آرژینین**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۲۰ عددی، جعبه ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
سیستئین	۱/۵ گرم
آرژینین	۴/۵ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱/۰۵ میلی‌گرم
زینک (سولفات)	۱۱/۲۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز ۱۰۲- پویدون- منیزیم- استئارات-کراسکارملوز سدیم-هیپرومولوز- تیتانیوم دی اکساید- تالک- آب خالص--Yellow No ۱- PEG PEG
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال- در افراد زیر ۱۸ سال یا صلاحدید پزشک تجویز می‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** سه بار در روز، هر بار یک عدد به همراه وعده غذایی مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این محصول مکمل بوده و برای تشخیص، درمان و پیشگیری نمی‌باشد. این محصول جایگزین رژیم غذایی سالم و متنوع نمی‌باشد. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید. در افراد مبتلا به اختلالات کبدی و کلیوی تحت نظارت پزشک مصرف شود. در صورت مصرف هم زمان با سایر دارو یا مکمل‌های دیگر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این محصول در دوزهای توصیه شده به خوبی تحمل می شود و عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است با این حال ممکن است عوارض ملایم گوارشی مانند تهوع، نفخ و اسهال در بعضی افراد بروز پیدا کند.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** جهت پیشگیری از بروز هر گونه تداخل پزشک یا داروساز خود را از تمامی داروها و مکمل‌های مصرفی خود مطلع کنید. در صورت مصرف هم زمان با نیتروگلیسیرین و لوودوپا قبل از مصرف این محصول به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** اطلاعات خاصی در مورد علائم مسمومیت با این محصول در دسترس نیست. از مصرف بیش از حد توصیه شده اجتناب کنید و در صورت بروز هر گونه علائم شدید به دنبال مصرف بیش از حد به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: فولیک اسید / ید**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر قرص
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
ید	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، تالک، هیپروملوز، پوویدون، رنگ FD&C، ماکروگل، سیلیکون دی‌اکسید، پروپیلن گلیکول، تیتانیوم دی‌اکسید
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال- مصرف در کودکان با صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولیک اسید و ید- در دوران بارداری جهت جلوگیری از نقص لوله عصبی و رشد سیستم عصبی جنین
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف این فراورده روزانه یک قرص همراه با غذا می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. بیش از دوز مجاز روزانه مصرف نکنید مگر آن که پزشک معالج دستور داده باشد. از مصرف همزمان این فرآورده با سایر فراورده‌های حاوی فولیک اسید خودداری نمایید. اگر مبتلا به اختلالات تیرویید هستید قبل از مصرف این فراورده با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید. در صورت ابتلا به اختلالات کلیوی قبل از مصرف به پزشک خود اطلاع دهید. در صورت وجود هرگونه سابقه حساسیت نسبت به این فرآورده یا سایر فرآورده‌های مشابه حاوی این مواد و حساسیت به هر ماده رنگی، غذایی و مواد محافظ، قبل از مصرف این محصول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. دوزهای بالای اسید فولیک می‌تواند علائم کمبود ویتامین B۱۲ را پنهان کند، که در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به آسیب عصبی شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** فولیک اسید و ید در دوران بارداری و شیردهی برای پیشگیری از نقص لوله عصبی و رشد و نمو سیستم عصبی در جنین و سلامت مادر ضروری است. تحت نظارت پزشک مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** سابقه حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. به طور کلی فولیک اسید در دوزهای توصیه شده به خوبی تحمل می‌شود و واکنش‌های حساسیتی و اختلالات گوارشی به ندرت گزارش شده است با این حال امکان بروز علائمی از قبیل تهوع، اسهال، طعم فلزی در دهان، ناراحتی معده، سر درد و در موارد نادر واکنش‌های حساسیتی و پوستی وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** پزشک یا داروساز خود را در مورد تمامی داروها و مکمل‌های مصرفی خود مطلع کنید و در صورت مصرف همزمان با داروهای زیر با ایشان مشورت نمایید: متوتروکسات (کاهش اثر متوتروکسات)، لیتیم، متی مازول، داروهای ضد صرع از قبیل فنی توئین و والپروات، پتاسیم کلرات، پتاسیم یدید، آمیودارون، یدوکینول
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** یک عدد قرص در روز- مقدار بیشتر از حد توصیه شده طبق صلاحدید پزشک می باشد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از حد مجاز ممکن است باعث بروز علائمی از قبیل ناراحتی‌های گوارشی از جمله تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، اسهال، طعم فلزی در دهان، واکنش‌های پوستی، احساس سوزش در دهان، تشنج و گیجی شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

- **نام فرآورده: فروس گلایسینات / فولیک اسید**
- **نام تجاری/ برند: فیژل پلاس**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد کپسول حاوی پلت انتریک کوتد در ۳ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر کپسول
فروس گلایسین سولفات	۶۰ میلی‌گرم آهن المنتال
فولیک اسید	۰/۷۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز- کراس پویدیون- متاکریلیک اسید- دی اتیل فتالیت- سوکروز- نشاسته ذرت- تالک- الکل ایزوپرولیل
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال- مصرف در کودکان با تجویز پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین توام آهن و فولیک اسید به خصوص در دوران بارداری، شیردهی و در موارد سوء تغذیه- کمک به ساخت گلبول قرمز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف هر دارو یا مکمل را پزشک تعیین می‌کند مقدار مصرف این فراورده به طور کلی به صورت زیر است: دوز معمول مصرف یک عدد کپسول در روز می‌باشد. همراه به یک لیوان آب میل شود. این مکمل را بهتر است با معده خالی (برای مثال اول صبح یا بین دو وعده غذایی) مصرف کنید. زیرا ترکیبات غذا می‌توانند موجب کاهش جذب مکمل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید- این فرآورده جهت پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری نمی‌باشد- در صورت حساسیت به این فراورده، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها پزشک را مطلع سازید- در صورتی که یک نوبت مصرف فراورده را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه‌ی معمول خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را نیز دو برابر نکنید- دوره‌ی مصرف باید تا زمان طبیعی شدن میزان آهن و اسید فولیک و یا تا زمانی که ذخایر آهن بدن پر شود، ادامه یابد. دوره مصرف بسته به شدت کمبود و شرایط فرد (بارداری، اهدای خون، همودیالیز مزمن، انتقال خون اتولوگ برنامه ریزی شده) متفاوت است و به طور معمول در حدود ۱۰ تا ۲۰ هفته یا بیشتر (در صورت وجود عامل پاتولوژی مقاوم زمینه‌ای) می‌باشد- این فراورده حاوی آهن بالاتر از ۴۵ میلی‌گرم می‌باشد- در موارد زیر از مصرف فراورده خودداری کنید: حساسیت به هر یک از ترکیبات اصلی و جانبی این فراورده، تنگی مری، کودکان زیر ۶ سال، تجمع آهن در بدن، اختلالات استفاده از آهن- در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: افراد دارای زخم‌های دستگاه گوارش، آنمی همولیتیک، هموگلوبینوپاتی، میلودیس پلازی، تجمع آهن یا اختلال جذب آهن- در موارد کمبود اریتروپویتین ثانویه تا بیمارهای کلیوی شدید، مصرف مکمل باید همراه با اریتروپویتین باشد- در بیماران سالخورده دچار دفع خون و آهن با منبع نامشخص، جهت یافتن علت کم خونی و منبع خونریزی باید آزمایشات دقیق صورت گیرد- مصرف آهن ممکن است موجب مسمومیت به خصوص در کودکان شود- حداقل ۲ ساعت باید بین مصرف این ترکیبات و مکمل فاصله باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف آهن و فولیک اسید در دوران بارداری و شیردهی ضروری است لکن جهت تعیین مقدار دقیق با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هر یک از ترکیبات اصلی و جانبی این فراورده- مقادیر زیاد آهن خون مانند هموکروماتوز (جذب بیش از اندازه آهن و افزایش بیمارگونه‌ی آهن‌های ذخیره‌ای بدن)- همولیز مزمن همراه با علائم تجمع آهن- در اختلالات مصرف آهن (مانند کم خونی سیدروبلاستیک، کم خونی ناشی از مسمومیت با سرب، تالاسمی)- در کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ - مصرف در کودکان کمتر از ۶ سال
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو و مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته

شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرصت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید: ناراحتی‌های دستگاه گوارش مانند اسهال، یبوست، نفخ، سوزش سر دل یا تهوع- واکنش‌های حساسیتی پوست مانند راش و کهیر در موارد بسیار نادر ممکن است اتفاق بیفتد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید. آهن‌های تزریقی، داکسی سایکلین، فلوروکینولون‌ها، متیل دوپا (فرما)، ترکیبات موثر بر روی هورمون‌های غده تیروئید، تتراسایکلین‌ها، پنی سیلامین، بیس فسفونات‌ها، ترکیبات ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID)، آنتی اسیدها و کلسیم- ترکیبات سایتوتوکسیک، سولفونامیدها، ضدتشنج‌ها و باربیتورات ها باعث کاهش میزان جذب اسید فولیک می‌شوند- دوزهای بالای این مکمل می‌تواند موجب افزایش توالی تشنج در بیماران دریافت کننده‌ی داروهای ضد تشنج شود- با توجه به این که هر دو ترکیب اسید فولیک و ویتامین B۱۲ در افزایش رتیکلوسیت‌های خونی نقش اساسی دارند. تجویز هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند موجب کمبود دیگری شود- تست بنزیدین طی مصرف آهن می‌تواند مثبت شود- مصرف خوراکی آهن می‌تواند باعث تیره شدن مدفوع شده و موجب ایجاد جواب مثبت کاذب در تست گایاک شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی روزانه بسته به سن، جنس و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** علائم اولیه مسمومیت با آهن اسهال، استفراغ، افت فشار خون و افزایش ضربان قلب است. در صورت بروز این علائم به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: فروس گلایسین سولفات**
- **نام تجاری/ برند: فیژل®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد کپسول انتریک کوت در ۳ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر کپسول
فروس گلایسین سولفات	معادل ۱۰۰ میلی‌گرم آهن المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز- کراس پویدیون- متاکریلیک اسید- دی اتیل فتالیت- سوکروز- نشاسته ذرت- تاک- الکل ایزوپورلیل
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال- مصرف در کودکان طبق صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود کم‌خونی ناشی از فقر آهن به خصوص در دوران بارداری، شیردهی و درموارد سوء تغذیه
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف هر دارو یا مکمل را پزشک تعیین می‌کند مقدار مصرف این فراورده به طور کلی به صورت زیر است: دوز معمول مصرف یک عدد کپسول در روز می‌باشد- همراه با یک لیوان آب میل شود- این مکمل را بهتر است با معده خالی (برای مثال اول صبح یا بین دو وعده غذایی) مصرف کنید. زیرا ترکیبات غذا می‌توانند موجب کاهش جذب مکمل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید. در صورت حساسیت به این فراورده، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها پزشک را مطلع سازید. در صورتی که یک نوبت مصرف فراورده را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه‌ی معمول خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را نیز دو برابر نکنید. دوره مصرف بسته به شدت کمبود و شرایط فرد متفاوت است ولی به طور معمول در حدود ۱۰ تا ۲۰ هفته یا بیشتر (در صورت وجود عامل پاتولوژی مقاوم زمینه‌ای) می‌باشد. این فراورده حاوی آهن بالاتر از ۴۵ میلی‌گرم می‌باشد. در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: افراد دارای بیماری‌های دستگاه گوارش مانند بیماری التهاب روده (IBD)، التهاب معده، زخم‌معده و دستگاه گوارش- در موارد کمبود اریتروپویتین ثانویه در بیمارهای کلیوی شدید، مصرف مکمل باید همراه با اریتروپویتین باشد- در بیماران سالخورده دچار دفع خون و آهن با منبع نامشخص، جهت یافتن علت کم‌خونی و منبع خونریزی باید آزمایشات دقیق صورت گیرد. مصرف آهن ممکن است موجب مسمومیت به خصوص در کودکان شود- جذب این مکمل می‌تواند توسط ترکیبات کمپلکس شونده به آهن (مانند فسفات‌ها، فیتات‌ها و اگزالات‌ها) موجود در غذاهای گیاهی، شیر، قهوه، چای و سفیده تخم‌مرغ، مهار شود. حداقل ۲ ساعت باید بین مصرف این ترکیبات و مکمل فاصله باشد. مصرف آهن خوراکی ممکن است موجب تیره شدن مدفوع (بدون وجود خونریزی در دستگاه گوارش) شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف آهن در دوران بارداری و شیردهی مجاز است لکن جهت تعیین مقدار مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن شرایط زیر از مصرف فراورده خودداری کنید: حساسیت به هر یک از ترکیبات اصلی و جانبی این فراورده، هموکروماتوزیس (جذب بیش از اندازه آهن و افزایش بیمارگونه‌ی آهن‌های ذخیره‌ای بدن)، هموليز مزمن همراه با علائم تجمع آهن، کم خونی سایدروبلاستیک، کم‌خونی ناشی از سرب، تالاسمی و کم‌خونی‌های ثانویه تا هموگلوبینوپاتی، تزریق مکرر خون، تنگی مری، کودکان زیر ۶ سال
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو و مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرصت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. عوارض معمول: ناراحتی‌های

دستگاه گوارش، اسهال، یبوست، استفراغ، حالت تهوع، سوزش سر دل و مدفوع تیره رنگ- عوارض نادر: واکنش‌های حساسیتی پوست، اختلالات بافت زیر پوست و پوست مانند گزانتوما، راش و کهیر

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید: آهن‌های تزریقی، داروهای مهار کننده پمپ پروتون مانند پنتو پرازول، داکسی سایکلین، فلوروکینولون‌ها، متیل دوپا (فرم L)، ترکیبات موثر بر روی هورمون‌های غده تیروئید، تتراسایکلین‌ها، پنی‌سیلامین، بیس‌فسفونات‌ها، لوودوپا، ترکیبات ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID)، آنتی اسیدها و کلسیم
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی آن بسته به سن، جنس و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از ۱۰۰ میلی‌گرم آهن در روز اجتناب کنید مگر این که با دستور پزشک باشد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده ممکن است علائمی از قبیل تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، اسهال، خستگی و ضعف. در صورت بروز عوارض شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان





- **نام فرآورده: کافئین**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: -**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
کافئین انهیدروز	۲۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز ۱۰۲- نشاسته ذرت- آئروزیل- منیزیم استئارات
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال (در افراد ۱۲ تا ۱۸ سال دوز مصرفی کافئین روزانه ۱۰۰ میلی‌گرم است.)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش هوشیاری و تاخیر خستگی- بهبود استقامت و عملکرد بدنی در تمرینات ورزشی- کمک به افزایش متابولیسم و کاهش وزن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول قبل از تمرینات ورزشی یا ذهنی به همراه یک لیوان آب مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. مصرف در کودکان زیر ۱۲ سال ممنوع است. از مصرف کافئین قبل از خواب خودداری نمایید. در مصرف همزمان این فرآورده با غذاها، سایر داروها و نوشیدنی‌های حاوی کافئین احتیاط نمایید. در صورت سابقه حساسیت به کافئین و مواد مشابه، بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا، نارسایی کبدی، بی‌خوابی، اختلالات اضطرابی و یا مصرف دارویی خاص، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید و از مصرف طولانی مدت خودداری کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید: تپش قلب، افزایش فشار خون، عوارض گوارشی از قبیل تهوع، استفراغ، اسهال و درد معده، بی‌قراری، وز وز گوش، سردرد، لرزش عضلانی، بی‌خوابی، تحریک عصبی، گیجی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت استفاده از فرآورده‌های زیر حتما پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید: داروهای قلبی- عروقی، داروهای محرک سیستم عصبی، لیتیم، فنی توئین، آلوپورینول، آمینوفیلین و تئوفیلین
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین (معادل ۴ فنجان قهوه) در روز برای اکثر بزرگسالان سالم ایمن شمرده می‌شود. (در مصرف بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین در روز احتیاط کنید.)
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف بیش از مقدار توصیه شده باعث تحریک عصبی، بی‌خوابی، بی‌قراری، افزایش ضربان قلب، عوارض گوارشی (مانند تهوع، استفراغ و اسهال)، تاری دید و سرگیجه می‌شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان




- **نام فرآورده: کلسیم / ویتامین د۳/ منیزیم / زینک**
- **نام تجاری/ برند: کلسی دکس پلاس®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد قرص در ۵ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**


جز	مقدار در هر قرص
کلسیم کربنات	۵۰۰ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد جهانی
منیزیم هیدراکساید	۵۰ میلی‌گرم منیزیم المنتال
زینک سولفات	۵ میلی‌گرم زینک المنتال

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پویدون- کراکارملوز سدیم- منیزیم استئارات- تالک- پروپیلن گلایکول- تیتانیوم دی اکساید- پلی وینیل پیرولیدون K۳۰- آب خالص- الکل ۹۶٪- HPMC -PEG
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال- مصرف در کودکان با صلاحدید پزشک
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین کلسیم و ویتامین د، زینک و منیزیم- کمک به سلامت و تقویت مو، استخوان، دندان و عضلات- تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دوز معمول مصرف یک تا دو عدد قرص در روز می‌باشد. مقدار مصرف در هر بیمار بر اساس شدت کمبود آن توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- مصرف کلسیم کافی در رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی مناسب، بخصوص درسال‌های اول زندگی تا ۳۵ سال نقش مهمی در تولید استخوان‌های محکم دارد- ویتامین D مانع برداشت کلسیم از استخوان می‌شود. این ویتامین به ویتامین نور خورشید نیز معروف است چون پوست شما در مقابل نور خورشید آن را تولید می‌کند. قرار گرفتن ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در روز در مقابل نور خورشید میزان نیاز روزانه ویتامین D شما را تامین می کند. مصرف این فرآورده در برنامه روزانه برای بزرگسالان خیلی اهمیت دارد و حتی شاید بعضی از بزرگسالان نیاز به مقدار بیشتری از این فرآورده را در برنامه روزانه خود دارند. در صورت مصرف سایر داروها و مکمل‌ها همزمان با مصرف این فرآورده، مانند فرآورده‌های حاوی کلسیم و منیزیم، سلولز سدیم فسفات، اتیدرونات، گالیم نیترات، منیزیم سولفات، فنی توئین، سدیم پلیستیرین سولفونات و تتراسایکلین پزشک را مطلع سازید. در صورت وجود بیماری‌هایی مانند اسهال، مشکلات گوارشی، قلبی، هیپرکلسمی، ترشح زیاد کلسیم در ادرار، سارکوئیدوز، پرکاری و کم کاری پاراتیروئید، بیماری کلیوی یا سنگ کلیه و کمبود مس پزشک را مطلع سازید. بهترین زمان مصرف این فرآورده ۱ تا ۲ ساعت پس از مصرف غذاست مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد. بهترین منابع منیزیم شامل سبزیجات با برگ‌های سبز رنگ، آجیل، نخود فرنگی، لوبیا و غلات می‌باشند. در صورت حساسیت به این مکمل، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها پزشک را مطلع سازید. در صورتی که یک نوبت مصرف این فرآورده را فراموش کردید به محض یادآوری مصرف کنید سپس طبق برنامه معمول مصرف نمایید. از مصرف فرآورده‌های حاوی مقادیر بالای کلسیم، منیزیم، فسفات و یا ویتامین د خودداری نمایید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد- از مصرف بیش از حد نوشابه‌های حاوی کافئین یا الکل و استعمال دخانیات خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل

دهنده- افراد مبتلا به هایپرکلسمی (سطح بالای کلسیم در خون)- سطح بالای ویتامین د۳ در خون

- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبي زير نادر است ولي در صورت مصرف مقادير زياد يا به مدت طولاني و يا در بيماران كليوي ممكن است مشاهده شود-در صورت بروز هر كدام از علائم زير بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد: خواب آلودگی، سرگیجه، تهوع و استفراغ مداوم، نفخ، ضعف، تکرر ادرار
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلین و کینولون (کلسی دکس پلاس® حداقل ۲ ساعت قبل یا ۴-۶ ساعت پس از مصرف این آنتی بیوتیک‌ها مصرف کنید)- بیس فسفونات‌ها- لووتیرکوسین (با فاصله ۴ ساعته با این دارو مصرف شود.)- استروئیدها- دیورتیک‌های تیازیدی- داروهای آنتی اسید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز بسته به سن و جنس متفاوت است- مقدار بیشتر با صلاحدید پزشک تجویز می‌شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده احتمال بروز عوارضی از قبیل درد استخوان، یبوست، اسهال، خواب آلودگی، سردرد مداوم، افزایش تشنگی، تکرر ادرار، و یا فزایش حجم ادرار، ضربان قلب، نا منظم، خارش پوست، کاهش اشتها، احساس طعم فلزی در دهان، درد عضلانی، تهوع و استفراغ، پروتئین در ادرار، قرمزی یا تحریک‌پذیری چشم و پلک، آبریزش بینی و کاهش وزن. در صورت بروز این علائم به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان






- **نام فرآورده: کلسیم / ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: کلسی دکس فورت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد قرص در ۵ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم کربنات	۵۰۰ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پویدون- کراسکارملوز سدیم- منیزیم استئارات- تالک- پروپیلن گلایکول- تیتانیوم دی اکساید- پلی وینیل پیرولیدون K۳۰ - آب خالص- الکل ۹۶٪- PEG - HPMC
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۸ سال- مصرف در کودکان بالای ۱۲ سال طبق صلاحدید پزشک
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین کلسیم و ویتامین د- کمک به سلامت و تقویت استخوان‌ها، دندان‌ها و عضلات- کمک به تامین کلسیم در دوران بارداری و شیر دهی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دوز معمول مصرف یک تا دو عدد قرص در روز می‌باشد لکن مقدار مصرف در هر بیمار بر اساس شدت کمبود آن توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- مصرف کلسیم کافی در رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی مناسب، بخصوص درسال‌های اول زندگی تا ۳۵ سال نقش مهمی در تولید استخوان‌های محکم دارد- ویتامین د مانع برداشت کلسیم از استخوان می‌شود. این ویتامین به ویتامین نور خورشید نیز معروف است چون پوست شما در مقابل نور خورشید آن را تولید می‌کند- قرار گرفتن ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در روز در مقابل نور خورشید میزان نیاز روزانه ویتامین د شما را تامین می‌کند- در صورت مصرف سایر داروها و مکمل‌ها همزمان با مصرف این فرآورده، مانند فرآورده‌های حاوی کلسیم، سلولز سدیم فسفات، اتیدرونات، گالیم نیترات، منیزیم سولفات، فنی توئین و تتراسایکلین پزشک را مطلع سازید- در صورت وجود بیماری‌های قلبی، مشکلات گوارشی، هیپرکلسیمی، زیادی کلسیم در ادرار، پرکاری و کم‌کاری پاراتیروئید، سارکوئیدوز بیماری کلیوی یا سنگ کلیه و نیز اسهال پزشک را مطلع سازید- از مصرف این فرآورده ۱ تا ۲ ساعت پس از مصرف داروهای خوراکی خودداری کنید- قرص کلسی دکس فورت را با یک لیوان پر آب یا آب‌میوه مصرف کنید- بهترین زمان مصرف این فرآورده ۱ تا ۱/۵ ساعت پس از مصرف غذاست مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد- در صورتی که یک نوبت مصرف این فرآورده را فراموش کردید به محض یادآوری مصرف کنید سپس طبق برنامه معمول مصرف نمایید- در صورت مصرف مواد غذایی حاوی فیبرو غلات، قرص کلسی دکس فورت را ۱ تا ۲ ساعت بعد مصرف کنید-از مصرف فرآورده‌های حاوی مقادیر بالای کلسیم، منیزیم، فسفات و یا ویتامین د خودداری نمایید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد- از مصرف بیش از حد نوشابه‌های حاوی کافئین یا الکل و استعمال دخانیات خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقدار کافی کلسیم دردوران بارداری و شیردهی بسیار مهم است و مصرف زیاد آن نیز می‌تواند مضر باشد. پس در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک در مورد میزان مصرف کلسیم مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هر یک از اجزای فرمولاسیون- افراد مبتلا به هایپرکلسمی (سطح بالای کلسیم در خون)- سطح بالای ویتامین د۳ در خون
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض جانبی زیر بسیار نادر است ولی در صورت مصرف مقادیر زیاد یا به مدت طولانی و یا در بیماران کلیوی ممکن است مشاهده شود- در صورت بروز هر کدام از علائم زیر بلافاصله به پزشک مراجعه کنید: موارد نادر: خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ مداوم، ضعف، تکرر ادرار
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلین و کینولون (کلسی دکس فورت® حداقل ۲ ساعت قبل یا ۴-۶ ساعت پس از مصرف این آنتی بیوتیک ها مصرف کنید)- بیس فسفونات‌ها- لووتیرکوسین (با فاصله ۴ ساعته با این دارو مصرف شود.)- استروئیدها- دیورتیک‌های تیازیدی
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز بسته به سن و جنس متفاوت است- مقدار بیشتر با صلاحدید پزشک تجویز می‌شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** علائمی که درطولانی مدت بر اثر مصرف بیش از حد (overdose) مشاهده می‌شوند شامل: توهم، خواب‌آلودگی شدید، بالا رفتن فشار خون، حساسیت چشم و پوست به نور، ضربان قلب سریع یا کند و نامنظم، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار هستند. در صورت بروز این علائم به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: کلسیم / ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: کلسی دکس®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد قرص در ۵ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم کربنات	۵۰۰ میلی‌گرم کلسیم المنتال
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** کراس کارملوز سدیم، پویدون، منیزیم استئارات، HPMC، تالک، PEG، تیتانیوم دی اکساید، color yellow NO.۱۰
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال- مصرف در کودکان تحت نظارت پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین کلسیم و ویتامین د- کمک به سلامت و تقویت استخوان‌ها، دندان‌ها و عضلات- کمک به تامین کلسیم در دوران بارداری و شیردهی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دوز معمول مصرف یک تا دو عدد قرص در روز می‌باشد لکن مقدار مصرف در هر بیمار بر اساس شدت کمبود آن توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- مصرف کلسیم کافی در رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی مناسب، بخصوص درسال‌های اول زندگی تا ۳۵ سال نقش مهمی در تولید استخوان‌های محکم دارد- زنان باردار، مادران شیرده، کودکان و سالخوردگان حتی با وجود غذای غنی از کلسیم ممکن است نیاز به مکمل کلسیم داشته باشند.ویتامین D مانع برداشت کلسیم از استخوان می‌شود. این ویتامین به ویتامین نور خورشید نیز معروف است چون پوست شما در مقابل نور خورشید آن را تولید می‌کند- قرار گرفتن ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در روز در مقابل نور خورشید میزان نیاز روزانه ویتامین D شما را تامین می‌کند- در صورت مصرف سایر داروها و مکمل‌ها همزمان با مصرف این فرآورده، مانند فرآورده‌های حاوی کلسیم، سلولز سدیم فسفات، اتیدرونات، گالیم نیترات، منیزیم سولفات، فنی توئین و تتراسایکلین پزشک یا دارو ساز خود را مطلع سازید- در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی، مشکلات گوارشی، هیپرکلسیمی، مقدار بالای کلسیم در ادرار، پرکاری و کم کاری پاراتیروئید، سارکوئیدوز، بیماری کلیوی یا سنگ کلیه و نیز اسهال پزشک را مطلع سازید- از مصرف این فرآورده ۱ تا ۲ ساعت پس از مصرف داروهای خوراکی خودداری کنید. قرص کلسیم را با یک لیوان پر آب یا آب میوه مصرف کنید. بهترین زمان مصرف این فرآورده ۱ تا ۱/۵ ساعت پس از مصرف غذاست مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد. در صورتی که یک نوبت مصرف این فرآورده را فراموش کردید به محض یادآوری مصرف کنید سپس طبق برنامه معمول مصرف نمایید- در صورت مصرف مواد غذایی حاوی فیبرو غلات، این محصول را ۱ تا ۲ ساعت بعد مصرف کنید- از مصرف بیش از حد نوشابه‌های حاوی کافئین یا الکل و استعمال دخانیات خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقدار کافی کلسیم دردوران بارداری و شیردهی بسیار مهم است و مصرف زیاد آن نیز می‌تواند مضرباشد. پس در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک در مورد میزان مصرف کلسیم مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده- هایپرکلسی (مقدار بالای کلسیم در خون)- ابتلا به اختلالات شدید کلیوی
- **عوارض جانبی احتمالی:** این محصول در دوزهای توصیه شده به خوبی تحمل می‌شود ولی در صورت مصرف مقادیر زیاد یا به مدت طولانی و یا در بیماران کلیوی ممکن است عوارض زیر مشاهده شود. در صورت بروز هر کدام از علائم زیر بلافاصله به پزشک مراجعه کنید:
خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ مداوم، ضعف، اشکال در ادرار کردن
علائم سریع مصرف بیش از حد: یبوست، خشکی دهان،

سردرد مداوم، تشنگی زیاد، تحریک‌پذیری و کاهش اشتها، افسردگی، احساس طعم فلزی در دهان، ضعف و خستگی غیرعادی

علائمی که درطولانی مدت بر اثر مصرف بیش از حد مشاهده می‌شود: توهم، خواب‌آلودگی شدید، بالا رفتن فشار خون، حساسیت چشم و پوست به نور، ضربان قلب سریع یا کند و نامنظم، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف فرآورده‌های حاوی مقادیر بالای کلسیم، منیزیم فسفات و ویتامین D۳ خودداری نمایید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد. در صورت مصرف هم زمان با آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلین، آهن، زینک، کورتیکواستروئیدها، سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین، داروهای مربوط به اختلالات تیروئید، داروهای ضدقارچ، کینیدین و فنی توئین با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده اجتناب کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده احتمال بروز توهم، خواب‌آلودگی شدید، بالا رفتن فشارخون، حساسیت چشم و پوست به نور، ضربان قلب سریع یا کند و نامنظم، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان





- **نام فرآورده: کلسیم+د**
- **نام تجاری/ برند: کلسی دکس فورت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کربنات کلسیم	معادل۲۵۰ میلی‌گرم کلسیم
ویتامین د۳	۱۵۰ واحد جهانی

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** سـدیم کـراس کارملـوز، منیزیـم اسـتئارات، تالـک، PVP، هیپروملـوز، تیتانیـوم دی‌اکسـید، PEG
- **رده سـنی:** بزرگسـالان و کـودکان بـالای ۱۲ سـال- مصـرف در کـودکان تحـت نظـارت پزشـک می‌باشـد.
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن کلسـیم و ویتامیـن د- کمـک بـه سـلامت اسـتخوان‌ها و دندان‌هـا
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** یـک تـا دو عـدد قـرص در روز مگـر پزشـک دسـتور دیگـری داده باشـد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـرآورده جهـت پیشـگیری، تشـخیص یـا درمـان بیمـاری نمی‌باشـد. در صورتـی کـه یـک نوبـت مصـرف مکمـل را فرامـوش کردیـد بـه محـض یـادآوری آن را مصـرف کنیـد ولـی اگـر تقریبـا زمـان مصـرف نوبـت بعـدی فـرا رسـیده باشـد، از مصـرف ایـن نوبـت خـودداری کـرده و برنامـه معمـول خـود را ادامـه دهیـد و مقـدار مصـرف را دو برابـر نکنیـد. در صـورت مصـرف غذاهـای غنـی از اگزالیـک اسـید (ماننـد اسـفناج و ریـواس) و فتیـک اسـید ماننـد (غـلات کامـل) ۲ سـاعت فاصلـه بـا مصـرف ایـن مکمـل ایجـاد کنیـد. در صـورت مشـکلاتی نظیـر پوکـی اسـتخوان، سـارکوئیدوزیس و بیماری‌هـای کلیـوی و همچنیـن مصـرف داروهایـی نظیـر گلیکوزیدهـای قلبـی، دیورتیک‌هـا، فرآورده‌هـای دیگـر حـاوی ویتامیـن د یـا کلسـیم قبـل از مصـرف ایـن مکمـل بـه پزشـک یـا داروسـاز خـود اطـلاع دهیـد. مصـرف آنتـی بیوتیک‌هـا از دسـته تتراسـایکلین‌ها و کینولون‌هـا بایـد دو سـاعت قبـل یـا شـش سـاعت بعـد از مصـرف ایـن مکمـل باشـد. در صـورت مصـرف داروهایـی نظیـر کورتیکواسـتروئیدها، ملین‌هـا، کلسـتیرامین، ریفامپیسـین، فنـی توئیـن و باربیتورات‌هـا قبـل از مصـرف ایـن مکمـل بـه پزشـک یـا داروسـاز خـود اطـلاع دهیـد. مصـرف بیـس فسـفونات‌ها، سـه سـاعت قبـل از ایـن مکمـل باشـد و همچنیـن در صـورت مصـرف آهـن یـا زینـک یـا هورمون‌هـای تیروئیـدی دو سـاعت فاصلـه بـا مصـرف ایـن مکمـل ایجـاد کنیـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مصـرف مقـدار کافـی کلسـیم دردوران بـارداري و شـیردهی بسـیار مهـم اسـت و مصـرف زیـاد آن نیـز می‌توانـد مضـر باشـد. پـس در صـورت بـارداری یـا شـیردهی بـا پزشـك در مـورد میـزان مصـرف کلسـیم مشـورت کنیـد.
- **مـوارد منـع مصـرف:** حساسـیت بـه هریـک از ترکیبـات اصلـی و جانبـی ایـن فـرآورده، سـطح کلسـیم خـون یـا ادرار بـالا، نارسـایی کلیـوی شـدید
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** ایـن محصـول در دوزهـای توصیه شـده بـه خوبـی تحمـل می‌شـود ولـی در صـورت مصـرف مقادیـر زیـاد یـا بـه مـدت طولانـی و یـا در بیمـاران کلیـوی ممکـن اسـت عـوارض زیر مشـاهده شـود. در صـورت بـروز هـر کـدام از علائـم زیـر بلافاصلـه به پزشـك مراجعـه کنیـد: مـوارد نـادر: خـواب آلودگـی، تهوع و اسـتفراغ مـداوم، ضعـف، اشـکال در ادرار کـردن
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** از مصـرف فرآورده‌هـای حـاوی مقادیـر بـالای کلسـیم، منیزیـم فسـفات و ویتامیـن D۳ خـودداری نماییـد مگـر اینکـه پزشـک تجویـز کـرده باشـد. در صورت مصـرف هم‌زمـان بـا آنتـی بیوتیک‌هـای تتراسـایکلین، آهـن، زینـک، کورتیکواسـتروئیدها، سیپروفلوکساسـین و لووفلوکساسـین، داروهـای مربـوط بـه اختـلالات تیروئیـد، داروهـای ضدقـارچ، کینیدیـن و فنـی توئیـن بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت کنیـد.
- **ماکزیمـم دوز مصرفـی در طـول روز:** ماکزیمـم دوز مصرفـی بسـته بـه سـن و وضعیـت فـرد متفـاوت اسـت. از مصـرف بیـش از مقـدار توصیـه شـده اجتنـاب کنیـد.
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** در صـورت مصـرف بیـش از حـد توصیـه شـده احتمـال بـروز توهـم، خـواب آلودگـي شـدید، بـالا رفتـن فشـار خـون، حساسـیت چشـم و پوسـت بـه نـور، ضربـان قلـب سـریع یـا کنـد و نامنظـم، تکـرر ادرار یـا افزایـش حجـم ادرار وجـود دارد. در صـورت بـروز علائـم شـدید بـه مراکـز درمانـی مراجعـه نماییـد.
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود- دور از دسـترس کـودکان

- **نام فرآورده: ملاتونین ۳ میلی‌گرمی**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در ۳ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ملاتونین	۳ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، نشاسته ذرت، میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، منیزیم استئارات، هیپروملوز، PG، پوویدون، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک و PEG۶۰۰۰
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال- (تجویز در کودکان با دستور پزشک)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص را یک ساعت قبل از خواب (در هنگام سفر یا در مقصد) به طور کامل و با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.- حداقل چهار الی پنج ساعت بعد از مصرف این مکمل از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید. -در صورت ابتلا به اختلالات هورمونی، دیابت، اختلالات کبدی و کلیوی، صرع، حساسیت به این فرآورده یا هر یک از اجزای آن، بیماری‌های خود ایمنی و مصرف داروهای خواب آور دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** ملاتونین در دوزهای توصیه شده اغلب به خوبی تحمل می‌شود با این حال هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید: سردرد، سرگیجه، تهوع، انقباضات شکمی، اسهال، تحریک‌پذیری و کاهش فشار خون
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای خواب‌آور دیگر، داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت، داروهای ضدصرع، داروهای ضد دیابت، فلووکسامین، ریفامپیسین، وارفارین، کینولون‌ها، استروژن و داورهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، قبل از مصرف این فرآورده با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** مقدار دقیقی برای ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز گزارش نشده است با این حال توصیه می‌شود از مصرف بیش از ۱۰ میلی‌گرم ملاتونین در روز خودداری کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده احتمال بروز توهم، خواب آلودگی شدید، بالا رفتن فشار خون، حساسیت چشم و پوست به نور، ضربان قلب سریع یا کند و نامنظم، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار وجود دارد. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ملاتونین ۵ میلی‌گرمی**
- **نام تجاری/ برند: -**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در ۳ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ملاتونین	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** کراس‌کارملوز سدیم، نشاسته ذرت، میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی‌اکسید کلوئیدی، منیزیم استئارات، هیپروملوز، PG، پوویدون، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک و PEG
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال - (تجویز در کودکان با دستور پزشک)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص را یک ساعت قبل از خواب (در هنگام سفر یا در مقصد) به طور کامل و با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. حداقل چهار الی پنج ساعت بعد از مصرف این مکمل از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید. در صورت ابتلا به اختلالات هورمونی، دیابت، اختلالات کبدی و کلیوی، صرع، حساسیت به این فرآورده یا هر یک از اجزای آن، بیماری‌های خود ایمنی و مصرف داروهای خواب‌آور دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** ملاتونین در دوزهای توصیه شده اغلب به خوبی تحمل می‌شود با این حال هر مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر، با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید: سردرد، سرگیجه، تهوع، انقباضات شکمی، اسهال، تحریک‌پذیری و کاهش فشار خون
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای خواب‌آور دیگر، داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت، داروهای ضد صرع، داروهای ضد دیابت، فلووکسامین، ریفامپیسین، وارفارین، کینولون‌ها، استروژن و داورهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، قبل از مصرف این فرآورده با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** مقدار دقیقی برای ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز گزارش نشده است با این حال توصیه می‌شود از مصرف بیش از ۱۰ میلی‌گرم ملاتونین در روز خودداری کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش ازحد ممکن است علائمی از قبیل خواب‌آلودگی شدید، احساس گیجی، احساس خستگی، سرگیجه، سردرد، کابوس، افت فشار خون، کاهش ضربان قلب و کاهش دمای بدن دیده شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ویتامین ای**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین ای-تداژل® ۱۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین ای	۱۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، آب
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال - مصرف در کودکان با تجویز و صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به درمان کمبود ویتامین E که می‌تواند در اثر فیبروز کیستیک، کلستاز و بیماری شدید کبدی، ابالیپوپروتئینمی یا رژیم غذایی نامناسب رخ دهد. تقویت سیستم ایمنی و قلبی عروقی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کپسول ویتامین ای با یک لیوان آب مصرف شود. مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می‌شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ‌ها، سایر داروها و حیوانات پزشک را مطلع سازید. در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی و داروها به خصوص دیکومارول همزمان با این دارو پزشک را مطلع سازید. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر مانند اختلالات خونریزی پزشک را مطلع سازید. از مصرف طولانی مدت و مقادیر بالای حد مجاز خودداری کنید. در صورتی که یک نوبت از مصرف این دارو را فراموش کردید، آن را مصرف ننموده و دوز بعدی را دو برابر نکنید و به درمان به طور معمول ادامه دهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت شیردهی یا بارداری (به خصوص ۳ ماه اول) قبل از مصرف این محصول پزشک خود را مطلع کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیلدهنده- سطح بالای ویتامین ای در بدن
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرصت با پزشک مشورت کنید. ویتامین ای با دوزهای توصیه شده به طور معمول به خوبی تحمل می‌شود اما در مصرف طولانی‌مدت و دوزهای بالا ممکن است علائمی از قبیل تاری دید، اسهال، گیجی، سردرد، معده درد یا شکم درد، خستگی غیرعادی یا ضعف و خونریزی دیده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای ضدانعقاد، استروژن‌ها- ویتامین E ریسک خونریزی در بیماران با کمبود ویتامین K یا بیمارانی که تحت رژیم ضدانعقاد می‌باشند را افزایش می‌دهد. لذا زمان پروترومبین و INR جهت تنظیم دوز ویتامین E توسط پزشک یا داروساز باید مانیتور گردد. این ویتامین ریسک ترومبوز را در بیماران مستعد افزایش می‌دهد. لذا مصرف آن در خانم‌هایی که کنتراسپتیوهای حاوی استروژن مصرف می‌کنند باید با احتیاط و زیر نظر داروساز و پزشک صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** حداکثر دوز روزانه بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده علائم گوارشی از قبیل اسهال و تهوع، خستگی و ضعف، انقباضات شکمی و افزایش ریسک خون ریزی دیده می‌شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود



- **نام فرآورده: ویتامین ای**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین ای-تداژل® ۴۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین ای	۴۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، آب
- **رده سنی:** رده سنی خاصی برای ویتامین ای وجود ندارد لکن مقدار مصرف به خصوص برای کودکان توسط پزشک تایین می‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به درمان کمبود ویتامین E که می‌تواند در اثر فیبروز کیستیک، کلستاز و بیماری شدید کبدی، ابالیپوپروتئینمی یا رژیم غذایی نامناسب رخ دهد. تقویت سیستم ایمنی و قلبی عروقی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کپسول ویتامین ای با یک لیوان آب مصرف شود. مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می‌شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ‌ها، سایر داروها و حیوانات پزشک را مطلع سازید. گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در کودکانی که دوز معمول روزانه را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است. گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در سالمندانی که دوز معمول روزانه از این دارو را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است. در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی و داروها به خصوص دیکومارول همزمان با این دارو پزشک را مطلع سازید. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر مانند اختلالات خونریزی پزشک را مطلع سازید. از مصرف طولانی مدت و مقادیر بالای حد مجاز خودداری کنید. در صورتی که یک نوبت از مصرف این دارو را فراموش کردید، آن را مصرف ننموده و دوز بعدی را دو برابر نکنید و به درمان به طور معمول ادامه دهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت شیردهی یا بارداری (به خصوص ۳ ماه اول) قبل از مصرف این محصول پزشک خود را مطلع کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده. سطح بالای ویتامین ای در بدن
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرصت با پزشک مشورت کنید. ویتامین ای با دوزهای توصیه شده به‌طور معمول به خوبی تحمل می‌شود اما در مصرف طولانی مدت و دوزهای بالا ممکن است علائمی از قبیل تاری دید، اسهال، گیجی، سردرد، معده درد یا شکم درد، خستگی غیرعادی یا ضعف و خونریزی دیده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای ضدانعقاد، استروژن‌ها. ویتامین E ریسک خونریزی در بیماران با کمبود ویتامین K یا بیمارانی که تحت رژیم ضد انعقاد می‌باشند را افزایش می‌دهد. لذا زمان پروترومبین و INR جهت تنظیم دوز ویتامین E توسط پزشک یا داروساز باید مانیتور گردد. این ویتامین ریسک ترومبوز را در بیماران مستعد افزایش می‌دهد. لذا مصرف آن در خانم‌هایی که کنتراسپتیوهای حاوی استروژن مصرف می‌کنند باید با احتیاط و زیر نظر داروساز و پزشک صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** حداکثر دوز روزانه بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده علائم گوارشی از قبیل اسهال و تهوع، خستگی و ضعف، انقباضات شکمی و افزایش ریسک خون ریزی دیده می‌شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود



- **نام فرآورده: ویتامین ای**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین ای-تداژل® ۶۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین ای	۶۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، آب
- **رده سنی:** رده سنی خاصی برای ویتامین ای وجود ندارد لکن مقدار مصرف به خصوص برای کودکان توسط پزشک تایین می‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به درمان کمبود ویتامین E که می‌تواند در اثر فیبروز کیستیک، کلستاز و بیماری شدید کبدی، ابالیپوپروتئینمی یا رژیم غذایی نامناسب رخ دهد. تقویت سیستم ایمنی و قلبی عروقی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کپسول ویتامین ای با یک لیوان آب مصرف شود. مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می‌شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ‌ها، سایر داروها و حیوانات پزشک را مطلع سازید. گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در کودکانی که دوز معمول روزانه را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است. گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در سالمندانی که دوز معمول روزانه از این دارو را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است. در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی و داروها به خصوص دیکومارول همزمان با این دارو پزشک را مطلع سازید. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر مانند اختلالات خونریزی پزشک را مطلع سازید. از مصرف طولانی مدت و مقادیر بالای حد مجاز خودداری کنید. در صورتی که یک نوبت از مصرف این دارو را فراموش کردید، آن را مصرف ننموده و دوز بعدی را دو برابر نکنید و به درمان به طور معمول ادامه دهید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت شیردهی یا بارداری (به خصوص ۳ ماه اول) قبل از مصرف این محصول پزشک خود را مطلع کنید.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده. سطح بالای ویتامین ای در بدن
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرصت با پزشک مشورت کنید. ویتامین ای با دوزهای توصیه شده به‌طور معمول به خوبی تحمل می‌شود اما در مصرف طولانی مدت و دوزهای بالا ممکن است علائمی از قبیل تاری دید، اسهال، گیجی، سردرد، معده درد یا شکم درد، خستگی غیرعادی یا ضعف و خونریزی دیده شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای ضدانعقاد، استروژن‌ها. ویتامین E ریسک خونریزی در بیماران با کمبود ویتامین K یا بیمارانی که تحت رژیم ضد انعقاد می‌باشند را افزایش می‌دهد. لذا زمان پروترومبین و INR جهت تنظیم دوز ویتامین E توسط پزشک یا داروساز باید مانیتور گردد. این ویتامین ریسک ترومبوز را در بیماران مستعد افزایش می‌دهد. لذا مصرف آن در خانم‌هایی که کنتراسپتیوهای حاوی استروژن مصرف می‌کنند باید با احتیاط و زیر نظر داروساز و پزشک صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** حداکثر دوز روزانه بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده علائم گوارشی از قبیل اسهال و تهوع، خستگی و ضعف، انقباضات شکمی و افزایش ریسک خون ریزی دیده می‌شود. در صورت بروز علائم شدید به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- **نام فرآورده: ویتامین د۳ ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین د۳-تداژل**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی - قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین د۳	۱۰۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** ویتامین د۳ ۱۰۰۰ در کودکان بالای ۹ سال و بزرگسالان مصرف می‌شود. مصرف در کودکان طبق صلاحدید پزشک می‌باشد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به رفع کمبود ویتامین د، کمک به سلامت استخوان‌ها، تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دوز معمول مصرف روزانه یک عدد کپسول می‌باشد اما مقدار دقیق مصرف را پزشک تعیین می‌کند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد. این مکمل حاوی ویتامین د۳ جهت تنظیم جذب و متابولیسم کلسیم و جذب کلسیم در بافت استخوان می‌باشد. این ترکیب در کمک به پیشگیری از کمبود ویتامین د، ریکتز (اختلال در سخت شدن استخوان طی دوره‌ی رشد) و استئومالاسی (نرم شدن استخوان به دلیل کمبود ویتامین د) در کودکان و بزرگسالان و درمان کمکی پوکی استخوان در بزرگسالان موثر می‌باشد. در صورت حساسیت به این فرآورده، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. در صورتی که یک نوبت مصرف مکمل را فراموش کردید برنامه معمول خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

در موارد زیر از مصرف این فرآورده خودداری کنید: حساسیت به هر یک از ترکیبات اصلی و جانبی این فراورده، بالا بودن سطح کلسیم خون (هایپرکلسمی)، بالا بودن سطح کلسیم در ادرار (هایپرکلسیوری)، بالا بودن سطح ویتامین د در خون، در صورت ابتلا به سنگ کلیه. در موارد زیر قبل از مصرف، حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: مستعد بودن در تشکیل سنگ‌های کلیه حاوی کلسیم، اشکال در دفع کلسیم و فسفات از طریق کلیه، در صورت ابتلا به سارکوئیدوزیس زیرا خطر تبدیل ویتامین د به فرم فعالش را افزایش می‌دهد، عدم تعادل در سطح هورمون پاراتیروئید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقدار کافی این فراورده در دوران بارداری و شیردهی بسیار مهم است و مصرف زیاد آن نیز می‌تواند مضر باشد. پس در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک معالج در مورد میزان مصرف مشورت کنید. مقدار کمی از دارو در شیر مادر وارد می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به ویتامین د۳ یا هر یک از اجزای فرمولاسیون، بالابودن سطح کلسیم خون و ادرار و ویتامین د۳ خون، نارسایی شدید کلیه و وجود سنگ‌های کلیوی
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو و مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی شدید مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو، اشکال در بلع، کهیر و تنفس سخت؛ مصرف مکمل را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید. سایر عوارض: افزایش سطح کلسیم در خون (هایپرکلسمی) و ادرار (هایپرکلسیوری)، ناراحتی‌های دستگاه گوارش مانند یبوست، نفخ شکم، تهوع، دردهای ناحیه‌ی شکم، اسهال، واکنش‌های حساسیتی مانند خارش، راش پوستی یا کهیر
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: فنی توئین، باربیتورات‌ها، گلوکوکورتیکوئیدها، ریفامپیسین، ایزونیازید، کلستیرامین، مسهل‌های حاوی پارافین مایع، اکتینومایسین، ایمیدازول، ارلیستات، متابولیت‌ها یا آنالوگ‌های ویتامین D (مانند کلسی ترپول)، داروهای افزایش دهنده‌ی بازده ادرار (دیورتیک‌های تیازیدی)، گلیکوزیدهای قلبی
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده اجتناب کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده باعث بروز سمیت ویتامین د۳ در بدن می‌شود که نشانه‌های آن تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، یبوست، خستگی، ضعف و گیجی است. در صورت بروز این عوارض مصرف را قطع کرده و به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان




- **نام فرآورده: ویتامین د۳ ۲۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین د۳- تداژل®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی تهران دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد کپسول در ۵ بلیستر ۱۰ عددی- قوطی ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین د۳	۲۰۰۰ واحد جهانی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز سدیم و منیزیم استئارات و اکسید آهن زرد
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به رفع کمبود ویتامین د- کمک به سلامت استخوان‌ها- تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** دوز معمول مصرف روزانه یک عدد کپسول می‌باشد اما مقدار دقیق مصرف را پزشک تعیین می‌کند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد- این مکمل حاوی ویتامین د۳ جهت تنظیم جذب و متابولیسم کلسیم و جذب کلسیم در بافت استخوان می‌باشد. این ترکیب در کمک به پیشگیری از کمبود ویتامین د، ریکتز (اختلال در سخت شدن استخوان طی دوره‌ی رشد) و استئومالاسی (نرم شدن استخوان به دلیل کمبود ویتامین د) در کودکان و بزرگسالان و درمان کمکی پوکی استخوان در بزرگسالان موثر می‌باشد. در صورت حساسیت به این فرآورده، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید- در صورتی که یک نوبت مصرف مکمل را فراموش کردید برنامه معمول خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید- در موارد زیر از مصرف این فرآورده خودداری کنید: حساسیت به هر یک از ترکیبات اصلی و جانبی این فراورده- بالا بودن سطح کلسیم خون (هایپرکلسمی)- بالا بودن سطح کلسیم در ادرار (هایپرکلسیوری)- بالا بودن سطح ویتامین د در خون- در صورت ابتلا به سنگ کلیه- در موارد زیر قبل از مصرف، حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: مستعد بودن در تشکیل سنگ‌های کلیه حاوی کلسیم- اشکال در دفع کلسیم و فسفات از طریق کلیه- در صورت ابتلا به سارکوئیدوزیس زیرا خطر تبدیل ویتامین د به فرم فعالش را افزایش می‌دهد- عدم تعادل در سطح هورمون پاراتیروئید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف مقدار کافی این فراورده در دوران بارداری و شیردهی بسیار مهم است و مصرف زیاد آن نیز می‌تواند مضر باشد. پس در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک معالج در مورد میزان مصرف مشورت کنید. مقدار کمی از دارو در شیر مادر وارد می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به ویتامین د۳ یا هر یک از اجزای فرمولاسیون، بالابودن سطح کلسیم خون و ادرار و ویتامین د۳ خون، نارسایی شدید کلیه و وجود سنگ‌های کلیوی
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو و مکمل به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود. اگرچه تمام آن در یک فرد دیده نمی‌شود- در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی شدید مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو، اشکال در بلع، کهیر و تنفس سخت؛ مصرف مکمل را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید- سایر عوارض: افزایش سطح کلسیم در خون (هایپرکلسمی) و ادرار (هایپرکلسیوری)، ناراحتی‌های دستگاه گوارش مانند یبوست، نفخ شکم، تهوع، دردهای ناحیه ی شکم، اسهال، واکنش‌های حساسیتی مانند خارش، راش پوستی یا کهیر
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: فنی توئین، باربیتورات‌ها، گلوکوکورتیکوئیدها، ریفامپیسین، ایزونیازید، کلستیرامین، مسهل‌های حاوی پارافین مایع، اکتینومایسین، ایمیدازول، ارلیستات، متابولیت‌ها یا آنالوگ‌های ویتامین D (مانند کلسی ترپول)، داروهای افزایش دهنده‌ی بازده ادرار (دیورتیک‌های تیازیدی)، گلیکوزیدهای قلبی
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ماکزیمم دوز مصرفی بسته به سن و وضعیت فرد متفاوت است. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده اجتناب کنید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده باعث بروز سمیت ویتامین د۳ در بدن می‌شود که نشانه‌های آن تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، یبوست، خستگی، ضعف و گیجی است. در صورت بروز این عوارض مصرف را قطع کرده و به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود- دور از دسترس کودکان

شرکت داروسازی ثنـامِـــد





- **نام فرآورده: امگا - ۳**
- **نام تجاری/ برند: نشان تجاری سنتروویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
روغن ماهی تغلیظ شده	۵۰۰ میلی‌گرم
DHA	۱۲۰ میلی‌گرم
EPA	۱۸۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرول و ویتامین ای
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت قلب و عروق، کاهش سطح کلسترول و کاهش التهاب در آرتریت روماتوئید
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول به همراه وعده غذایی با یک لیوان آب
- **هشدار و احتیاط‌ها:** دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- در صورت مصرف فرآورده های دارویی از قبیل داروهای ضد دیابت، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای تنظیم کننده فشار خون، داروهای هورمونی ضدبارداری و ویتامین ای. پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه حساسیت به امگا ۳ یا هر یک از اجزای این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مغادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل احساس طعم ماهی در دهان یا بوی ماهی در هنگام تنفس، افت فشار خون، ناراحتی گوارشی مانند تهوع، ریفلاکس، درد شکمی و اسهال و واکنش‌های پوستی بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** این فراورده را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سنتروویت® آیروبیزین®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
آهن (از ملح بیس گلیسینات)	۱۸ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
زینک (از ملح گلوکونات)	۱۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱/۳ میلی‌گرم
ویتامین ب۱۲	۴/۲ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز، لاکتوز، پلی وینیل پیرولیدون، پلی اتیلن گلایکول، کراس‌کارملوز سدیم، منیزیم استئارات، هیدورکسی پروپیل متیل سلولز، سیلیکون دی‌اکسید، تالک و رنگ.
- **رده سنی:** مصرف این فرآورده برای کودکان زیر ۶ سال پیشنهاد نمی‌شود.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، کمک به ساخت گلبول‌های قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری، مصرف هر نوع دارو و در دوران بارداری و شیردهی، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. قرص کاملا بلعیده شود و از خرد کردن و جویدن آن خودداری کنید. مصرف طولانی مدت فراورده‌های حاوی روی ممکن است سبب کاهش میزان مس در بدن شود، لذا از مصرف طولانی مدت بدون توصیه پزشک خودداری نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** بیش از مصرف در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده این فراورده، بالابودن آهن خون، زخم گوارشی و اختلال در متابولیسم آهن از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض ناشی از مصرف فراورده‌های حاوی آهن به طور کلی شامل عوارض گوارشی مثل درد شکمی، یبوست، اسهال، التهاب مجاری گوارشی، تهوع و استفراغ، امکان تیره شدن رنگ مدفوع و ناراحتی معده می‌باشد، که در این فراورده به دلیل فرمولاسیون ویژه آن، این عوارض به حداقل رسیده است. مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل احساس طعم فلزی در دهان، تهوع و ناراحتی گوارشی بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این قرص داروهای ضد اسید معده، تتراسایکلین‌ها و داروهای خانواده فلوروکینولون مثل سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین و مواد غذایی کاهنده جذب آهن مثل چای، قهوه، لبنیات و اسفناج و سویا مصرف نشود. از مصرف همزمان این فراورده با برخی از انتی بیوتیک‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، تتراسایکلین، داکسی سایکلین)، بیس فسفونات‌ها (مانند آلندرونیت و ریزدرونیت) و داروهای ضد صرع مثل فنی‌توئین و لوودوپا به دلیل کاهش جذب این داروها خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: بیوتین ۱۰۰۰ میکروگرم**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
بیوتین	۱۰۰۰ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، لسیتین، بیزوکس، تیتانیوم دی‌اکسید و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست، مو و ناخن‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول به همراه یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری و یا مصرف هر نوع دارو بیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود، در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این قرص داروهای ضد اسید معده، تتراسایکلین‌ها و داروهای خانواده فلوروکینولون مثل سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین و مواد غذایی کاهنده جذب آهن مثل چای، قهوه، لبنیات و اسفناج و سویا مصرف نشود. از مصرف همزمان این فراورده با برخی از انتی بیوتیک‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، تتراسایکلین، داکسی سایکلین)، بیس فسفونات‌ها (مانند آلندرونیت و ریزدرونیت) و داروهای ضد صرع مثل فنی‌توئین و لوودوپا به دلیل کاهش جذب این داروها خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سنتروویت® ریوابیون®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین ب۱	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۲۰۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱۲	۲۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز، پوویدون، سیلیکون دی‌اکسید، سلولز، منیزیم استئارات، کراس کارملوز سدیم، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلایکول، تیتانیوم دی‌اکسید و تالک
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم اعصاب، افزایش سطح انرژی و سلامت پوست و مو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه غذا با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری یا مصرف دارو به ویژه داروهای ضد صرع مانند فنی‌توئین و فنوباربیتال بیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف طولانی مدت فراورده‌های حاوی مقادیر بالای ویتامین ب۶ ممکن است سبب بروز نوروپاتی محیطی شود، لذا از مصرف مداوم بیش از یک سال بدون توصیه پزشک خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، اسهال، استفراغ، سوزش سر دل، درد شکمی، سردرد یا خواب‌آلودگی بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف فراورده قطع شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به دلیل احتمال کاهش جذب ویتامین ب۱۲ از مصرف همزمان با برخی داروها مانند نئومایسین، آسپرین، فاموتیدین، امپرازول، داروهای ضد بارداری خوراکی، کلرامفنیکل و کلشیسین خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** سنتروویت® زینک پلاس ب -کمپلکس ویتامین ای و سلنیوم
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی ثنامد
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی ثنامد
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد سافت ژل در ۳ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
زینک گلوکونات	۵ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۳/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۲	۵/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۳	۹ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۶/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۵	۶ میلی‌گرم
بیوتین	۶۰ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۳ میکروگرم
ویتامین ای	۳۰ واحد
سلنیوم	۵۵ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، لسیتین، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست و مو و ناخن - کمک به سلامت سیستم ایمنی و تامین ویتامین‌های گروه ب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد کپسول با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف دارو فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. مصرف طولانی مدت فراورده‌های حاوی روی ممکن است سبب کاهش میزان مس در بدن شود لذا از مصرف طولانی مدت بدون توصیه پزشک خودداری نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل احساس طعم فلزی در دهان، تغییر رنگ ادرار، تهوع، سردرد، سرگیجه، یبوست، اسهال یا ناراحتی معده بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با برخی (آنتی‌بیوتیک‌ها مثل سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین)، بیس‌فسفونات‌ها (مثل آلندرونات و ریزدرونات)، لووتیروکسین، و پنی سیلامین به دلیل کاهش جذب این داروها خودداری نمایید. از مصرف همزمان با داروی کلستیرامین به سبب احتمال کاهش جذب مواد موثر این فراورده خودداری نمایید. توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف داروهای ضداسید معده و مواد غذایی کاهنده جذب آهن از قبیل چای، قهوه، لبنیات و اسفناج و سویا و سایر مکمل‌های آهن، کلسیم و منیزیم خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سنتروویت® فروویتس- سی وی®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص روکش دار در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
آهن به صورت بیس گلیسینات	۲۷ میلی‌گرم
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۸/۸ میکروگرم
ویتامین ث	۸۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز، پلی وینیل پیرولیدون، لاکتوز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، منیزیم استئارات، پلی اتیلن گلیکول، کراس‌کارملوز سدیم، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، کمک به تامین آهن مورد نیاز در دوران بارداری و شیردهی، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. بیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف مکمل‌های حاوی آهن در افراد مبتلا به نارسایی شدید کبدی، سیروز کبدی و اختلال پانکراس و بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی مانند زخم معده و سابقه خونریزی گوارشی می‌بایست با احتیاط صورت گیرد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل‌دهنده، بالا بودن میزان آهن خون و اختلال در متابولیسم آهن از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض ناشی از مصرف فراورده‌های حاوی آهن به طور کلی شامل عوارض گوارشی از قبیل درد شکمی، یبوست، اسهال، تهوع و استفراغ، نفخ، امکان تیره شدن رنگ مدفوع و ناراحتی معده می‌باشد، که در این فراورده به دلیل فرمولاسیون ویژه آن، این عوارض به حداقل رسیده است. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی، مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فراورده با برخی آنتی بیوتیک‌ها، داروهای آنتی اسید، آنتی هیستامین‌ها، امپرازول، پنتوپرازول، اس امپرازول، مکمل‌های حاوی کلسیم و روی و تتراسایکلین خودداری شود، چون سبب کاهش جذب آهن می‌گردند. از مصرف همزمان با بیس فسفونات‌ها مثل آلندرونات و ریزدرونات، دفریپیرون، انتاکاپون، لوودوپا، لووتیروکسین، متیل‌دوپا، پنی‌سیلامین، مکمل‌های حاوی فسفات، سیپروفلوکساسین، لووفلاوکساسین، موکسی فلوکساسین و افلوکساسین خودداری شود و فاصله حداقل ۲ ساعته قبل و بعد بین مصرف این داروها و فراورده رعایت شود. توصیه می‌شود ۲ ساعت قبل و ۲ ساعت بعد از مصرف این فراورده از مصرف داروهای ضد اسید معده و مواد غذایی کاهش دهنده جذب آهن مثل چای، قهوه، لبنیات، اسفناج و سویا و سایر مکمل‌های حاوی املاح مانند کلسیم و منیزیم خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: فولیک اسید + ویتامین ب۱۲**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد سافت ژل در ۴ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
فولیک اسید	۸۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۱۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسرین، لسیتین، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولیک اسید و ویتامین ب۱۲، کمک به رفع خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف فراورده قطع شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با برخی داروها مثل فنی‌توئین، فنوباربیتال و پریمیدون سبب کاهش جذب این داروها می‌شود؛ لذا در صورت مصرف این داروها پزشک متخصص خود را در جریان قرار دهید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین د۳**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم به صورت کربنات	۵۰۰ میلی‌گرم
منیزیم به صورت اکسید	۷۵ میلی‌گرم
زینک به صورت گلوکونات	۵ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، سوربیتول، سوکرالوز، ساخارین، آسپارتام، پلی وینیل پیرولیدون، ال-لوسین، رنگ، طعم و پلی اتیلن گلیکول
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو بار و هر بار یک عدد قرص در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورتی که دارو خاصی مصرف می‌کنید یا بیماری خاصی دارید این فراورده را زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت مصرف هر نوع دارو و در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نموده و در صورت بروز هر نوع عوارض گوارشی، این فراورده را پس از غذا میل نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف فراورده از مصرف سایر فراورده‌های کلسیم، منیزیم، روی، ویتامین د، داروهای ضد اسید معده، داروهای تیروئید، داروهای پوکی استخوان، آنتی‌بیوتیک‌ها و برخی نوشیدنی‌ها مثل چای و قهوه به سبب احتمال کاهش جذب املاح این فراورده، خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: کلسیم + ویتامین د**
- **نام تجاری/ برند: سنتروویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم به صورت کربنات کلسیم	۵۰۰ میلی‌گرم
ویتامین د	۴۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم ساخارین، سیتریک اسید، سدیم بیکربنات، سوربیتول، سوکرالوز، پلی وینیل پیرولیدون، آسپارتام، لسیتین، پلی اتیلن گلیکول، طعم و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. مصرف این فراورده در افراد مبتلا به هایپر کلسمی (بالابودن میزان کلسیم خون) توصیه نمی‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت مصرف هر نوع دارو و در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** این فراورده حاوی فنیل آلانین است و مصرف آن در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری ممنوع است. در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با آنتی بیوتیک‌ها، داروهای درمان پوکی استخوان و داروهای ضد اسید معده خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری و پس از مصرف درپوش ظرف را ببندید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ب۱+ ب۶ + ب۱۲+ منیزیم**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
منیزیم اکسید	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۲/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۷/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۱۲	۴/۲ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، سوربیتول، سوکرالوز، ساخارین، پلی وینیل پیرولیدون، ال-لوسین، پلی اتیلن گلیکول، رنگ و طعم
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کاهش اسپاسم عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به بیماری خاص یا مصرف دارو این فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نموده و در صورت بروز هر نوع عوارض گوارشی این فراورده را پس از غذا میل نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** دو ساعت قبل یا دو ساعت بعد از مصرف فراورده از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای پوکی استخوان و سایر مکمل‌های حاوی آهن، منیزیم و کلسیم خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: کلسیم سیترات + ویتامین د**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد قرص در سه بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کلسیم به صورت سیترات	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۳۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز، کراس پویدون، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، کراس‌کارملوز سدیم، پلی وینیل پیرولیدون، سیلیکون دی‌اکسید، تیتانیوم دی‌اکسید، تالک، منیزیم استئارات و پلی اتیلن گلیکول
- **رده سنی:** از مصرف این فراورده در کودکان کمتر از ۱۲ سال خودداری نمایید.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها، کمک به کاهش ریسک پوکی استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص مصرف شود. این فراورده را همراه با غذا و با فاصله دو ساعت قبل یا بعد از مصرف مکمل‌های حاوی آهن، روی و سایر داروها میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. پیش از مصرف این فراورده در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های قلبی عروقی، اختلالات غده پاراتیروئید، بالا بوده میزان کلسیم یا ویتامین د و یا پایین بودن میزان فسفات در خون با پزشک خود مشورت نمایید. در صورت ابتلا به بیماری‌ها یا مصرف دارو پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید. سابقه حساسیت به املاح کلسیم و یا مشتقات ویتامین د.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، اسهال، استفراغ، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، سردرد، خواب‌آلودگی و سوزش ادرار بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف دو ساعت قبل یا بعد از مصرف داروهای خانواده بیس فسفنات مانند آلندرونیت به سبب امکان کاهش غلظت این داروها در خون و عدم بروز اثرات درمانی خودداری نمایید. مصرف همزمان با داروهای مهار کننده کانال کلسیم از قبیل آملودیپین، نیفدیپین، دیلتیازم و وراپامیل به سبب احتمال کاهش اثرات درمانی این داروها با احتیاط صورت گیرد. مصرف همزمان با گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین به سبب احتمال افزایش اثرات ایجادکننده آریتمی این داروها با احتیاط صورت گیرد. از مصرف این فراورده ۴ ساعت قبل یا بعد از مصرف داروهای مربوط به اختلالات تیروئیدی خودداری نمایید. مصرف همزمان با داروهای افزایش دهنده ادرار تیازیدی، تتراسایکلین، سوتالول، سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، افلوکساسین، موکسی فلوکساسین، املاح فسفات، پنی سیلامین، ریتالین، مزالازین، کتوکونازول، ایتراکونازول، آتورواستاتین، رزوواستاتین، گاباپنتین و دفرپیرون به سبب احتمال تداخل در جذب و سطح خونی این داروها با احتیاط صورت گیرد. از مصرف همزمان با سایر فراورده‌های حاوی آهن، کلسیم و ویتامین د، داروهای مربوط به بیماری تیروئید، آلندرونیت و داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین و هپارین، بدون اطلاع پزشک خود خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** سنتروویت® مکسیرون پلاس اس ام®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی ثنامد
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی ثنامد
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ عدد سافت ژل در ۳ بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
آهن به صورت بیس گلیسینات	۲۸ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۶	۷/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۱۲به صورت سیانوکوبالامین	۴/۲ میکروگرم
ویتامین ث	۶۰ میلی‌گرم
زینک به صورت گلوکونات	۱۱ میلی‌گرم
مس به صورت گلوکونات	۱ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن دانه سویا، ژلاتین، گلیسرین، لسیتین، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید، BHT ، BHAو رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از فقر آهن و کم‌خونی، تامین آهن مورد نیاز در دوران بارداری و شیردهی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری و مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف مکمل‌های حاوی آهن در افراد مبتلا به نارسایی شدید کبدی، سیروز کبدی، اختلال پانکراس و بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی مانند زخم معده و سابقه خونریزی گوارشی می‌بایست با احتیاط صورت گیرد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده، بالابودن میزان آهن خون و اختلال در متابولیسم آهن از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود، اما ممکن است عوارضی از قبیل احساس طعم فلزی در دهان، تغییر رنگ ادرار و مدفوع، نفخ، تهوع، سردرد، سرگیجه، تاری دید، یبوست، دل‌پیچه، اسهال و ناراحتی معده بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فراورده با برخی آنتی‌بیوتیک‌ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین)، داروهای پوکی استخوان (مانند آلندرونیت)، لووتیروکسین، پنی‌سیلامین و داروهای ضد صرع مانند فنی‌توئین و لوودوپا به دلیل کاهش جذب این داروها خودداری نمایید. از مصرف همزمان با داروی کلستیرامین به سبب احتمال کاهش جذب فولیک اسید خودداری نمایید. توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت پس از مصرف این فراورده از مصرف داروهای ضد اسید معده و مواد غذایی کاهش دهنده جذب آهن از قبیل چای، قهوه، لبنیات، اسفناج و سویا و سایر مکمل‌های حاوی املاح کلسیم و منیزیم خودداری کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند: سنتروویت® لیکوئید منیزیم۳۰۰ +ب کمپلکس**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل
منیزیم به صورت منیزیم اکسید	۳۰۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۱	۲/۱ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۶ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۴/۲ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن دانه سویا، گلیسرین، لسیتین سویا، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی، کمک به کاهش اسپاسم عضلانی و کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول به همراه یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری و یا مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف این فراورده در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، آریتمی‌های قلبی و دارای ضربان‌ساز قلب و بیماری عضلانی میاستنی‌گراو توصیه نمی‌شود. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده این فراورده، از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما ممکن است عوارضی از قبیل اسهال، تهوع، درد شکمی و استفراغ بروز پیدا کند. در صورت بروز عوارض گوارشی این فراورده را بعد از غذا مصرف نمایید. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این فراورده از مصرف آنتی بیوتیک‌ها و داروهای پوکی استخوان و سایر مکمل‌های حاوی املاح مانند آهن، زینک و کلسیم خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده:** -
- **نام تجاری/ برند:** سنتروویت® هموژل®
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی ثنامد
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی ثنامد
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ عدد کپسول سافت ژل در ۳ بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
آهن به صورت فروس بیس گلیسینات	۱۸ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین ب۱۲	۴/۲ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسرین، ژلاتین، روغن دانه سویا، بوتیریل هیدروکسی آنیزول، بوتیریل هیدروکسی تولوئن، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید، رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت، تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هر بیماری یا مصرف داروی خاص قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. در افراد مبتلا به نارسایی شدید کبدی، سیروز کبدی، اختلال پانکراس و بیماری مبتلا به مشکلات گوارشی مانند زخم معده و سابقه خون‌ریزی گوارشی با احتیاط مصرف شود. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه حساسیتی به هر یک از اجزای فراورده، بالابودن میزان آهن خون و اختلال در متابولیسم آهن، از مصرف این فراورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض ناشی از مصرف فراورده‌های حاوی آهن به طور کلی شامل عوارض گوارشی از قبیل درد شکمی، بیوست، اسهال، تهوع و استفراغ، نفخ، تیره‌شدن مدفوع و ناراحتی معده می‌باشد که در این فراورده به خاطر فرمولاسیون ویژه آن این عوارض به حداقل رسیده است. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند (لووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین‌ها، داکسی سایکلین)، بیس فسفونات‌ها مانند (آلندرونیت و یا ریزدرونیت)، لووتیروکسین، پنی‌سیلامین و داروهای ضد صرع مانند فنی‌توئین و لوودوپا به دلیل کاهش جذب این داروها خودداری نمایید. از مصرف همزمان با داروی کلستیرامین به سبب احتمال کاهش جذب مواد موثر این فراورده خودداری نمایید. توصیه می‌شود ۲ ساعت قبل و ۲ ساعت بعد از مصرف داروهای ضد اسید معده و مواد غذایی مثل چای، قهوه، لبنیات، اسفناج و سویا و سایر مکمل‌های منیزیم و کلسیم خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ای ۴۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ای به صورت دی ال - آلفاتوکوفریل استات	۴۰۰ واحد


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، روغن دانه سویا.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌ای مورد نیاز بدن و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ یا ۲ عدد کپسول به همراه غذا ترجیحا با کامل‌ترین وعده غذای روزانه میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو این فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. در صورت ابتلا به بیماری‌های عروقی، دیابت، اختلالات انعقادی خون، بیماری‌های کبدی و کلیوی، چربی خون بالا، سابقه خون‌ریزی‌های گوارشی و جراحی اخیر این فراورده زیر نظر پزشک مصرف شود. حداقل یک ماه قبل از جراحی مصرف این فراورده قطع گردد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با نظر پزشک متخصص و در صورت کمبود ویتامین ای در بدن مادر توصیه می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت دارا بودن سابقه حساسیت به مشتقات ویتامین ای یا سایر اجزا تشکیل دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود. در برخی موارد ممکن است عوارضی مثل تهوع، اسهال، دل‌پیچه، احساس خستگی، سرگیجه، تاری دید و سردرد بروز پیدا کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف فراورده قطع گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد و ضدپلاکت مثل وارفارین، آسپیرین و هپارین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک، داروهای مهارکننده انتخابی برداشت سروتونین مثل فلوکستین، سیتالوپرام و سرترالین، داروهای گیاهی حاوی سیر و جینکو به دلیل افزایش ریسک خونریزی و اثرات ضد انعقادی با احتیاط صورت گیرد. به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین ای مصرف آن با کلستیرامین و اورلیستات خودداری کرده و این فراورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات استفاده کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ای ۱۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ای به صورت دی ال - آلفاتوکوفریل استات	۱۰۰ واحد


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، روغن دانه سویا و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ای مورد نیاز بدن و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ یا ۲ عدد کپسول به همراه غذا ترجیحا با کامل‌ترین وعده غذای روزانه میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو این فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. در صورت ابتلا به بیماری‌های عروقی، دیابت، اختلالات انعقادی خون، بیماری‌های کبدی و کلیوی، چربی خون بالا، سابقه خون‌ریزی‌های گوارشی و جراحی اخیر این فراورده زیر نظر پزشک مصرف شود. حداقل یک ماه قبل از جراحی مصرف این فراورده قطع گردد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با نظر پزشک متخصص و در صورت کمبود ویتامین ای در بدن مادر توصیه می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت دارا بودن سابقه حساسیت به مشتقات ویتامین ای یا سایر اجزا تشکیل دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود. در برخی موارد ممکن است عوارضی مثل تهوع، اسهال، دل‌پیچه، احساس خستگی، سرگیجه، تاری دید و سردرد بروز پیدا کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف فراورده قطع گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد و ضدپلاکت مثل وارفارین، آسپیرین و هپارین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک، داروهای مهارکننده انتخابی برداشت سروتونین مثل فلوکستین، سیتالوپرام و سرترالین، داروهای گیاهی حاوی سیر و جینکو به دلیل افزایش ریسک خونریزی و اثرات ضد انعقادی با احتیاط صورت گیرد. به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین ای مصرف آن با کلستیرامین و اورلیستات خودداری کرده و این فراورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات استفاده کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ای ۲۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد سافت ژل در ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ای به صورت دی ال - آلفاتوکوفریل استات	۲۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، روغن دانه سویا و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ای مورد نیاز بدن و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ یا ۲ عدد کپسول به همراه غذا ترجیحا با کامل‌ترین وعده غذای روزانه میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو این فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. در صورت ابتلا به بیماری‌های عروقی، دیابت، اختلالات انعقادی خون، بیماری‌های کبدی و کلیوی، چربی خون بالا، سابقه خون‌ریزی‌های گوارشی و جراحی اخیر این فراورده زیر نظر پزشک مصرف شود. حداقل یک ماه قبل از جراحی مصرف این فراورده قطع گردد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با نظر پزشک متخصص و در صورت کمبود ویتامین ای در بدن مادر توصیه می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت دارا بودن سابقه حساسیت به مشتقات ویتامین ای یا سایر اجزا تشکیل دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود. در برخی موارد ممکن است عوارضی مثل تهوع، اسهال، دل‌پیچه، احساس خستگی، سرگیجه، تاری دید و سردرد بروز پیدا کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف فراورده قطع گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد و ضدپلاکت مثل وارفارین، آسپیرین و هپارین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک، داروهای مهارکننده انتخابی برداشت سروتونین مثل فلوکستین، سیتالوپرام و سرترالین، داروهای گیاهی حاوی سیر و جینکو به دلیل افزایش ریسک خونریزی و اثرات ضد انعقادی با احتیاط صورت گیرد. به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین ای مصرف آن با کلستیرامین و اورلیستات خودداری کرده و این فراورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات استفاده کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ب۱۲- ۵۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: ۶۰ عـدد سـافت ژل در ۴ بلیسـتر ۱۵ عـددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ب۱۲	۵۰۰ میکروگرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** روغـن دانـه سـویا، ژلاتیـن، گلیسـرین، لسـیتین، بیزواکـس، تیتانیـوم دی‌اکسـید و رنـگ
- **رده سنی:** -
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن ویتامیـن ب۱۲ مـورد نیـاز بـدن، کمـک بـه سـاخت گلبـول قرمـز و فعالیـت سیسـتم اعصـاب
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه یـک عـدد کپسـول بـه همـراه یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان و یـا پیشـگیری از بیمـاری نمـی باشـد. - در صـورت ابتـلا بـه هـر گونـه بیمـاری یـا مصـرف دارو ایـن فـراورده زیـر نظـر پزشـک یـا داروسـاز مصـرف شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** پیـش از مصـرف ایـن فـراورده در دوران بـارداری یـا شـیردهی بـا پزشـک مشـورت نماییـد.
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صـورت داشـتن سـابقه واکنش‌هـای حساسـیتی بـه هـر یـک از اجـزا تشـکیل دهنـده ایـن فـراورده از مصـرف آن خـودداری نماییـد.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** مصـرف ایـن فـراورده در مقادیـر توصیـه شـده اغلـب سـبب عـوارض جانبـی نمی‌شـود ولـی در صـورت بـروز و ادامـه یافتـن هرگونـه عـوارض جانبـی یـا بـروز واکنش‌هـای حساسـیتی مصـرف ایـن فـراورده را قطـع نماییـد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** در صـورت مصـرف اتفاقـی بیـش از مقادیـر توصیـه شـده سـریعا بـه پزشـک و یـا مراکـز درمانـی مراجعـه نماییـد.
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای کمتـر از ۳۰ درجه سـانتیگراد و دور از نـور و رطوبـت و دور از دسـترس کـودکان نگهـداری نماییـد.



- **نام فرآورده: ویتامین ب۱۲- ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد سافت ژل در ۴ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ب۱۲	۱۰۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن دانه سویا، ژلاتین، گلیسرین، لسیتین، بیزواکس، تیتانیوم دی‌اکسید و رنگ.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ب۱۲ مورد نیاز بدن، کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول به همراه یک لیوان آب میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف دارو این فراورده زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب عوارض جانبی نمی‌شود ولی در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عوارض جانبی یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ث + زینک**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ث	۵۰۰ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، پلی وینیل پیرولیدون، سوکرالوز، پلی اتیلن گلیکول، ساخارین، بتا-کاروتن، طعم و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به سلامت پوست، مو و ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت مصرف هر نوع دارو قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه عوارض گوارشی، این فراورده را پس از غذا میل نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف طولانی‌مدت فراورده‌های حاوی روی سبب کاهش میزان مس در بدن می‌شود، لذا از مصرف طولانی مدت بدون توصیه پزشک خودداری نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این فراورده از مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای پوکی استخوان، مکمل‌های حاوی آهن و کلسیم و برخی نوشیدنی‌ها مثل چای و قهوه خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری و پس از مصرف درپوش ظرف را ببندید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ث + زینک**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ث	۱۰۰۰ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، پلی وینیل پیرولیدون، سوکرالوز، پلی اتیلن گلیکول، ساخارین، بتا-کاروتن، طعم و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان، کمک به سلامت پوست، مو و ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت مصرف هر نوع دارو قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه عوارض گوارشی، این فراورده را پس از غذا میل نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف طولانی‌مدت فراورده‌های حاوی روی سبب کاهش میزان مس در بدن می‌شود، لذا از مصرف طولانی مدت بدون توصیه پزشک خودداری نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** توصیه می‌شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این فراورده از مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای پوکی استخوان، مکمل‌های حاوی آهن و کلسیم و برخی نوشیدنی‌ها مثل چای و قهوه خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری و پس از مصرف درپوش ظرف را ببندید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین ث**
- **نام تجاری/ برند: سنترووویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان در یک قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
ویتامین ث	۵۰۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم بی‌کربنات، سوربیتول، سوکرالوز، ساخارین، پلی اتیلن گلیکول، پلی وینیل پیرولیدون، لوسین، رنگ و طعم
- **رده سنی:** از مصرف این فراورده در افراد کمتر از ۹ سال خودداری نمایید.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین ث و سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را در یک لیوان آب حل کرده و پس از انحلال کامل مصرف کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت مصرف هر نوع دارو زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود. در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیوی و افراد دارای سابقه ابتلا به سنگ‌های کلیوی (اگزالاتی) با احتیاط مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت مصرف هر نوع دارو و در دوران بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک از اجزا تشکیل دهنده از مصرف این فراورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری و پس از مصرف درپوش ظرف را ببندید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳ ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد سافت ژل در ۴ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل
ویتامین د۳ به صورت کوله کلسیفرول	۱۰۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** روغن دانه سویا، ژلاتین، گلیسرین و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با وعده غذایی میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف این فراورده در افراد مبتلا به هایپرکلسمی (بالابودن میزان کلسیم خون) توصیه نمی‌شود. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک اجزای تشکیل‌دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما در صورت مصرف مقادیر بیش از میزان توصیه شده ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، یبوست و یا اسهال، ضعف، گیجی و کاهش وزن بدن بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین د از مصرف همزمان با داروهای اورلیستات و کلستیرامین خودداری نموده و یا در صورت لزوم این فراورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات مصرف نمایید. مصرف همزمان ویتامین د با املاح کلسیم، دیگوکسین و هیدروکلروتیازید می‌بایست با احتیاط صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- **نام فرآورده: ویتامین د۳ ۲۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: سنترو‌ویت®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی ثنامد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی ثنامد**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد سافت ژل در ۴ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل
ویتامین د۳ به صورت کوله کلسیفرول	۲۰۰۰ واحد

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** روغن دانه سویا، ژلاتین، گلیسرین و رنگ
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با وعده غذایی میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فراورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مصرف این فراورده در افراد مبتلا به هایپرکلسمی (بالابودن میزان کلسیم خون) توصیه نمی‌شود. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن سابقه واکنش‌های حساسیتی به هر یک اجزای تشکیل‌دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی‌شود اما در صورت مصرف مقادیر بیش از میزان توصیه شده ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، یبوست و یا اسهال، ضعف، گیجی و کاهش وزن بدن بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هرگونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش‌های حساسیتی مصرف این فراورده را قطع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین د از مصرف همزمان با داروهای اورلیستات و کلستیرامین خودداری نموده و یا در صورت لزوم این فراورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اورلیستات مصرف نمایید. مصرف همزمان ویتامین د با املاح کلسیم، دیگوکسین و هیدروکلروتیازید می‌بایست با احتیاط صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرکت داروسازی حکیـمان طب کار





- نام فرآورده: ژل رویال پلاس مولتی ویتامین (jelly royal plus multivitamin)
- نام تجاری/ برند: ژل رویال پلاس مولتی ویتامین (jelly royal plus multivitamin)
- شـرکت صاحب پروانه: شـرکت داروسـازی حکیمان طـب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت داروسازی هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت‌های ۲۰۰ میلی‌لیتر
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر سافت ژل	
Vitamin C	۴۰ mg	۵۰
Vitamin E (۱۵ IU)	۵ mg	۴۲
Zinc	۵ mg	۵۰
Niacin	۵ mg	۳۱
Vitamin A (۱۵۰۰ IU)	۴۰۰ mcg	۵۰
Pantothenic acid	۳ mg	۵۰
Vitamin B۶	۰/۶ mg	۴۳
Vitamin D۳ (۶۰۰IU)	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin B۱	۰/۶ mg	۵۵
Vitamin B۱۲	۱/۲۵ mcg	۵۰
Vitamin B۲	۰/۷ mg	۵۰
Vitamin K۱	۲۰ mcg	۲۷
Folic acid	۱۴۰ mcg	۷۰
Biotin	۱۵۰ mcg	۳۰
Royall jelly	۱۵۰ mg	
Honey	۱۲۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** فسفاتیدیل کولین ،کنسانتره آب پرتقال، زانتان گام، اسانس پرتقال، پتاسیم سوربات، سیتریک اسید، پلی سوربات
- **رده سنی:** کودکان ۴ سال به بالا، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی در کودکان و بزرگسالان و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ تا ۱۰ سال روزانه ۵ میلی‌لیتر و بزرگسالان، روزانه ۱۰ میلی‌لیتر
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
قبل از مصرف تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل بوده وجهت تشخیص درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
در کودکان پایین تر از ۲ سال و افراد دارای حساسیت و آلرژی به ژل رویال مصرف این فرآورده توصیه نمی‌شود.
مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک انجام پذیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیش از مصرف این فراورده در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در کودکان پایین‌تر از ۲ سال و افراد دارای حساسیت و آلرژی به ژل رویال مصرف این فرآورده توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در کودکان پایین تر از ۲ سال و افراد دارای حساسیت و آلرژی به ژل رویال مصرف این فرآورده توصیه نمی‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** طبق توصیه پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان ۴ تا ۱۰سال روزانه ۵ میلی‌لیتر و بزرگسالان، روزانه ۱۰ میلی‌لیتر
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعا به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.
پس از بازکردن این فرآورده حتما در یخچال نگهداری شود و طی مدت ۳۰ روز مصرف گردد.





- **نام فرآورده:** کپسول زینک پلاس یورورویتال (Zinc Plus)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول زینک پلاس یورورویتال (Zinc Plus)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** کارخانه داروسازی دانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول سافت ژل در بلیسترهای ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل	
Zinc (as Gluconate)	۵mg	۵۰
Vitamin B۱	۱/۳mg	۱۱۸
Vitamin B۲	۱/۵mg	۱۰۷
Vitamin B۶	۱/۶mg	۱۱۴
Vitamin B۱۲	۳µg	۱۲۰
Biotin	۶۰µg	۱۲۰
Folic acid	۲۰۰µg	۱۰۰
Vitamin B۳	۹mg	۵۸
Vitamin B۵	۶mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن دانه سویا، لیستین, روغن نارگیل, ژلاتین، گلایسرین، سوربیتول، تیتانیوم دی اکساید، آهن، آب، روغن نارگیل هیدروژن افزایی شده
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، سلامت سیستم ایمنی و تامین ویتامین‌های B
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با مقدار کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی
در بدن , ۲ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول با مقدار کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیروفلوکساسین, به علت کاهش میزان جذب روی در بدن, ۲ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کپسول زینک پلاس- پابا و ب کمپلکس یورووایتال (Zinc Plus PABA and B-Komplex)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول زینک پلاس- پابا و ب کمپلکس یورووایتال (Zinc Plus PABA and B-Komplex)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** کارخانه داروسازی هگمتان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول سافت ژل در بیلیسترهای ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل	
Zinc	۱۵ mg	۱۵۰
Pantothenic acid	۵۰ mg	۸۳۳
Niacin	۳۰ mg	۱۸۸
Vitamin B۶	۱۰ mcg	۷۱۴
Vitamin B۱	30mg	۲۷۲۷
Folic acid	400 µg	۲۰۰
Biotin	450 µg	۹۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
PABA	۳۰ mg	


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک، متیل سلولز، ساکارز، هایپرملوز، ایزوپروپیل الکل
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت پوست و مو ناخن، کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان آب کافی میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
این فرآورده صرفا مکمل بوده جهت تشخیص درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی, مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
این فرآورد صرفا مکمل بوده جهت تشخیص درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان آب کافی میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن, ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه ,در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص زینک پلاس-پابا یورورویتال (Zinc Plus PABA)**
- **نام تجاری/ برند: قرص زینک پلاس-پابا یورورویتال (Zinc Plus PABA)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول سافت ژل در بیلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت ژل	
Zinc	۱۵mg	۱۵۰
Pantothenic acid	۹/۵mg	۱۵۸
Niacin	۹/۵mg	۵۹
Vitamin B۶	۱/۷mg	۱۵۵
Vitamin B۲	1.6mg	۱۱۴
Vitamin B۱	1.5mg	۱۳۶
Vitamin B۱۲	3µg	۱۲۰
Folic acid	۲۱۰ µg	۱۰۵
Biotin	۲۰۰ µg	۴۰۰
Vitamin C	۱۰۰mg	۱۲۵
PABA	۵۰mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تیتانیوم دی اکساید، کلسیم فسفات، تیتانیوم دی اکساید، سوربیتول، هایپرملوز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سیلیکون دی اکساید ,پیرودکسین، هیدروکسی پروپیل متیل
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت پوست و مو ناخن، کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا همراه غذا میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورد صرفا مکمل بوده جهت تشخیص درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش در میزان جذب روی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی, مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف آنتی بیوتیک هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین،به علت کاهش در میزان جذب روی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان آب کافی میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن, ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه ,در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- نام فرآورده: Lutein & A-Z multivitamin plus Q۱۰
- نام تجاری/ برند: Lutein & A-Z multivitamin plus Q۱۰
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول سافت ژل در بلیسترهای ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۲۶۶۶ IU)	۸۰۰ µg	۱۰۰
Vitamin E	۱۲mg	۱۰۰
Vitamin C	۱۲۰mg	۱۵۰
Vitamin K	۳۰ µg	۴۰
Vitamin B۱	۲/۱mg	۱۹۱
Vitamin B۲	۲/۴mg	۱۷۱
Vitamin B۶	۳ mg	۲۱۴
Vitamin B۱۲	۳ µg	۱۲۰
Vitamin D (۲۰۰IU)	۵ µg	۱۰۰
Biotin	۱۵۰ µg	۳۰۰
Folic acid	۳۰۰ µg	۱۵۰
Niacin	۱۸mg	۱۱۳
Pantothenic acid	۶mg	۱۰۰
Calcium	۲۰۰mg	۲۵
phosphorus	۱۵۵mg	۲۲
Magnesium	۱۰۰mg	۲۷
Iron	۵mg	۳۶
Iodine	۱۰۰ µg	۶۷
Copper	۱mg	۱۰۰
Manganese	۱mg	۵۰
Chromium	۶۰ µg	۱۵۰
Molybdenum	۸۰ µg	۱۶۰
Selenium	۲۵ µg	۴۵
Zinc	۵mg	۵۰
Coenzyme	۲mg	
Lutein	۲mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز میکرو کریستالی، روغن هسته انگور، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک منیزیم اسیدهای چرب، تیتانیوم دی اکسید، تالک، پلی اتیلن گلیکول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با آب ترجیحا همراه غذا میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
قبل از مصرف تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با آب ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.





- نام فرآورده: A-Z +۵۰ مولتی ویتامین (A-Z multivitamin +۵۰)
- نـام تجاری/ برنـد: A-Z +۵۰ مولتـی ویتامیـن (A-Z multivitamin +۵۰)
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: ۶۰ عـدد کپسـول سـافت ژل در بیلیسـترهای ۱۵ عـددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر کپسول	%NRV
Vitamin B1	۱۴ mg	۱۲۷۳
Vitamin B2	۴ mg	۲۸۶
Niacin	۳۰ mg NE	۱۸۸
(Pantothenic acid(Vitamin B۶	۶ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱۰ mg	۷۱۴
Vitamin B۱۲	۵ mg	۲۰۰
Folic acid	۴۰۰ mcg	۲۰۰
Vitamin C	۶۰ mg	۷۵
Vitamin D (۶۰۰ IU)	۱۵ mcg	۳۰۰
Vitamin E	۱۵ mg alfa-TE	۱۲۵
Biotin	۵۰ mcg	۱۰۰
(Chromium (as chloride	۷۵ mcg	۱۸۸
(Copper (as cupric gluconate	۱ mg	۱۰۰
(Iron (as ferrous fumarate	۱۰ mg	۷۱
(Calcium(as phosphate	۲۴۷ mg	۳۱
(Magnesium(as oxide	۶۰ mg	۱۶
(Manganese(as sorbate	۰/۵ mg	۲۵
(Molybdenum(as sodium molybdate	۵۰ mcg	۱۰۰
(Selenium(as sodium selenate	۱۲۰ mcg	۲۱۸
(Zinc (as axide	۱۵ mg	۱۵۰
Alpha lipoic acid	۲۰ mg	
Lutein	۲ mg	

جز	مقدار در هر کپسول	%NRV
Citrus extract with buiflavonoids	۱۰ mg	
Coenzyme Q۱۰	۲۰ mg	
Green tea extract	۲۰ mg	
Natural mixed carotenoids	۲ mg	
(Choline(as bitartrate	۱۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هایپرومولوز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، تیتانیوم دی اکساید، نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، سیلیکون دی اکساید، تالک، گلیسرین، فریک اکسید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن، مناسب برای خانم‌های بالای ۵۰ سال
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران شیردهی و بارداری مطابق دستور پزشک ویا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت وجود سابقه‌ی حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.





- **نام فرآورده:** plus B1
- **نام تجاری/ برند:** plus B1
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار	%NRV
Vitamin B1	۱۰۰ mg	۹۰۹۱
Vitamin B2	۴/۸ mg	۳۴۳
Vitamin B6	۶ mg	۴۲۹
Vitamin B12	۳ mcg	۱۲۰
Biotin	450 mcg	۹۰۰
Folic acid	400 mcg	۲۰۰
Niacin	30 mg	۱۸۸
Pantothenic acid	5 mg	۸۳
Inositol	۵۰ mg	
PABA	۴۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** تالک، شکر، هایپرواملوز، ایزوپروپیل الکل، اتیل سلولز، ژلاتین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت عملکرد سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا همراه غذا میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف همزمان با داروهای دیورتیک با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف همزمان با داروهای دیورتیک با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه ,در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فلکس اورت ®(flax-A-VERT®)**
- **نام تجاری/ برند: فلکس اورت ®(flax-A-VERT®)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص به صورت بیلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار	٪NRV
Vitamin D۳	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۴۰ mg α-TE	۳۳۴
folic acid	۴۰۰ mcg	۲۰۰
Vitamin B۱۲	۲۰ mcg	۸۰۰
Vitamin C	60 mg	۷۶
Copper	1 mg	۱۰۰۰
Manganese	4 mg	۲۰۰
Selenium	120 mcg	۲۱۸
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Collagen hydrolysate	۳۰۰ mg	
Ginseng extract	۸۰ mg	
Chondroitin sulphate	۱۰۰mg	
Glucosamine	۱۰۰۰mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید, کراس کارمولوز سدیم, سلولز میکروکریستال, منیزیم استئارات, هایپروملوز, تیتانیوم دی اکساید, تالک، گلایسرین، کارناباوکس
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده صرفا مکمل تغذیه‌ای بوده جهت تشخیص پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف نماید.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه, در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کلاژن (kollagen)
- **نام تجاری/ برند:** کلاژن (kollagen)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** کارخانه داروسازی هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص	٪NRV
Collagen hydrolysate	۱۰۰۰ mg	
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نمک‌های اسید چرب منیزیم، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سیلیکون دی اکسید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، آسکوربیک اسید, تیتانیوم دی اکساید, تالک, کلسیم فسفات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به کلاژن‌سازی طبیعی پوست و بافت پیوندی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب و ترجیحا همراه غذا میل شود.

از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** کلاژن در مصرف درمانی به صورت خوراکی تا دوز ۱۰ گرم در روز، برای مدت ۵ ماه ایمن محسوب می‌گردد.

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود .

در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری وشیردهی توصیه نمی‌گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل‌دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل‌دهنده از مصرف آن خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** کلاژن در مصرف درمانی به صورت خوراکی تا دوز ۱۰ گرم در روز، برای مدت ۵ ماه ایمن محسوب می‌گردد.

در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل‌دهنده از مصرف آن خودداری شود.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب و ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** کلاژن در مصرف درمانی به صورت خوراکی تا دوز ۱۰ گرم در روز، برای مدت ۵ ماه ایمن محسوب می‌گردد.

در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده از مصرف آن خودداری شود.

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه, در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ال کارنیتین ۱۰۰۰ (L-carnitin۱۰۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: ال کارنیتین۱۰۰۰ (L-carnitin۱۰۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص به صورت بیلیسترهای ۱۵ تایی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
L-carnitin ۱۰۰۰	۱۰۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم کربنات، میکروکریستال سلولز، پلی وینیل پیرولیدین، سدیم کربوکسی متیل سلولز و نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، سلولز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به متابولیسم چربی‌ها در بدن, کمک به افزایش قوای جنسی و کمک به تقویت عملکرد سیستم قلب و عروقی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فراورده در افراد دارای سابقه تشنج و مبتلا به کم‌کاری تیروئید توصیه نمی‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف این فراورده در افراد دارای سابقه تشنج و مبتلا به کم کاری تیروئید توصیه نمی شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه, در جای خشک و دوراز نور و از دسترس کودکان، نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ال-گلوتامین یورورویتال (L-glutamine)**
- **نام تجاری/ برند: ال-گلوتامین یورورویتال (L-glutamine)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: پودر مکمل ورزشی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
L-glutamine	۵g

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به ذخیره‌سازی گلیکوژن در عضلات، افزایش سرعت ریکاوری و بازسازی عضلات پس از تمرین، تاخیر در احساس خستگی ورزشکاران از طریق کمک به حذف آمونیوم، افزایش حجم عضلات و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** میزان یک پیمانی (۵ گرم) از گلوتامین با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب یا آبمیوه مخلوط میل نمایید
برای حصول نتیجه‌ی بهتر، یک وعده بعد از تمرین و یک وعده قبل از خواب مصرف گردد. از افزایش مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک و یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از افزایش مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.

- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** میزان یک پیمانی (۵گرم) از گلوتامین با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب یا آبمیوه مخلوط میل نمایید.
برای حصول نتیجه‌ی بهتر، یک وعده بعد از تمرین و یک وعده قبل از خواب مصرف گردد. از افزایش مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان یک پیمانی (۵گرم) از گلوتامین با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب یا آبمیوه مخلوط میل نمایید.
برای حصول نتیجه‌ی بهتر، یک وعده بعد از تمرین و یک وعده قبل از خواب مصرف گردد. از افزایش مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه دور از نور آفتاب و دور از دسترس کودکان باشد.



- نام فرآورده: منتال انرژی® (Mental Energie®)
- نام تجاری/ برند: منتال انرژی® (Mental Energie®)
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: ۶۰ عـدد قـرص در ۴ بلیسـتر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار	٪NRV
Vitamin D (۲۰۰ IU)	۵ mcg	۱۰۰
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰
Vitamin B۱	۲/۲ mg	۲۰۰
Vitamin B۲	۲/۸ mg	۲۰۰
Niacin	۳۲ mg	۲۰۰
Pantothenic acid	۱۲ mg	۲۰۰
Vitamin B۶	۲/۸ mg	۲۰۰
Folic acid	۴۰۰ mcg	۲۰۰
Vitamin B۱۲	۵ mcg	۲۰۰
Biotin	۱۰۰ mcg	۲۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Magnesium	۳۰۰ mg	۸۰
Iron	۷ mg	۵۰
Copper	۱ mg	۱۰۰
Iodin	۱۵۰ mcg	۲۰۰
Manganese	۱ mg	۱۰۰
Selenium	۵۵ mcg	۱۰۰
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Calcium	۳۸۲ mg	۴۸
Coenzyme Q۱۰	۵ mg	
Ginseng extract	۵۰ mg	
Ginkgo biloba	۵۰ mg	
Guarana extract		
(mg caffein ۱۰/۵ with)	۱۰۵ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم کربنات، منیزیم اکسید، میکروکریستالین سلولز، روغن دانه کلزا، نمک‌های اسید چرب منیزیم، کلسیم فسفات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیتانیوم دی اکسید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، فروس فورمارات، گلوکونات منگنز، اکسید روی، سیلیکون دی اکسید، گلوکونات مس، پلی اتیلن گیلکول، تالک، پتاسیم یدید، تالک، کارنابا وکس
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت قدرت ذهنی، تقویت حافظه و عملکرد سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد .
در افراد مبتلا به دیابت مصرف این فرآورده با نظر پزشک انجام پذیرد.
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد انعقاد خون مانند: وارفارین, آسپرین و دیکلوفناک توصیه نمی‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** دردوران، بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.
- **موارد منع مصرف:** دردوران، بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.
در افراد مبتلا به دیابت مصرف این فرآورده با نظر پزشک انجام پذیرد.
مصرف این فراورده همزمان با داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین، آسپیرین و دیکلوفناک توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده همزمان با داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین، آسپیرین و دیکلوفناک توصیه نمی‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف این فراورده همزمان با داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین، آسپیرین و دیکلوفناک توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد در جای خشک دور از نور و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.





- **نام فرآورده:** Multi vitamin eff
- **نام تجاری/ برند:** Multi vitamin eff
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص	%NRV
Vitamin A	۲۶۶۷ IU	۱۰۰
Vitamin B1	۱/۴ mg	۱۲۷
Vitamin B2	۱/۶ mg	۱۱۴
Vitamin B3	۱۴ mg	۸۸
Vitamin B5	۶ mg	۱۰۰
Vitamin B6	۲ mg	۱۴۳
Folic acid	۲۰۰ µg	۱۰۰
Vitamin B12	۱ µg	۴۰
Vitamin C	۷۵ mg	۹۴
Vitamin D3	۴۰۰ IU	۲۰۰
Vitamin E	۱۰ mg	۸۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم بیکربنات، لاکتاز مونوهیدرات، ال لایزین، آب، سوکرالوز، سیتریک اسید، پلی وینیل پیرو لیدون
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص جوشان در یک لیوان آب (۲۰۰ میلی‌لیتر) حل و سپس میل گردد.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک و یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص جوشان در یک لیوان آب (۲۰۰ میلی‌لیتر) حل و سپس میل گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه دور از نور آفتاب و دور از دسترس کودکان باشد.



- **نام فرآورده:** Max ۳-Omega
- **نام تجاری/ برند:** Max ۳-Omega
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس** Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص	٪NRV
Fish oil Cod liver oil	۴/۵۲ g ۴/۵۲ g	
۳ Total omega Fatty acid Together Providing: EPA DHA	۲۸۸۰ mg ۱۲۴۰ mg ۱۰۹۰ mg	
(IU ۸۳۳) Vitamin A	۲۵۰ mcg	۳۱
(IU ۴۰۰) Vitamin D	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۱۰ mg	۸۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** روغن کبد ماهی، اسانس پرتقال، سوکرالوز، اسانس لیمو
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت قلب و عروق و سلامت عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو قاشق مرباخوری (۱۰ سی سی) میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف این فرآورده همراه با داروهای ضد انعقاد خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروی ضد انعقاد با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو قاشق مرباخوری (۱۰ سی سی) میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف این فرآورده همراه با داروهای ضد انعقاد خودداری کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.
پس از بازشدن در یخچال نگهداری شود و در مدت زمان یک ماه مصرف گردد.
قبل از هر بار مصرف تکان دهید.



- **نام فرآورده:** امگا ۳ پلاس زینک کیدز Omega-۳ plus zink kids
- **نام تجاری/ برند:** امگا ۳ پلاس زینک کیدز Omega-۳ plus zink kids
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** شربت ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر	%NRV
Omega۳- fatty acids Providing: EPA DHA	۴۵۵mg ۲۸۸ mg ۱۷۵ mg	
Zinc	۳mg	۳۰
Vitamin B۶	۱ mg	۷۱
Vitamin D۳	۱۰mcg	۲۰۰
Vitamin C	۱۲mg	۱۵
Vitamin E	۳mg	۲۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن کبد ماهی، اسانس پرتقال، سوکرالوز، پتاسیم سوربات
- **رده سنی:** کودکان بالای ۴ سال، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت رشد ذهنی و جسمی کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان، نوجوانان و بزرگسالان روزانه یک قاشق غذاخوری (۵ سی سی) میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف هم زمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌ها از خانواده تتراسیکلین خودداری شود.
ترجیحا مصرف آن ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف هم زمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌ها از خانواده تتراسیکلین خودداری شود.
ترجیحا مصرف آن ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروی ضد انعقاد با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان، نوجوانان و بزرگسالان روزانه یک قاشق غذا خوری (۵ سی سی) میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف هم زمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌ها از خانواده تتراسیکلین خودداری شود.
ترجیحا مصرف آن ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.
پس از باز شدن در یخچال نگهداری شود و تا ۳ ماه قابل استفاده است.
قبل از مصرف تکان دهید.



- **نام فرآورده: قرص ویتامین B12 یورووویتال**
- **نام تجاری/ برند: قرص ویتامین B12 یورووویتال**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بیلسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر	%NRV
B12	۵۰۰ µg	۲۰/۰۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هایپرملوز، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین B12 مورد نیاز بدن، ساخت گلبول‌های قرمز، تقویت عملکرد سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروی ضد انعقاد با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور و دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- نام فرآورده: آرژی پلاس (ArgiPlus)
- نام تجاری/ برند: آرژی پلاس (ArgiPlus)
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت‌های ۲۰۰ میلی‌لیتری
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

Children from 10-4 years

اجزا در هر ۵ سی سی برای ۴ تا ۱۰ سال	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۳۴۰ IU)	۲۰۰ mcg	۲۵
Vitamin B۲	۰/۸ mg	۵۷
Vitamin K	5mcg	۳۳
Vitamin D۳ (۴۰۰ IU)	10 mcg	۲۰۰
Zinc	3 mg	۳۰
L-arginine	200 mg	
Vitamin C	20mg	
Calcium (as calcium carbonate)	120mg	۱۵
Iodine (as potassium iodine)	7mcg	۴۷

Children from the age of 11 years

اجزا در هر ۱۰ سی سی برای بالای ۱۱ سال	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۶۸۰ IU)	۴۰۰ mcg	۵۰
Vitamin B۲	۱/۶ mg	۱۱۴
Vitamin K	50 mcg	۶۶
Vitamin D۳ (۴۰۰ IU)	20 mcg	۴۰۰
Zinc	6 mg	۶۰
Calcium	240 mg	۳۰
Iodine	140 mcg	۹۳
L-arginine	400 mg	
Vitamin C	40 mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، سدیم فسفات، گلیسرول، پلی سوربات ۸۰، سدیم کربوکسی متیل سلولز، اسانس پرتقال، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، سوکرالوز، سدیم ادتا، پتاسیم سوربات

پ- **رده سنی:** کودکان ۴ تا ۱۰ سال، نوجوانان و بزرگسالان

- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی و رشد
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ تا ۱۰ سال روزانه ۵ میلی‌لیتر (یک بار در روز)

کودکان ۱۰ سال به بالا و بزرگسالان روزانه ۵ میلی‌لیتر (دو بار در روز)

- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک از خانواده تتراسایکلین خودداری شود. ترجیحا مصرف این آنتی‌بیوتیک ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد این فرآورده باشد.

در صورت مصرف داروی کاهنده فشار خون با احتیاط و توصیه پزشک انجام گیرد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک از خانواده تتراسایکلین خودداری شود. ترجیحا مصرف این آنتی بیوتیک ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد این فرآورده باشد.

در صورت مصرف داروی کاهنده فشار خون با احتیاط و توصیه پزشک انجام گیرد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف هم زمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک از خانواده تتراسایکلین خودداری شود. ترجیحا مصرف این آنتی بیوتیک ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد این فرآورده باشد.

در صورت مصرف داروی کاهنده فشار خون با احتیاط و توصیه پزشک انجام گیرد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان ۴ تا ۱۰ سال روزانه ۵ میلی‌لیتر (یک بار در روز)

کودکان ۱۰ سال به بالا و بزرگسالان روزانه ۵ میلی‌لیتر (دو بار در روز)

- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک از خانواده تتراسایکلین خودداری شود. ترجیحا مصرف این آنتی بیوتیک ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد این فرآورده باشد.

در صورت مصرف داروی کاهنده فشار خون با احتیاط و توصیه پزشک انجام گیرد.

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود. پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و حداکثر تا ۳۰ روز قابل مصرف است.





- **نام فرآورده: آرژی زینک پلاس یورورویتال (ArgiZincPlus)**
- **نام تجاری/ برند: آرژی زینک پلاس یورورویتال (ArgiZincPlus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دانا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ کپسول سافت ژل به صورت بیلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Calcium	۶۲/۵mg	۱۶
Vitamin D۳(۴۰۰ IU)	10 mcg	۲۰۰
Zinc	5 mg	۵۰
L-arginine	125 mcg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، روغن دانه سویا، کلسیم کربنات، ال-آرژنین هیدروکلراید، گلیسرول، سوربیتول، لسیتین سویا، موم زنبور عسل، تیتانیوم دی اکسید، سیلیکون دی اکسید، رنگ آلوورا قرمز، اکسید و هیدروکسید آهن
- **رده سنی:** کودکان, نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به بهبود رشد استخوان‌ها در کودکان و نوجوانان و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۶ تا ۱۲ سال روزانه ۱ عدد کپسول و کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان روزانه ۲ عدد کپسول ترجیحا همراه غذا و با آب کافی میل شود.
از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف هم زمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین خودداری شود و ترجیحا مصرف آن دو ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک و دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین خودداری شود و ترجیحا مصرف آن دو ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروی ضد انعقاد با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان۶ تا ۱۲ سال روزانه ۱ عدد کپسول و کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان روزانه ۲ عدد کپسول ترجیحا همراه غذا و با آب کافی میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف داروهای کاهنده ی فشار خون مصرف این فرآورده با احتیاط و توصیه‌ی پزشک انجام گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استئوپلاس یورورویتال (osteplus)
- **نام تجاری/ برند:** استئوپلاس یورورویتال (osteplus)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۴۵ قرص به صورت بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Vitamin D	25 mcg (1000 IU)	۵۰۰
Calcium	800 mg	۱۰۰
Copper	1 mg	۱۰۰
Magnesium	150 mg	۴۰
Manganese	0.5 mg	۲۵
Selenium	50 mcg	۹۱
Zinc	15 mg	۱۵۰
Glucosamine sulfate	750 mg	
Chondroitin sulfate	300 mg	
Ginger extract	75 mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، روغن کلزا، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم، تیتانیوم دی اکساید، زینک اکساید، سیلیکون دی اکساید، تالک، پلی اتیلین گلیکول، گلوکونات مس، هایپرملوز، بیزوکس
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت و استحکام استخوان، عملکرد طبیعی عضلات و مفاصل و کمک به ترمیم بافت همبند.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت استفاده در افراد مبتلا به دیابت قند خون مرتبا چک شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز باشد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت استفاده در افراد مبتلا به دیابت قند خون مرتبا چک شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت استفاده در افراد مبتلا به دیابت قند خون مرتبا چک شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و در جای خشک دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود



- **نام فرآورده: استئوجوس® (OsteoJuice®)**
- **نام تجاری/ برند: استئوجوس® (OsteoJuice®)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت‌های ۲۰۰ میلی‌لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر ۷/۵ میلی لیتر	مقدار	٪NRV
Calcium	۲۵۰mg	۱۲۵
Magnesium	50 mg	۵۳
Zinc	4.5 mg	۱۸۰
Vitamin D (۶۰۰ I.U.)	10 mcg	۸۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، کلسیم کربنات، ساکارز، سوربیتول، بنزوئیک اسید، زانتان گام، اسانس پرتقال، آسه سولفام پتاسیم، اسانس نعناع، سوکرالوز و ساخارین, پلی سوربات, ساکارز اکتااستات
- **رده سنی:** کودکان ۲ تا ۱۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۲ تا ۱۲ سال روزانه ۱۰ میلی‌لیتر (۲ قاشق مرباخوری)
نوجوانان و بزرگسالان روزانه ۱۵ میلی‌لیتر (۳قاشق مرباخوری)
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا مدت ۳۰ روز قابل استفاده می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران شیردهی و بارداری زیر نظر پزشک و یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا مدت ۳۰ روز قابل استفاده می‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** بزرگسالان روزانه دو عدد قرص با آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان ۲ تا ۱۲ سال روزانه ۱۰ میلی‌لیتر (۲ قاشق مرباخوری)
نوجوانان و بزرگسالان روزانه ۱۵ میلی‌لیتر (۳قاشق مرباخوری)
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا مدت ۳۰ روز قابل استفاده می‌باشد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان،نور نگهداری شود
پس از بازشدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا مدت ۳۰ روز قابل استفاده می‌باشد.



- **نام فرآورده: قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ (L-arginin۱۰۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ (L-arginin۱۰۰۰)**
- **شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: ۶۰ عـدد قـرص بـه صـورت بلیسـرهای ۱۵ عـددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
L-arginin	۱۰۰۰ mg	

- **اجـزای غیرفعال فـرآورده (اکسـیپیانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، سـدیم کربوکسـی متیـل سـلولز و نمک‌هـای منیزیـم اسـید چـرب پلـی ونیـل پیرولیـدون، کـراس کارملـوز سـدیم، تالـک,
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج شـده در فـرآورده:** کمـک بـه عضله‌سـازی و افزایـش کارایـی بـدن در ورزشـکاران، بهبـود جریـان خـون در عـروق، تقویـت سیسـتم عصبـی و تقویـت قـوای جنسـی
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه یـک عـدد قـرص بـا میـزان کافـی آب میـل شـود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه و دور از دسـترس کـودکان، نـور نگهـداری شـود



- **نام فرآورده: قرص ال-تریپتوفان پلاس ویتامین B۳ و B۶ یورویتال (B۳ & L-tryptophan plus B۶)**
- **نام تجاری/ برند: قرص ال-تریپتوفان پلاس ویتامین B۳ و B۶ یورویتال (B۳ & L-tryptophan plus B۶)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Niacin (vitamin B۳)	۵ mg	۳۱
Vitamin B۶	۶/۱ mg	۴۳۶
L-tryptophan	۵۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات، نمک‌های منیزیم اسید چرب، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، نیکوتین آمید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ آرامش و ایجاد خواب راحت، کاهش استرس و اضطراب، کمک به درمان افسردگی و بهبود خلق و خو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه غذا با میزان کافی آب میل شود بهترین زمان مصرف این فرآورده عصر می‌باشد.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در بیماران تحت درمان با داروهای سداتیو یا خواب‌آور و همچنین داروهای ضد افسردگی توصیه نمی‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف این فرآورده در بیماران تحت درمان با با داروهای سداتیو یا خواب‌آور و همچنین داروهای ضد افسردگی توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف این فرآورده در بیماران تحت درمان با داروهای سداتیو یا خواب‌آور و همچنین داروهای ضد افسردگی توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه غذا با میزان کافی آب میل شود. بهترین زمان مصرف این فرآورده عصر می‌باشد.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف این فرآورده در بیماران تحت درمان با داروهای سداتیو یا خواب‌آور و همچنین داروهای ضد افسردگی توصیه نمی‌شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود



- **نام فرآورده: کپسول امگا ۳ (caps ۳-omega)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول امگا ۳ (caps ۳-omega)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ کپسول سافت ژل به صورت بلیسترهای ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	٪NRV
Omega۳- fatty acid Providing: DHA (docosahexaenoic acid) EPA (Eicosapentaenoic acid)	۵۰۰ mg ۲۵۰ mg ۱۸۱ mg	
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، گلیسرول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت قلب و عروق
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان کافی آب میل گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان کافی آب میل گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود



- **نام فرآورده:** قرص جوشان انرژی یورورویتال (Energy power booster)
- **نام تجاری/ برند:** قرص جوشان انرژی یورورویتال (Energy power booster)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان (Effervescent)
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Taurine	۱۰۰۰ mg	
Caffein	۵۰ mg	
Glucuronolactone	۶ mg	
Pantothenic acid	۵/۷ mg	۹۵
Vitamin B۲	۰/۷ mg	۵۰
Vitamin B۶	۱/۸ mg	۱۲۹
Vitamin B۱۲	۳ mcg	۱۲۰
Niacin	۹/۱ mg	۵۷

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم بی کربنات, لاکتاز مونوهیدرات، سوکرالوز، اسید سیتریک، کراس پویدون، کارموزین، ال لوسین اسانس پرتقال
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به افزایش توان جسمی و کاهش خستگی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک قرص جوشان داخل ۲۰۰میلی‌لیتر آب حل و میل گردد.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی، دیابت گلوکوما، پوکی استخوان و در صورت مصرف داروهای خاص، مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
در دوران بارداری و شیردهی با توصیه‌ی پزشک و یا دکتر داروساز صورت گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با توصیه‌ی پزشک و یا دکتر داروساز صورت گردد.
- **موارد منع مصرف:** در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی، دیابت گلوکوما، پوکی استخوان و در صورت مصرف داروهای خاص، مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی، دیابت گلوکوما، پوکی استخوان و در صورت مصرف داروهای خاص، مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی، دیابت گلوکوما، پوکی استخوان و در صورت
مصرف داروهای خاص، مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک قرص جوشان داخل ۲۰۰ میلی‌لیتر آب حل و میل گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی, دیابت گلوکوما، پوکی استخوان و در صورت مصرف داروهای خاص، مصرف این فرآورده با توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود



- **نام فرآورده: کپسول اوژن (AugenKapseln)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول اوژن (AugenKapseln)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ کپسول سافت ژل به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Lutein	۱۰mg	
Vitamin C	۱۰۰ mg	۱۲۵
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰
Zinc	۵ mg	۵۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin A	۸۰۰ mcg (۲۶۶۶ IU)	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، ساکاروز، تالک، هیدروکسی پلی متیل سلولز، آسکوربیک اسید، ریبوفلاوین، هیدروکسی پرومتیل، پلی ونیل پیرولیدون
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت سیستم بینایی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه غذا و با آب فراوان یا مطابق دستور پزشک میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه غذا و آب فراوان یا مطابق دستور پزشک میل شود .
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص آیزن پلاس (Eisen Plus)**
- **نام تجاری/ برند: قرص آیزن پلاس (Eisen Plus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Iron	۲۰ mg	۱۴۳
Vitamin C	۱۹۰ mg	۲۳۸
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
vitamin B۶	۵/۷ mg	۴۰۷
Vitamin B۱۲	۳ mcg	۱۲۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نمک‌های اسید چرب منیزیم، نشاسته ذرت، سیلیکون دی اکسید، پلی اتیلن گلیکول، اکسید آهن و هیدروکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به خون‌سازی، پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک،یا داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت وجود سابقه حساسیت به لوتئین از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان،نور نگهداری شود




- نام فرآورده: شربت آیزن سافت یورویتال (EisenSaft eurovital)
- نام تجاری/ برند: شربت آیزن سافت یورویتال (EisenSaft eurovital)
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتری
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر ۲/۵ سی سی (برای بچه های ۲ تا ۸ سال)	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۱۲ mg	۱۵
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۰/۷ mg	۵۰
Niacin	۵ mg NE	۳۱/۳
Pantothenic acid	۱ mg	۱۶/۵
Vitamin B۶	۲ mg	۱۴۳
Vitamin B۱۲	۲/۵ mcg	۱۰۰
Folic acid	۱۵۰ mcg	۷۵
Iron	۷ mg	۵۰
Iodine	۳۰ mcg	۲۰
Zinc	۱/۵ mg	۱۵

اجزا در هر ۲/۵ سی سی (مقادیر در هر ۵ سی سی برای کودکان بالای ۸ سال، نوجوانان و بزرگسالان)	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۲۴ mg	۳۰
Vitamin B۱	۲/۲ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Niacin	۱۰ mg NE	۶۲/۵
Pantothenic acid	۲ mg	۳۳
Vitamin B۶	۴ mg	۲۸۶
Vitamin B۱۲	۵ mcg	۲۰۰
Folic acid	۳۰۰ mcg	۱۵۰

اجزا در هر ۲/۵ سی سی (مقادیر در هر ۵ سی سی برای کودکان بالای ۸ سال، نوجوانان و بزرگسالان)	مقدار	٪NRV
Iron	۱۴ mg	۱۰۰
Iodine	۶۰ mcg	۴۰
Zinc	۳ mg	۳۰
Copper**	۲۰۰ mcg	۲۰
Manganese	۳۰۰ mcg	۱۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، گلوکز، صمغ عربی، طعم دهنده، پتاسیم سوربات، آسه سولفات پتاسیم، سوکرالوز، ساخارین، زانتان گام، کارامل، سیترات اسید مونوهیدرات، سدیم بنزوئات
- **رده سنی:** کودکان ۲ تا ۸ سال
بالای ۸ سال
نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به خونسازی و پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و تامین انرژی، کاهش خستگی موثر است.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۲ تا ۸ سال: ۲/۵cc
بالای ۸ سال و نوجوانان و بزرگسالان: 5cc
قبل از مصرف تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان ۲ تا ۸ سال: ۲/۵cc
کودکان ۲ تا ۸ سال: ۲/۵cc
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.
پس از بازشدن فرآورده به مدت سه ماه داخل یخچال نگهداری شود.





- نام فرآورده: شربت ایموفیل®(immuphyle®)
- نام تجاری/ برند: شربت ایموفیل®(immuphyle®)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتری
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر ۵ میلی‌لیتر (سن بالای ۴ سال و نوجوانان)	مقدار	٪NRV
Vitamin D (۴۰۰ IU)	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin A	۲۵۰ mcg	۳۱
Vitamin B۱	۰/۸ mg	۷۳
Vitamin B۶	۰/۸ mg	۵۷
Niacin	۱۰ mg	۶۳
Biotin	۱۵ mcg	۳۰
Pantothenic acid	۳ mg	۵۰
Iron	۸ mg	۵۷
Zinc	۵ mg	۵۰
Manganese	۱ mg	۵۰
Copper	۰/۶ mg	۶۰
Selenium	۲۰ mcg	۳۶
Iodine	۵۰ mcg	۳۳
Chromium	۸ mcg	۲۰
Choline	۱۰ mg	
L-carnitine	۵ mg	

اجزا در هر ۵ میلی‌لیتر (سن بالای ۱۱ سال، نوجوانان و بزرگسالان)	مقدار	%NRV
Vitamin D (۸۰۰ IU)	۲۰ mcg	۴۰۰
Vitamin A	۵۰۰ mcg	۶۳
Vitamin B۱	۱/۶ mg	۱۴۵
Vitamin B۶	۱/۶mg	۱۱۴
Niacin	۲۰ mg	۱۲۵
Biotin	۳۰ mcg	۶۰
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Iron	۱۶ mg	۱۱۴
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Copper	۱/۲ mg	۱۲۰
Selenium	۴۰ mcg	۷۲
Iodine	۱۰۰ mcg	۶۶
Chromium	۱۶ mcg	۴۰
Choline	۲۰ mg	
L-carnitine	۱۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، سوربیتول، منیزیم سیترات، گلیسرول، پلی سوربات ۸۰، زانتان گام، پتاسیم سوربات، بنزوات پتاسیم، سوکرالوز، اسانس پرتقال، ساخارین سدیم
- **رده سنی:** کودکان ۴ سال به بالا
بالای ۸ سال
نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:**
کمک به تقویت سیستم ایمنی و سلامت عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ سال به بالا و نوجوانان روزانه ۵ میلی‌لیتر
و بزرگسالان روزانه ۱۰ میلی‌لیتر
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به علت کاهش در جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل و یا ۴ الی ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده باشد
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به علت کاهش در جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل و یا ۴ الی ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان ۴ سال به بالا و نوجوانان روزانه ۵ میلی‌لیتر
و بزرگسالان روزانه ۱۰ میلی‌لیتر
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.
پس از باز کردن درب بطری، فرآورده داخل یخچال نگهداری و تا یک ماه قابل استفاده می‌باشد.



- **نام فرآورده:** کپسول ایمون پلاس (immune plus)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول ایمون پلاس (immune plus)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ کپسول پلت به صورت ۴ بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۳۵۰ mg	۴۳۷
Zinc	۱۵ mg	۱۵۰
Selenium	۵۵ mcg	۱۰۰
Vitamin D (۸۰۰ IU)	۲۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، ژلاتین، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، اتیل سلولز، ساخارین، پلی وینیل پیرولیدین، تالک، پروپیلن گلیکول، سدیم سلنات، پروپیل پارابن، ایزوپروپیل الکل
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** آنتی اکسیدان و کمک به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک‌هایی نظیر تتراسایکلین‌ها و سیپرو فلوکساسین، به علت کاهش در جذب روی و دارو جلوگیری شود و فاصله زمانی ۴ تا ۶ ساعت در نظر گرفته شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک‌هایی نظیر تتراسایکلین‌ها و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش در جذب روی و دارو جلوگیری شود و فاصله زمانی ۴ تا ۶ ساعت در نظر گرفته شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویال ب ۱۲ پلاس (B ۱۲ plus)**
- **نام تجاری/ برند: ویال ب ۱۲ پلاس (B ۱۲ plus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶ ویال خوراکی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin B۱۲	۵۰۰mcg	۲۰۰۰۰
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پتاسیم سوربات، سوکرالوز، پیریدوکسین، سدیم بنزوئات، زانتان گام، تری سدیم سیترات دی هیدرات، اسید سیتریک، گلایسرین، سوربیتول، لیمونن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین انرژی، کمک به تامین ویتامین B۱۲ مورد نیاز بدن و کمک به ساخت گلبول‌های قرمز خون
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد ویال از محلول خوراکی را به تنهایی و یا پس از حل کردن در آب یا آب‌میوه میل نمایید.
این فرآورده فقط جهت مصرف خوراکی و غیرقابل تزریق می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف همزمان این فرآورده با متفورمین و داروهای مهارکننده اسید معده مانند امپرازول و لانزوپرازول به علت کاهش میزان جذب ویتامین B۱۲ با احتیاط صورت گیرد.
این فرآورده فقط جهت مصرف خوراکی و غیرقابل تزریق می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق توصیه پزشک صورت گیرد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فرآورده با متفورمین و داروهای مهارکننده اسید معده مانند امپرازول و لانزوپرازول
لانزوپرازول به علت کاهش میزان جذب ویتامین B۱۲ با احتیاط صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد ویال از محلول خوراکی را به تنهایی و یا پس از حل کردن در آب یا آب‌میوه میل نمایید.
این فرآورده فقط جهت مصرف خوراکی و غیرقابل تزریق می‌باشد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص بی سی ای یورو ویتال (Eurho Vital BCAA)**
- **نام تجاری/ برند: قرص بی سی ای یورو ویتال (Eurho Vital BCAA)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۰ عدد قرص در قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin B۶	۱/۷ mg	۱۲۱
L-leucine	۳۲۰۰ mg	
L-isoleucine	۳۲۰mg	
L-valine	۳۲۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** والین، آب، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم، میکروکریستال سلولز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین اسیدهای آمینه شاخه‌دار و پیشگیری از تحلیل عضلانی ورزشکاران
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه ۸ عدد قرص با مقدار کافی آب، ترجیحا قبل از فعالیت ورزشی میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
در افراد دارای سابقه تشنج و صرع توصیه نمی‌شود.
از مصرف همزمان این دارو با لوودوپا خودداری نمایید.
در صورت مصرف داروی کاهنده قند خون مصرف این مکمل تحت نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در افراد دارای سابقه تشنج و صرع توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این دارو با لوودوپا خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه ۸ عدد قرص با مقدار کافی آب، ترجیحا قبل از فعالیت ورزشی میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در افراد دارای سابقه تشنج و صرع توصیه نمی‌شود.
از مصرف همزمان این دارو با لوودوپا خودداری نمایید.
در صورت مصرف داروی کاهنده قند خون مصرف این مکمل تحت نظر پزشک توصیه می‌شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص بیوپانتن یورورویتال (Biopanthene)
- **نام تجاری/ برند:** قرص بیوپانتن یورورویتال (Biopanthene)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Biotin	۵۰۰۰ mcg	۱۸۰۰
Pantothenic acid	۱۰۰ mg	۴۱۷

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هایپرملوز، پلی وینیل پیرولیدون، سدیم استارچ گلیکولات، کربوکسی متیل سلولز و نمک‌های اسید چرب، سلولز میکروکریستال، کلسیم فسفات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک قرص با آب کافی و ترجیحا همراه با غذا میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و طبق توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک قرص با آب کافی و ترجیحا همراه با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص بیوتین یورورویتال (biotin)**
- **نام تجاری/ برند: قرص بیوتین یورورویتال (biotin)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص در ۲ بلیستر ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Biotin	۲۵۰۰ mcg	۱۰۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدین، کربوکسی متیل استارچ، سدیم و اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم، هایپرملوز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با مقدار کافی آب ترجیحا همراه غذا میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و طبق توصیه‌ی پزشک صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک قرص با آب کافی و ترجیحا همراه با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد صرع و تشنج خودداری شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- نام فرآورده: پرفکت بیوتی (perfect beauty)
- نام تجاری/ برند: پرفکت بیوتی (perfect beauty)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص در بلیسترهای ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر دو قرص	مقدار	٪NRV
Vitamin D	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Niacin	۱۶ mg	۱۰۰
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۶ mg	۴۲۹
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Vitamin B۱۲	۹ mcg	۳۶۰
Biotin	۱۵۰ mcg	۳۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Copper	۱ mg	۱۰۰
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Selenium	۱۰۰ mcg	۱۸۲
Chromium	۵۰ mcg	۱۲۵
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Silicon	۵۰ mg	
Blackcurrant seed oil	۵۰ mg	
Coenzyme Q۱۰	۳۰ mg	
Hydrolysed marine collogen (Colyss)	۱۵ mg	
Grape seed extract	۲۰ mg	

اجزا در هر دو قرص	مقدار	%NRV
Green tea extract	۲۰ mg	
Lycopene	۱۰ mg ۰/۵ mg	
Pink bark extract	۸ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، فسفات کلسیم، سیلیکون دی اکساید، کارناباوکس، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، تیتانیوم دی اکسید، پلی اتیلن گلیکول، تالک، لایکوپن، هایپرملوز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به کلاژن‌سازی طبیعی پوست و بافت پیوندی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به علت کاهش در میزان جذب روی در بدن،۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به علت کاهش در میزان جذب روی در بدن،۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و سیپرو فلوکساسین به علت کاهش در میزان جذب روی در بدن،۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.





- نام فرآورده: پرینا مکس نیومام® (PrenaMax New Mum®)
- نام تجاری/ برند: پرینا مکس نیومام® (PrenaMax New Mum®)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۴۵ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر دو قرص	مقدار	٪NRV
Vitamin B1	۸ mg	۷۲۷
Vitamin B2	۴ mg	۲۸۶
Vitamin B6	۸ mg	۵۷۱
Vitamin B12	۲۰ mcg	۸۰۰
Niacin	۱۸ mg	۱۱۳
Pantothenic acid	۴۰ mg	۶۶۷
folic acid	۶۰۰ mcg	۳۰۰
Biotin	۱۵۰ mcg	۳۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Vitamin D (۶۰۰ IU)	۱۵ mcg	۳۰۰
Vitamin E	۴۰ mg	۳۳۳
Vitamin A (۴۰۰۰ IU)	۱۲۰۰ mcg	۱۵۰
Calcium	۴۰۰ mg	۵۰
Chromium	۴۰ mcg	۱۰۰
Copper	۱ mg	۱۰۰
Iodine	۱۵۰ mcg	۱۰۰
Iron	۱۷ mg	۱۲۱
Magnesium	۷۵ mg	۲۰
Manganese	۰/۵ mg	۲۵
Selenium	۱۰۰ mcg	۱۸۲
Zinc	۱۵ mg	۱۵۰
Hydrolysed marine collagen	۲۰۰ mg	
Grape seed extract	۱۵ mg	

اجزا در هر دو قرص	مقدار	%NRV
Citrus Bioflavonids	۱۵۰ mg	
Horsetail Extract	۲۰۰ mg	
Coenzyme Q10	۱۰ mg	
Natural Mixed carotenoids	۲ mg	
L-methionine	۳۰ mg	
L-cysteine	۳۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم، سیلیکون دی اکساید، پلی اتیلن گلیکول، تیتانیوم دی اکسید، تالک، کربناوکس، فروس فرمارات، پروتئین وی هیدرولیز، ژلاتین، هایپرملوز، فریک اکساید، کلسیم فسفات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز مادران پس از زایمان، تامین انرژی، کاهش خستگی و کمک به حفظ سلامت پوست و مو ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از حد فرآورده خودداری شود .
این فرآورده دارای اجزای طبیعی مانند: کلاژن (دریایی) عصاره گیاه دم اسب، عصاره هسته انگور می‌باشد و در صورت وجود حساسیت به هریک از اجزای طبیعی از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** این فرآورده دارای اجزای طبیعی مانند: کلاژن (دریایی) عصاره گیاه دم اسب، عصاره هسته انگور می‌باشد و در صورت وجود حساسیت به هریک از اجزای طبیعی از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** این فرآورده دارای اجزای طبیعی مانند: کلاژن (دریایی) عصاره گیاه دم اسب، عصاره هسته انگور می‌باشد و در صورت وجود حساسیت به هریک از این اجزای طبیعی از مصرف این فرآورده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.





- نام فرآورده: قرص پرناتال مولتی ویتامین (prenatal multivitamin)
- نام تجاری/ برند: قرص پرناتال مولتی ویتامین (prenatal multivitamin)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر دو قرص	مقدار	٪NRV
Vitamin A	۵۵۰ mcg	۶۹
Vitamin E	۲۰ mg	۱۶۶
Vitamin C	۱۲۰ mg	۱۵۰
Folic acid	۶۰۰ mcg	۳۰۰
Vitamin B1	۱/۴ mg	۱۲۸
Vitamin B2	۱/۴ mg	۱۲۸
Niacin	۱۸ mg	۱۱۳
Vitamin B6	۵ mg	۳۵۸
Vitamin B12	۲/۶ mg	۱۰۴
Vitamin D (۶۰۰IU)	۱۵ mcg	۳۰۰
Vitamin K	۴۵ mcg	۶۰
Biotin	۳۰ mcg	۶۰
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Calcium	۲۵۰ mg	۳۱
Iodine	۲۲۰ mcg	۱۴۷
Iron	۱۷ mg	۱۲۱
Magnesium	۶۰ mg	۱۶
Copper	۰/۹ mg	۹۰
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Chromium	۳۰ mcg	۷۵
Selenium	۶۰ mcg	۱۰۹
Zinc	۷/۵ mg	۷۵
Molybdenium	۵۰ mcg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم اکساید، لاکتوز مونوهیدرات،پلی وینیل پیرولیدین، فروس فومارات، نمک‌های اسید چرب منیزیم، سیلیکون دی اکساید، کلسیم کربنات، کلسیم فسفات، سدیم سلنات، مولیبدات سدیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌ها و املاح معدنی مورد نیاز بدن در دوران بارداری
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش جذب ویتامین روی در بدن، دوساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فراورده میل شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** کمک به تامین ویتامین‌ها و املاح معدنی مورد نیاز بدن در دوران بارداری
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.





- **نام فرآورده: قرص تگ و نخت (Tag & Nacht)**
- **نام تجاری/ برند: قرص تگ و نخت (Tag & Nacht)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۴۰ قرص به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در قرص روز	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Magnesium	۱۵۰ mg	۴۰
Guarana extract (with ۵ ng caffein)	۵۰ mg	

اجزا در قرص شب	مقدار	٪NRV
Magnesium	۱۵۰ mg	۴۰
Valerian extract	۸۲/۵ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم اکساید،کلسیم کربنات، میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، پلی اتیلن گلیکول، تالک در قرص آبی علاوه بر اجزای فوق ترکیب ایندیگوتین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:**
کمک به تامین انرژی و کاهش خستگی
کمک به بهبود کیفیت خواب شبانه و ایجاد آرامش
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
روزانه یک عدد قرص روز زرد رنگ با میزان کافی آب میل شود
شب‌ها یک عدد قرص شب آبی رنگ با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در افراد مبتلا به دیابت مصرف این فرآورده با نظر پزشک انجام پذیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** منع مصرف دارد.
- **موارد منع مصرف:** در دوران بارداری و شیردهی منع منصرف دارد.
از مصرف همزمان این فرآورده با داروهایی که دارای اثر خواب‌آوردی می‌باشند مانند آلپرازولام و داروهای خانواده بنزودیازپین‌ها خودداری شود.
با توجه به تاثیر خواب آوری این فرآورده در هنگام رانندگی با احتیاط مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهایی که دارای اثر خواب‌آوری می‌باشند، مانند آلپرازولام و داروهای خانواده بنزودیازپین‌ها جلوگیری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص روز زرد رنگ با میزان کافی آب میل شود.
شب‌ها یک عدد قرص شب آبی رنگ با میزان کافی آب میل شود
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- نام فرآورده: کپسول دیافیت یوروویتال (DiaFit EuRhoVital)
- نام تجاری/ برند: کپسول دیافیت یوروویتال (DiaFit EuRhoVital)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت داروسازی دانا
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد کپسول سافت ژل به صورت بلیسترهای ۱۰ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۲۰۰۰ IU)	۶۰۰ µg	۷۵
Vitamin D	۱۰ µg	۱۰۰
Vitamin E (۴۵ IU)	۲۰ mg	۲۵۰
Vitamin C	۶۰ mg	۱۵۰
Vitamin B۱	۹/۳ mg	۳۱۹
Vitamin B۲	۵ mg	۳۵۷
Niacin	۳۵ mg	۲۱۹
Vitamin B۶	۱۰ mg	۴۲۸
Folic acid	۴۰۰ µg	۲۰۰
Vitamin B۱۲	۳ µg	۱۰
Pantothenic acid	۱۰ mg	۱۶۶
Biotin	۲۰۰ µg	۴۰۰
Iron	۸ mg	۵۷
Magnesium	۱۰۰ mg	۲۷
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Chromium	۱۵۰ µg	۸۷
Selenium	۵۵ µg	۹۱
Copper	۱ mg	۵۰
Manganese	۲ mg	۵۰

اجزا	مقدار	٪NRV
Iodine	۱۰۰ µg	۶۶
L-Carnitine	۵۰ mg	-
Alpha lipoic Acid	۵۰ mg	-
Lutein	۲ mg	-

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** روغـن دانـه سـویا، ژلاتیـن گاوی، گلیسـرول، لسـیتین سـویا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج شـده در فـرآورده:** کمـک بـه سـلامت عمومـی بـدن و کمـک بـه تامیـن مـواد مغـذی مـورد نیـاز و مناسـب بـرای افـراد مبتـلا بـه دیابـت
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد کپسـول همـراه آب، ترجیحـا همـراه غـذا میـل شـود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابـق دسـتور پزشـک یـا داروسـاز مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه در جـای خشـک و دور از دسـترس کـودکان و نـور نگهـداری شـود.





- **نام فرآورده:** کپسول رویال بیوتی (Royal beauty)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول رویال بیوتی (Royal beauty)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی دانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ کپسول بیلیسترهای ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰
Evening promise oil	۲۵۰ mg	
Lyophilized royal jelly(equivalent to ۳۰۰ mg fresh royal jelly)	۱۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرین، فلاور اویل، فسفاتیدیل سرین، تیتانیوم دی اکساید، اکسید آهن، بیزوکس
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و کمک به ساخت کلاژن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه ۲ کپسول همراه با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف بیش ازمیزان توصیه شده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فراورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه ۲ کپسول همراه با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش ازمیزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فراورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص جوشان زینک + B کمپلکس (Zinc + B-complex EuRhoVital)
- **نام تجاری/ برند:** قرص جوشان زینک + B کمپلکس (Zinc + B-complex EuRhoVital)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۲۰ عدد قرص جوشان
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۱۲	۲/۵ µg	۱۰۰
Biotin	۵۰ µg	۱۰۰
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Niacin	۱۶ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم هیدروژن کربنات، سوربیتول، سدیم کربنات، اینولین، سدیم سیکلامات، تری کلسیم فسفات، زینک سیترات، مالتودکسترین، ساخارین سدیم، رنگ خوراکی چغندر قرمز.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو، ناخن و تقویت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص جوشان را در آب حل کرده و سپس میل نمایید.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت پس از مصرف این فراورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کپسول زینک پلاس فور تینز یورووویتال (zinc plus for TEENS EuRhoVital)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول زینک پلاس فور تینز یورووویتال (zinc plus for TEENS EuRhoVital)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ کپسول سافت ژل به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Zinc	۵ mg	۵۰
Folic acid	۲۰۰ µg	۱۰۰
Vitamin B۱	۰/۷۵ mg	۶۸
Vitamin B۲	۰/۷۵ mg	۵۴
Vitamin B۳	۶ mg	۳۸
Vitamin B۵	3 mg	۵۰
Vitamin B۶	0.6 mg	۴۳
Vitamin B۱۲	۱ µg	۴۰
Biotin	۲۰ µg	۴۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین گاوی، گلیسرول، لسیتین سویا، زینک سیترات، موم زنبور عسل، تیتانیوم دی اکساید، سوربیتول
- **رده سنی:** کودکان از ۹ سال به بالا
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت رشد در کودکان، نوجوانان، حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۹ سال به بالا و نوجوانان روزانه یک عدد کپسول ترجیحا همراه غذا و با کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف آنتی بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: کپسول زینک پلاس یورورویتال (Zinc Plus)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول زینک پلاس یورورویتال (Zinc Plus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: کارخانه داروسازی دانا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول سافت ژل در بیلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Zinc	۵ mg	۵۰
Vitamin B۱	1.3 mg	۱۱۸
Vitamin B۲	۱/۵ mg	۱۰۷
Vitamin B۶	۱/۶ mg	۱۱۴
Vitamin B۱۲	۳ µg	۱۲۰
Folic acid	200 µg	۱۰۰
Niacin	9 mg	۵۶
Pantothenic acid	6 mg	۱۰۰


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، سلامت سیستم ایمنی و تامین ویتامین‌های گروه B
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با یک لیوان آب کافی میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت پس از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کپسول نرم سلن پلاس یورورویتال
- **نام تجاری/ برند:** کپسول نرم سلن پلاس یورورویتال
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** کارخانه داروسازی دانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۱۲۵ mg	۱۵۶
Selenium	50 mcg	۹۱
Zinc	۸ mg	۸۰
Vitamin E	۴۰ mg (۶۰ IU)	۳۳۳
Vitamin A	400 mcg (1.333IU)	۵۰


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم سلنیت، کلسیم فسفات، سوربیتول، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید، اکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و مو و ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز باشد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی بیوتیک‌ها از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، به علت کاهش در میزان جذب روی در بدن،۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کپسول سی ال ای ۱۰۰۰ (CLA ۱۰۰)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول سی ال ای ۱۰۰۰ (CLA ۱۰۰)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ عدد کپسول سافت ژل بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	٪NRV
Conjugated linoleic acid(CLA)	۱۰۰۰	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، سوربیتول، گلیسرول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به افزایش متابولیسم چربی‌ها و کاهش وزن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** مصرف آن در بیماران دیابتی توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان با داروهای کاهنده فشار خون و داروهای ضد انعقاد خون با احتیاط و طبق دستور پزشک باشد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فرو پلاس (ferro plus)**
- **نام تجاری/ برند: فرو پلاس (ferro plus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ کپسول ژلاتینی سخت به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Iron (as pyrophosphate)	۲۱ mg	۱۰۰
Folic acid	400 mcg	۲۰۰
Vitamin C	۷۰ mg	۸۷
Vitamin D (۲۰۰ IU)	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin B۶	1.7 mg	۱۲۱
Biotin	55 mcg	۱۱۰
Vitamin B۱	1.3 mg	۱۱۸
Vitamin B۲	1.5 mg	۱۰۷
Niacin	17 mg	۱۰۶
Pantothenic acid	6.3 mg	۱۰۵
Vitamin B۱۲	2 mcg	۸۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، میکروکریستالین سلولز، نشاسته ذرت، نمک‌های منیزیم اسید چرب، سیلیکون دی اکسید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، تیتانیوم مونوهیدرات، پروپیلن گلیکول، متیل پارابن، سولفات روی، سیانوکبالامین، کاسیم پنتوتنیک هیدرات، ریبوفلاوین فسفات سدیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به تالاسمی مینور خودداری شود.
با توجه به تاثیر کلسیم در میزان جذب آهن در بدن،توصیه می‌شود مصرف مکمل‌های حاوی آهن و کلسیم در فواصل زمانی مختلف در روز انجام گیرد.
از مصرف همزمان داروهای لوودوپا و لوتیروکسین با مکمل‌های حاوی آهن خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به تالاسمی مینور خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با توجه به تاثیر کلسیم در میزان جذب آهن در بدن، توصیه می‌شود مصرف مکمل‌های حاوی آهن و کلسیم در فواصل زمانی مختلف در روز انجام گیرد.
از مصرف همزمان داروهای لوودوپا و لوتیروکسین با مکمل‌های حاوی آهن خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به تالاسمی مینور خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص فولیک اسید ۸۰۰ (Folsaure ۸۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: قرص فولیک اسید ۸۰۰ (Folsaure ۸۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص به صورت بیلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Folic acid	۸۰۰ mcg	۴۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** کلسیم فسفات، روغن دانه کلزا، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک‌های اسید چرب منیزیم، اکسیدهای آهن، هیدروکسیدها و پتاسیم آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین فولیک اسید مورد نیاز بدن حفظ سلامت سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزان این فرآورده با داروهای ضد صرع مانند فنی توئین، کاربامازپین، والپورات به دلیل کاهش سطح سرمی فولیک اسید خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزان این فرآورده با داروهای ضد صرع مانند فنی توئین، کاربامازپین، والپورات به دلیل کاهش سطح سرمی فولیک اسید خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزان این فرآورده با داروهای ضد صرع مانند فنی توئین، کاربامازپین، والپورات به دلیل کاهش سطح سرمی فولیک اسید خودداری شو د .
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزان این فرآورده با داروهای ضد صرع مانند فنی توئین، کاربامازپین، والپورات به دلیل کاهش سطح سرمی فولیک اسید خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قطره بیبی جویس یورووِیتال® (BabyJuice-Drops®)
- **نام تجاری/ برند:** قطره بیبی جویس یورووِیتال® (BabyJuice-Drops®)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** قطره ۳۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر میلی‌لیتر	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۱۵۰۰ IU)	۴۵۰ mcg	۵۶
Vitamin D (۴۰۰ IU)	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۶ mg	۵۰
Vitamin B۱	۰/۶ mg	۵۵
Vitamin B۲	۰/۷ mg	۵۰
Vitamin B۶	۰/۴ mg	۲۹
Vitamin B۱۲	۱ mcg	۴۰
Pantothenic acid	۱/۸ mg	۳۰
Biotin	۷/۵ mcg	۱۵
Niacin	۴ mg	۲۵
Folic acid	۱۵۰ mcg	۷۵
Vitamin C	۴۰ mg	۵۰
Vitamin K	۱۱ mcg	۱۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب،گلیسرول، پلی سوربات ۸۰، سدیم سیترات، سدیم متابیسولفیت، زانتان گام، اسانس پرتقال، سدیم بنزووات، سوکرالوز
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن در نوزادان و کودکان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قبل از مصرف تکان دهید، روزانه ۱ میلی‌لیتر مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** قبل از مصرف تکان دهید، روزانه ۱ میلی‌لیتر مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.

پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و در طی یک ماه مصرف گردد.



- **نام فرآورده: قطره خوراکی A+D (A+D drops)**
- **نام تجاری/ برند: قطره خوراکی A+D (A+D drops)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شیشه های ۳۰ میلی لیتر ی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر میلی‌لیتر	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۱۵۰۰ IU)	۴۵۰ mcg	۵۶
Vitamin D (۶۰۰ IU)	۱۰mcg	۳۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسرول، پروپیلن گلیکول، پلی سوربات ۸۰، ساکارز، متیل پارابن، اسانس پرتقال، دی سدیم EDTA، سدیم بنزوئات، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سوکرالوز
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین D و A
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان روزانه ۱ میلی لیتر مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه ۱ میلی‌لیتر مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.
پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و در طی یک ماه مصرف گردد.



- **نام فرآورده:** قطره مولتی ویت + آیزن و زینک یورووویتال (MultiVit + Eisen & zink)
- **نام تجاری/ برند:** قطره مولتی ویت + آیزن و زینک یورووویتال (MultiVit + Eisen & zink)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** شربت ۳۰ میلی‌لیتری
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر میلی‌لیتر	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۱۵۰۰ IU)	۴۵۰ mcg	۵۶
Vitamin C	۳۵ mg	۴۴
Vitamin D	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin E	۳/۴ mg	۲۸
Vitamin B1	۰/۵ mg	۴۵
Vitamin B2	۰/۶ mg	۴۳
Niacin	۴ mg	۲۵
Pantothenic avid	۳ mg	۵۰
Vitamin B6	۰/۴ mg	۲۹
Biotin	۱۵ mg	۳۰
Vitamin B12	۲ mcg	۸۰
Zinc	۱/۵ mg	۱۵
Iron	۸ mg	۵۷


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسرول، پلی سوربات ۸۰، سدیم سیترات، زانتان گام، سدیم بنزوات، سدیم ادتا، سوکرالوز، BHA
- **رده سنی:** کودکان از سن ۶ ماه به بالا
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تقویت رشد و تکامل در نوزادان و کودکان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان زیر دو سال: روزانه یک میلی‌لیتر، یا مطابق دستور پزشک مصرف شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان زیر دو سال: روزانه یک میلی‌لیتر، یا مطابق دستور پزشک
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.
پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود و در طی یک ماه مصرف گردد.



- **نام فرآورده:** کپسول ویتامین ب کمپلکس (Vitamin B-complex Kapseln)
- **نام تجاری/ برند:** کپسول ویتامین ب کمپلکس (Vitamin B-complex Kapseln)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی دانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ کپسول ژلاتینی نرم به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	٪NRV
Niacin	۳۱ mg	۱۹۴
Vitamin B۶	۱۰ mg	۷۱۴
Vitamin B۱	۹ mg	۸۱۸
Pantothenic acid	۹ mg	۱۵۰
Vitamin B۲	۹ mg	۶۴۲
Vitamin B۱۲	۹/۰ mcg	۳۶۰
Folic acid	۴۰۰ mcg	۲۰۰
Biotin	۴۰۰ mcg	۸۰۰


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن دانه سویا، گلیسرول، پانتوتنات دی کلسیم، لسیتین سویا، موم زنبور عسل،
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌های گروه B مورد نیاز بدن و سلامت سیستم عصبی
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص کروم + B۳یورورویتال (Chrom + B۳)**
- **نام تجاری/ برند: قرص کروم + B۳یورورویتال (Chrom + B۳)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	%NRV
Chromium	۱۱۰ mcg	۲۷۵
Niacin (Vitamin B۳)	۱۰۰ mg	۶۲۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسیدهای چرب نمک منیزیم، کلسیم فسفات، سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تنظیم سطح گلوکز خون در حد طبیعی، متابولیسم چربی و کربوهیدرات در بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده قند خون، بر اساس توصیه پزشک و یا دکتر داروساز انجام گیرد. در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده قند خون، بر اساس توصیه پزشک و یا دکتر داروساز انجام گیرد. در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده قند خون، بر اساس توصیه پزشک و یا دکتر داروساز انجام گیرد. در افراد مبتلا به نقص عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: کروم۲۰۰ یورورویتال (Chrom ۲۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: کروم۲۰۰ یورورویتال (Chrom ۲۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	%NRV
Chromium	۲۰۰ mcg	۵۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات، نمک‌های اسید چرب منیزیم، سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تنظیم سطح گلوکز خون در حد طبیعی، متابولیسم چربی و کربوهیدرات در بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** کلاژن پلاس ال- لیزین و ویتامین سی (kollagen plus L-Lysin & vitamin C)
- **نام تجاری/ برند:** کلاژن پلاس ال-لیزین و ویتامین سی (kollagen plus L-Lysin & vitamin C)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد قرص به صورت بیلیسترهای ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	%NRV
Vitamin C	۳۰ mg	۳۷/۵
L-lysine	۵۰ mg	
Collagen hydrolysate	۵۰۰ mg	


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، فسفات کلسیم، پلی وینیل پیرولیدین، نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلیکول، سیلیکون دی اکسید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، تالک و تیتانیوم دی اکسید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به کلاژن‌سازی طبیعی در پوست و بافت پیوندی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** کلاژن در مصرف درمانی با فرم خوراکی تا دوز ۱۰ گرم در روز برای مدت ۵ ماه ایمن محسوب می‌گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن امتناع کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده از مصرف آن امتناع کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: کلسیم ۶۰۰ (Calcium ۶۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: کلسیم ۶۰۰ (Calcium ۶۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: به شکل قوطی حاوی ۵۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	%NRV
Calcium	۶۰۰ mg	۷۵
Vitamin D	۱۵ mcg	۳۰۰
Vitamin K۲	۸۰ mcg	۱۰۷
Vitamin E (۷/۵ I.U.)	mg α-TE۵	۴۲

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم کربوکسی متیل سلولز، منیزیم اکسید، میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نشاسته، نمک‌های اسید چرب منیزیم، پرپیلن گلیکول، تالک، تیتانیوم دی اکسید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت دندان‌ها و استحکام استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** کلاژن در مصرف درمانی با فرم خوراکی تا دوز ۱۰ گرم در روز برای مدت ۵ ماه ایمن محسوب می‌گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین، لووتیروکسین، فنی توئین، هیدروکلروتیازید خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین، لووتیروکسین، فنی توئین، هیدروکلروتیازید خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین، لووتیروکسین، فنی توئین، هیدروکلروتیازید خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک های خانواده تتراسایکلین، لووتیروکسین، فنی توئین، هیدروکلروتیازید خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان، نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص کلسیم سیترات (calcium citrate)**
- **نام تجاری/ برند: قرص کلسیم سیترات (calcium citrate)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۴۵ قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر ۴ عدد قرص	مقدار	٪NRV
Calcium	۱۰۰۰ mg	۱۲۵
Magnesium	۱۶۰ mg	۴۳
Zinc	۲۰ mg	۲۰۰
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Copper	۲ mg	۲۰۰
Vitamin D (۲۰۰۰ IU)	۵۰ mcg	۱۰۰۰
Vitamin B۶	۲۰ mg	۱۴۲۹
Boron	۲ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، روغن کلزا، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سیلیکون دی اکسید، سدیم تترابورات، پلی اتیلن گلیکول، زانتان گام، کربناوکس، اسیدهای چرب نمک منیزیم، تیتانیوم سدیم دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو قرص هر بار دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو قرص هر بار دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ادرار آور مثل هیدروکلروتیازید خودداری نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ادرار آور مثل هیدروکلروتیازید خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ادرار آور مثل هیدروکلروتیازید خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ادرار آور مثل هیدروکلروتیازید خودداری نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو قرص هر بار دو عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ادرار آور مثل هیدروکلروتیازید خودداری نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص منواورت ® (Meno-AVERT®)**
- **نام تجاری/ برند: قرص منواورت ® (Meno-AVERT®)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	٪NRV
Calcium	۵۰۰ mg	۶۳
Vitamin D (۱۶۰IU)	۴ mcg	۸۱
Soy isoflavone	۲۵ mg	
Inulin	۱۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، نمک‌های اسید چرب منیزیم، تیتانیوم دی اکسید، تالک، پلی اتیلن گلیکول، ایزوفلاون
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تنظیم هورمون‌های بدن، کمک به علائم یاسئگی، کمک به پیشگیری از پوکی استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص جوشان منیزیم + ویتامین B۶ (magnesium + vitamin B۶)**
- **نام تجاری/ برند: قرص جوشان منیزیم + ویتامین B۶ (magnesium + vitamin B۶)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۲۰ عدد قرص جوشان (Effervescent)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
magnesium	۲۵۰ mg	۶۶/۶
vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم سوکرالوز، سدیم بی کربنات، اسانس لیمو، ال لوسین، سیتریک اسید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت عملکرد عضلات و حفظ سلامت سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص داخل یک لیوان آب حل کرده و سپس میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: منیزیم ۴۰۰ (magnesium ۴۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: منیزیم ۴۰۰ (magnesium ۴۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ عدد ساشه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا (در هر ساشه)	مقدار	٪NRV
Magnesium	۴۰۰ mg	۱۰۷
Vitamin B۶	۶ mg	۴۲۹
Folic acid	۴۰۰ mcg	۲۰۰
Vitamin B۱۲	۳ mcg	۱۲۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول‌ها، اسید سیترات، لاکتوز، نمک‌های منیزیم اسید چرب، اسانس پرتقال، سوکرالوز، سیانوکوبالامین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت عملکرد سیستم عصبی و عضلانی بدن، کمک به کاهش اسپاسم خستگی عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک ساشه مصرف شود، محتوای ساشه را مستقیما روی زبان قرار دهید، بگذارید تا به آرامی حل شود.
لطفا ساشه را از جهت فلش مشخص شده باز کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک ساشه مصرف شود، محتوای ساشه را مستقیما روی زبان قرار دهید، بگذارید تا به آرامی حل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: قرص منیزیم پلاس (magnesium Plus)**
- **نام تجاری/ برند: قرص منیزیم پلاس (magnesium Plus)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ قرص به صورت بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Magnesium	۳۷۵ mg	۱۰۰
Vitamin B1	۳/۳ mg	۳۳۳
Vitamin B2	۴/۲ mg	۳۰۰
Vitamin B6	۱۰ mg	۷۱۴
Vitamin B12	۷/۵ mg	۳۰۰
Biotin	۱۵۰ mcg	۳۰۰
Folic acid	۶۰۰ mcg	۳۰۰
Niacin	۴۸ mg	۳۰۰
Pantothenic acid	۱۵ mg	۲۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم سیترات، منیزیم اکساید، منیزیم بیس گلایسینات، منیزیم لاکتات، میکروکریستالین سلولز، لاکتوز مونوهیدرات، پلی وینیل پیرولیدین، نمک‌های اسید چرب منیزیم، پانتوتنیک اسید، پلی اتیلن گلوکز، پروپولین گلوکز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاس عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با مقدار کافی آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با مقدار کافی آب و ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی از جمله تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین با فاصله زمانی ۲ ساعت قبل یا ۴ تا ۶ ساعت بعد از مصرف این فرآورده صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص منیزیم پلاس آیزن و B۶ (Magnesium plus Eisen & B۶)
- **نام تجاری/ برند:** قرص منیزیم پلاس آیزن و B۶ (Magnesium plus Eisen & B۶)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد قرص به صورت بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	٪NRV
Magnesium	۳۰۰ mg	۸۰
Iron	۱۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتومونوهیدرات، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدین، سدیم کربوکسی متیل سلولز، آهن بیس گلایسینات، نمک‌های اسیدهای چرب، هیدروکسی هیدروکلراید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین انرژی مورد نیاز بدن و کاهش خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با آب کافی و ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به تالاسمی مینور با نظر پزشک صورت گیرد.
از مصرف همزمان این فرآورده و آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به تالاسمی مینور با نظر پزشک صورت گیرد.

از مصرف همزمان این فرآورده و آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده و آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص همراه با آب کافی و ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده و آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- نام فرآورده: مولتی پلاس کیدز (MultiPlus KIDS)
- نام تجاری/ برند: مولتی پلاس کیدز (MultiPlus KIDS)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص جویدنی به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin A (۱۳۳۳ IU)	۴۰۰ mg	۵۰
Vitamin E	۵ mg a-TE	۴۲
Vitamin C	۶۰ mg	۷۵
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Vitamin B۱	۰/۷ mg	۶۴
Vitamin B۲	۰/۸ mg	۵۷
Niacin	۹ mg	۵۶
Vitamin B۶	۰/۸ mg	۵۷
Vitamin B۱۲	۲ mcg	۸۰
Pantothenic acid	۴ mg	۶۷
Biotin	۲۵ mcg	۵۰
Vitamin D (۴۰۰ IU)	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin K	۴۵ mcg	۶۰
Calcium	۱۲۰ mg	۱۵
Magnesium	۶۰ mg	۱۶
Iron	۷ mg	۵۰
Iodine	۷۵ mcg	۵۰
Manganese	۱ mg	۵۰
Copper	۰/۵ mg	۵۰
Chromium	۲۰ mcg	۵۰
Molybdenum	۲۰ mcg	۴۰
Zinc	۵ mg	۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم اکساید، مانیتول، پلی وینیل پیرولیدین، کلسیم فسفات، نمک‌های اسید چرب، سیلیکون دی اکساید، سولفات منگنز، سوکرالوز، پودر پرتقال، سولفات مس، نشاسته ذرت
- **رده سنی:** کودکان بالای ۴ سال
- **موارد مصرف براساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به بهبود رشد جسمی و ذهنی در کودکان و نوجوانان و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** ۴ تا ۱۲ سال: روزانه یک قرص جویدنی ترجیحا با غذا مصرف شود.
نوجوانان از سن ۱۳ سال روزانه دو عدد قرص به صورت جویدنی ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴ تا ۱۲ سال: روزانه یک قرص جویدنی ترجیحا با غذا مصرف شود.
نوجوانان از سن ۱۳ سال روزانه دو عدد قرص به صورت جویدنی ترجیحا با غذا مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.





- نام فرآورده: مولتی ویتامین کامپلیت (Multivitamin complete)
- نام تجاری/ برند: مولتی ویتامین کامپلیت (Multivitamin complete)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب
- شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: قوطی ۳۰ عدد قرص
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا در هر قرص	مقدار	٪NRV
Vitamin A	۸۰۰ mcg / ۲۶۶۶ I.U	۱۰۰
Vitamin B۱	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۶ mg	۱۱۴
Vitamin B۶	۲ mg	۱۴۳
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Niacin	۱۸ mg	۱۱۳
Vitamin B۱۲	۱ mcg	۴۰
Vitamin C	۶۰ mg	۷۵
Vitamin D	۵ mcg/۲۰۰ IU	۱۰۰
Vitamin E	۱۰ mg / ۱۵ IU	۸۳
Biotin	۱۵۰ mcg	۳۰۰
Vitamin K	۳۰ mcg	۴۰
Chromium	۶۰ mcg	۱۵۰
Iron	۵ mg	۳۶
Iodine	۱۰۰ mcg	۶۷
Copper	۱ mg	۱۰۰
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Molybdenum	۸۰ mcg	۱۶۰
Selenium	۳۰ mcg	۵۵
Zinc	۵ mg	۵۰
Calcium	۱۶۲ mg	۲۰
Magnesium	۱۰۰ mg	۲۷
Phosphorus	۱۲۵ mg	۱۸

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، تیتانیوم دی اکسید، پلی اتیلن گلیکول، سانست یلو، کرومیوم کلرید، پتاسیم یدید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن موثر در عملکرد سیستم ایمنی، حفاظت در برابر شرایط استرس اکسیداتیو، سلامت پوست، مو و ناخن می‌باشد. بهبود عملکرد متابولیسم، کاهش خستگی و عملکرد طبیعی تیروئید، قلب موثر است.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف همزمان این فرآورده و آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.





- **نام فرآورده: میناجویس® (MinaJuce)®**
- **نام تجاری/ برند: میناجویس® (MinaJuce)®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: شربت ۲۰۰ میلی‌لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر ۵ سی سی	مقدار	٪NRV
Vitamin D	۱۰ mcg	۲۰۰
Vitamin A	۴۵۰ mcg	۵۶
Vitamin C	۴۰ mg	۵۰
Iron	۱۰ mg	۷۲
Manganese	۰/۳۸ mg	۱۷
Copper	۰/۳۴ mg	۳۴

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** آب، کلسیم لاکتات، کنسانتره آب پرتقال، فریک پیروفسفات میکروانکپسوله شده (نشاسته، فریک پیروفسفات، لسیتین آفتاب‌گردان)، پلی سوربات ۸۰، سدیم بنزوات، صمغ زانتان، آسپارتام، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، ساخارین
- **رده سنی:** کودکان، نوجوانان، بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به خون‌سازی و پیشگیری از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان، نوجوانان، بزرگسالان روزانه ۵ سی‌سی
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با با فرآورده‌های حاوی روی و کلسیم خودداری شود، از مصرف بیش از میزان توصیه شده آهن به علت ایجاد خطر مسمومیت ناشی از آن در کودکان خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با با فرآورده‌های حاوی روی و کلسیم خودداری شود، از مصرف بیش از میزان توصیه شده آهن به علت ایجاد خطر مسمومیت ناشی از آن در کودکان خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف همزمان این فرآورده با با فرآورده‌های حاوی روی و کلسیم خودداری شود، از مصرف بیش از میزان توصیه شده آهن به علت ایجاد خطر مسمومیت ناشی از آن در کودکان خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با با فرآورده‌های حاوی روی و کلسیم خودداری شود، از مصرف بیش از میزان توصیه شده آهن به علت ایجاد خطر مسمومیت ناشی از آن در کودکان خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان، نوجوانان، بزرگسالان روزانه ۵ سی‌سی
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.
پس از بازکردن فرآورده در یخچال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** نرون و اینر روهه (Nerven & Innere Ruhe)
- **نام تجاری/ برند:** نرون و اینر روهه (Nerven & Innere Ruhe)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ عدد کپسول در بلیسترهای ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	%NRV
Vitamin B1	۲ mg	۱۸۱
Vitamin B2	۲ mg	۱۴۲
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Niacin	۱۶ mg	۱۰۰
Vitamin B6	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B12	۲/۵ mcg	۱۰۰
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Biotin	۵۰ mcg	۱۰۰
Lemon balm extract	۴۰ mg	
Valerian extract	۸۲/۵ mg	
Hops extract	۵۰ mg	
Tryptophan	۴۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، بریلینات بلو، سدیم لوریل سولفات، زینک سولفات، پیرودکسین هیدراکساید، لیمون بالم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم اعصاب و آرام بخش
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول یک ساعت قبل از خواب با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف این فرآورده با مکمل‌ها و داروهای دارای خاصیت آرام‌بخش اجتناب گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** منع مصرف دارد.
- **موارد منع مصرف:** در کودکان و نوجوانان منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف این فرآورده با مکمل‌ها و داروهای دارای خاصیت آرام‌بخش اجتناب گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول یک ساعت قبل از خواب با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک مصرف گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف این فرآورده با مکمل‌ها و داروهای دارای خاصیت آرام‌بخش اجتناب گردد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** نوروپلاس (neuroplus)
- **نام تجاری/ برند:** نوروپلاس (neuroplus)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی دانا
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۳۰ کپسول ژلاتینی نرم به صورت بلیسترهای ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Omega ۳ fatty acid	۲ mg	۱۸۱
Providing:	۲ mg	۱۴۲
DHA (docosahexaenoic acid)	۶ mg	۱۰۰
EPA (eicosapentaenoic acid)	۲۵۰ mg	۱۰۰
	۱/۴ mg	۱۰۰
۱۷۹ mg	۲/۵ mcg	۱۰۰
۳۷ mg		۱۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Vitamin E	۱۲ mg a-TE	۱۰۰
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B۱۲	۲/۵ mcg	۱۰۰
Biotin	۵۰ mcg	۱۰۰
Pantothenic acid	۶ mg	۱۰۰
Folic acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Eisen	۱۰ mg	۷۱
Selenium	۵۵ mcg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن سویا، گلیسرول، لسیتین، تیتانیوم دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، اکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به بهبود عملکرد مغزی، ذهنی و شناختی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو عدد کپسول همراه با غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی ماطبق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو عدد کپسول همراه با غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- نام فرآورده: هرتز کپسول (HerzKapsul)
- نام تجاری/ برند: کپسول هرتز کپسول یورووویتال (HerzKapsul)
- شـرکت صاحـب پروانـه: شـرکت حکیمـان طـب کار تحت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH
- تولیدشده در: شرکت داروسازی دانا
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته‌بندی: ۳۰ کپسـول سـافت ژل بـه صـورت بلیسـترهای ۱۰ عـددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

اجزا	مقدار	٪NRV
Omega۳- fatty acids	۲ mg	۱۸۱
Providing:	۲ mg	۱۴۲
DHA (docosahexanoic acid)	۶ mg	۱۰۰
EPA (Eicosapentanoic acid)	۳۰۰ mg	۱۰۰
	۱/۴ mg	۱۰۰
۲۵۰ mg	۲/۵ mcg	۱۰۰
۳۰ mg		۱۰۰
Olive oil	۸۰ mg	۱۰۰
Omega۹- fatty acid	۱۹۴ mg	۱۰۰
۱۲۰ mg		۱۰۰
Vitamin E	۱۲ mg	۱۰۰
Coenzyme Q۱۰	۳ mg	
Vitamin B۱	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B۲	۱/۴ mg	۱۰۰
Niacin	۱۶ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۱/۴ mg	۱۰۰
Folic acid (metafolin)	۴۰۰ mcg	۱۰۰
Vitamin B۱۲	۲/۵ mcg	۱۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Vitamin D ۴۰۰IU	۱۰ mcg	۴۰۰
Magnesium	۳۷۵ mg	۱۰۰
Iron	۸ mg	۸۷
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰
Copper	۱ mg	۱۰۰

اجزا	مقدار	٪NRV
Manganese	۲ mg	۱۰۰
Selenium	۵۵ mcg	۱۰۰
Chromium	۱۰۰ mcg	۲۵۰
Iodine	۱۵۰ mcg	۱۰۰
Natural mixed carotenoids	۴ mg	
Garlic extract	۲۰ mg	
Grape seed extract	۲۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن ماهی، ژلاتین گاوی، گلیسرول، روغن زیتون، آیرون اکساید و هیدروکساید پتاسیم یدید، روغن سویا فسفاتیدیل سرین,
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت قلب و عروق، دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی، کمک به حفظ سلول در برابر استرس و عوامل اکسیداتیو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه دو عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.





- **نام فرآورده: هیالورون سائور پلاس کلاژن و بیوتن ®**
(Hyaluronsaure plus kollagen & bioten)
- **نام تجاری/ برند: هیالورون سائور پلاس کلاژن و بیوتن ®**
(Hyaluronsaure plus kollagen & bioten)
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس**
Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان دارویی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۳۰ کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Vitamin C	۶۰ mg	۷۵
Biotin	۳۰۰ mcg	۶۰۰
Collagen hydrolysate	۲۵۰ mg	
Hyaluronic acid	۵۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هیدروکسی پرو متیل سلولز، سدیم، کلسیم فسفات، نمک‌های اسید چرب منیزیم، اکسید آهن، تیتانیوم دی اکساید، هایپرملوز، هیالورونات سدیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و مو و کلاژن‌سازی طبیعی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک کپسول همراه با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و داروساز شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزی یک کپسول همراه با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین B۲ (vitamin B۲)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین B۲ (vitamin B۲)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان دارویی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Vitamin B۲	۵۰ mg	۱۷۶۶

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، نمک‌های اسید چرب منیزیم، سیلیکون دی اکساید، ریبوفلاوین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به متابولیسم طبیعی، کاهش ضعف و خستگی، تقویت عملکرد سیستم عصبی، کمک به ساخت گلبول قرمز و آنتی‌اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی با توجه به میزان بالای ویتامین B۲ با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد. در افراد با سابقه بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی با توجه به میزان بالای ویتامین B۲ با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در افراد با سابقه بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در افراد با سابقه بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل گردد.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در افراد با سابقه بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی با توجه به میزان بالای ویتامین B۲ با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد.
- **شرایط نگهداری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین B۶ (Vitamin B۶)**
- **نام تجاری/ برند: قرص ویتامین B۶ یورورویتال (Vitamin B۶)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان دارویی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	٪NRV
Vitamin B۶	۴۰ mg	۲۸۵۷


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات، نمک‌های منیزیم اسید چرب، تیتانیوم دی اکساید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تالک، پروپیلن گلیکول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به کاهش تهوع در دوران بارداری و تامین ویتامین B۶ مورد نیاز بدن از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با تئوفیلین و داروهای ضدتشنج مانند والپروئیک اسید، کارمازوپین و فنی‌توئین خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با تئوفیلین و داروهای ضدتشنج مانند والپروئیک اسید، کارمازوپین و فنی‌توئین خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از مصرف همزمان این فرآورده با تئوفیلین و داروهای ضدتشنج مانند والپروئیک اسید، کارمازوپین و فنی توئین خودداری شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورده با تئوفیلین و داروهای ضدتشنج مانند والپروئیک اسید، کارمازوپین و فنی‌توئین خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان آب کافی ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین C + زینک (vitamin C + zinc)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول ویتامین C + زینک یورورویتال (vitamin C + zinc)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان دارویی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول آهسته رهش به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۳۰۰mg	۳/۵
Zinc	۱۰mg	۱۰۰


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** نشاسته ذرت،تالک،ژلاتین ، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز,اسید های چرب نمک منیزیم ,تیتانیوم دی اکساید ,میکرو کریستال سلولز ,تیتانیوم دی اکساید ,سیلیکون دی اکساید ,پروپیل هیدروکسی بنزوئات ,شلاک ,شربت گلوکز ,رنگ مصنوعی زرد
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین D۳ ۱۰۰۰ (Vitamin D۳ ۱۰۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: قرص ویتامین D۳ ۱۰۰۰ یوروویتال (Vitamin D۳ ۱۰۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان دارویی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Vitamin D ۱۰۰۰) ۳ IU)	۲۵ mcg	۵۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستال سلولز، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم، حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده ی چربی خون، کورتیکواستروئیدها (پردنیزولون) و داروهای ضدتشنج (فنی توئین و کاربامازپین) خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کاهنده‌ی چربی خون، کورتیکواستروئدها (پردنیزولون) و داروهای ضدتشنج (فنی توئین و کاربامازوپین) خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این فرآورد با داروهای کاهش دهنده چربی خون، کورتیکواستروئیدها (پردینزولون، و داروهای ضد تشنج (فنی‌توئین و کاربامازپین) خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین E ۴۰۰ یورورویتال (Vitamin E ۴۰۰ I.U)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول ویتامین E ۴۰۰ یورورویتال (Vitamin E ۴۰۰ I.U)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی مینو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	%NRV
Vitamin E (۴۰۰ I.U.)	۲۷۰ mg	۲۲۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، روغن دانه سویا و گلیسرول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین E و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این فرآورده در افرادی داروهای ضد انعقاد خون مانند وافارین مصرف می‌کنند با احتیاط صورت گیرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف این فرآورده در افرادی داروهای ضد انعقاد خون مانند وافارین مصرف می‌کنند با احتیاط صورت گیرد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف این فرآورده در افرادی داروهای ضد انعقاد خون مانند وافارین مصرف می‌کنند با احتیاط صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف این فرآورده در افرادی داروهای ضد انعقاد خون مانند وافارین مصرف می‌کنند با احتیاط صورت گیرد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین A (vitamin A kapseln)**
- **نام تجاری/ برند: کپسول ویتامین A یورووویتال (vitamin A kapseln)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دانا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ کپسول سافت ژل به صورت بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	%NRV
Vitamin A (۲۶۶۶ I.U.)	۸۰۰ mcg RE	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن دانه سویا، ژلاتین گاوی، گلیسرول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین A مورد نیاز بدن و حفظ سلامت پوست و بینایی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت وجود سابقه حساسیت مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** ویتامین ث ۱۰۰۰ (vitamin C ۱۰۰۰)
- **نام تجاری/ برند:** قرص ویتامین ث ۱۰۰۰ دپو یورورویتال (vitamin C ۱۰۰۰)
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH
- **تولیدشده در:** شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** ۶۰ قرص به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Vitamin C	۱۰۰۰ mg	۱۲۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** نمک منیزیم اسیدهای چرب
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** -
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب، ترجیحا با غذا میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.

- **نام فرآورده: ویتامین سی۱۰۰۰ (vitamin C۱۰۰۰)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین سی۱۰۰۰ (vitamin C۱۰۰۰)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت تعاونی قندهای رژیمی پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	٪NRV
Vitamin C	۱۰۰۰ mg	٪۱۲۵۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسانس پرتقال، اسیدهای چرب نمک منیزیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** نحوه مصرف روزانه یک قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و سپس میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در بیماران با سابقه‌ی بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با پزشک و دکتر داروساز مشورت گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در بیماران با سابقه‌ی بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با پزشک و دکتر داروساز مشورت گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در بیماران با سابقه‌ی بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با پزشک و دکتر داروساز مشورت گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** نحوه مصرف روزانه یک قرص جوشان را در یک لیوان آب حل کرده و سپس میل نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین سی (Vitamin C)**
- **نام تجاری/ برند: قرص ویتامین سی ۲۵۰ جویدنی یورووویتال (Vitamin C)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ قرص جویدنی به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
Vitamin C	۲۵۰ mg	۳۱۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، اسیدهای چرب منیزیم، نشاسته ذرت، بتاکاروتن، سوکرالوز
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی و دارای خواص آنتی‌اکسیدانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۳ سال، روزانه یک عدد قرص به صورت جویدنی میل شود.
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مصرف این مکمل در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک و داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** مصرف این مکمل در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این مکمل در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف این مکمل در بیماران با سابقه بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان بالای ۳ سال روزانه یک عدد قرص بصورت جویدنی میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف این مکمل در بیماران با سابقه های کلیوی و سنگ کلیه و دوران بارداری و شیردهی با توصیه پزشک مصرف شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین C + ۱۰ میلی‌گرم روی (Langzeit Vitamin C plus ۱۰ mg Zinc)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین C + ۱۰ میلی‌گرم روی (Langzeit Vitamin C plus ۱۰ mg Zinc)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد کپسول (آهسته رهش) به صورت بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر کپسول	مقدار	%NRV
Vitamin C	۳۰۰ mg	۳۷۵
Zinc	۱۰ mg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، نشاسته ذرت، میکروکریستالین سلولز، ساکارز، شلاک اتیل سلولز، پروپیلن گلیکول، تیتانیوم دی اکسید، متیل هیدروکسی بنزوات، اسید استیک، سیلیکون دی اکسید، سدیم لوریل سولفات، کینولین بلو، تارترازین و پروپیل هیدروکسی بنزوات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.




- **نام فرآورده: ید + اسید فولیک + آهن (Jod + Folsaure + Eisen)**
- **نام تجاری/ برند: ید + اسید فولیک + آهن (Jod + Folsaure + Eisen)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت حکیمان طب کار تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا در هر قرص	مقدار	%NRV
Vitamin B1	۱/۱ mg	۱۰۰
Vitamin B2	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B6	۱/۴ mg	۱۰۰
Vitamin B12	۲/۵ mcg	۱۰۰
Vitamin C	۸۰ mg	۱۰۰
Folic acid	۶۰۰ mcg	۳۰۰
Iron	۱۷ mg	۱۲۱
Iodine	۱۵۰ mcg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدی کربوکسی متیل سلولز، نمک‌های اسید چرب منیزیم، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکسید، پلی اتیلن گلیکول،تالک
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به تامین ید، اسید فولیک و آهن، جهت مصرف در دوران بارداری
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با آب، ترجیحا با وعده غذایی میل شود. از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در بیماران تحت درمان با داروهای ضد پرکاری تیروئید، مانند متی مازول، مدرهای نگهدارنده پتاسیم مانند آمیلورایید و اسپرینولاکتون، مصرف این فرآورده با نظر پزشک توصیه می‌گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** کمک به تامین ید ،فولیک اسید و آهن مناسب جهت مصرف در دوره‌ی بارداری
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در بیماران تحت درمان با داروهای ضد پرکاری تیروئید، مانند متی مازول، مدرهای نگهدارنده پتاسیم مانند آمیلورایید و اسپرینولاکتون، مصرف این فرآورده با نظر پزشک توصیه می‌گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با آب، ترجیحا با وعده غذایی میل شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه در جای خشک و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.

Darou Darman Parmida

شرکت داروسازی دارو درمان پارمیدا





- **نام فرآورده: ال-آرژنین ۱۰۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: ال-آرژنین ۱۰۰۰ میلی‌گرم**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا، تهران، ایران**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
L-Arginine	۱۰۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون، لاکتوز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به عضله‌سازی، تحریک ترشح هورمون رشد، تقویت سیستم ایمنی، کمک به گشادی عروق، افزایش جریان خون، کمک به قوای جنسی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو قرص همراه با آب کافی میل شود یا طبق دستور پزشک مصرف شود. از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت بارداری، شیردهی، ابتلا به بیماری خاص و یا مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز
- **موارد منع مصرف:** مصرف ال آرژنین با داروهای گشادکننده عروق مانند نیتروگلیسیرین توصیه نمی‌شود.در صورت بارداری، شیردهی، ابتلا به بیماری خاص و یا مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمائید.این دارو صرف مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** شایع ترین عوارض جانبی که با مصرف ال-آرژنین دیده می‌شود شامل حساسیت و تشدید علائم آسم، کاهش فشارخون، هیپرکالمی در افراد با نارسایی کلیوی می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه دو قرص همراه با آب کافی میل شود یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود، دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: ال-آرژنین ۱۰۰۰ میلی‌گرم**
- **نام تجاری/ برند: ال-آرژنین ۱۰۰۰ میلی‌گرم**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا، تهران، ایران**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی: ۶۰ عدد قرص داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	%NRV
L-Arginine	۱۰۰۰ mg	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون، لاکتوز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج شده در فرآورده:** کمک به عضله‌سازی، تحریک ترشح هورمون رشد، تقویت سیستم ایمنی، کمک به گشادی عروق، افزایش جریان خون، کمک به قوای جنسی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو قرص همراه با آب کافی میل شود یا طبق دستور پزشک مصرف شود. از مصرف بیش از میزان خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. در صورت بارداری، شیردهی، ابتلا به بیماری خاص و یا مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز
- **موارد منع مصرف:** مصرف ال آرژنین با داروهای گشادکننده عروق مانند نیتروگلیسیرین توصیه نمی شود.در صورت بارداری، شیردهی، ابتلا به بیماری خاص و یا مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمائید.این دارو صرف مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** شایع ترین عوارض جانبی که با مصرف ال-آرژنین دیده می‌شود شامل حساسیت و تشدید علائم آسم، کاهش فشارخون، هیپرکالمی در افراد با نارسایی کلیوی می‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه دو قرص همراه با آب کافی میل شود یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود، دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مکمل بهبود باروری آقایان**
- **نام تجاری/ برند: آندروفرتی**
- **شـرکت صاحـب پروانه: شـرکت دارو درمان پارمیدا تحت لیسـانس شـرکت کیوفارما اسپانیا**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ٦٠ عدد ساشه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۲ ساشه	نیاز روزانه٪
L-carntine	mg ۱۵۰۰	-
(Vitamin C(Ascorbic Acid	mg ۶۰	۷۵
Coenzyme Q۱۰	mg ۲۰	-
Vitamin E	mg ۱۰	۸۳
Zinc	mg ۱۰	۱۰۰
(Folic Acid)Vitamin B۹	mcg ۲۰۰	۱۰۰
Selenium	mcg ۵۰	۹۱
(Cyanocobalamin) Vitamin B۱۲	mcg ۱	۴۰

- **اجـزای غیرفعـال فرآورده (اکسـیپانت):** مالتودکسـترین، سـیتریک اسـید، کلسـیم کربنـات، طعم‌دهنـده، آس سـولفام کا، سـوکرالوز، سـیلیکون دی اکسـید، بتاکاروتـن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به تامیـن ویتامین‌هـا و مـواد معدنـی مـورد نیاز جهـت افزایـش تعداد و کیفیت اسـپرم
- **دسـتور صحیـح مصرف فـرآورده:** ۲ ساشـه در هر روز (صبـح و عصر)، هر ساشـه در نصـف لیوان آب حل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـرآورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد. بهتـر اسـت افـراد زیـر قبـل از مصـرف مکمـل آندروفرتـی بـا پزشـک خـود مشـورت کننـد
  - افراد مبتلا به بیماری صرع یا دارای سابقه تشنج
  - افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
  - افـرادی کـه در حـال مصـرف داروهـای رقیـق کننـده خـون ماننـد وارفاریـن هسـتند
  - در صورت حساسیت به هر یک از اجزای این فراورده
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** عـوارض گـوارش خفیـف (حالـت تهوع، اسـتفراغ، کرامپ شـکمی، اسـهال
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** در صـورت مصـرف داروی دیگـر با پزشـک مشـورت شـود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود، دور از دسـترس کودکان



- **نام فرآورده: مکمل تقویتی آقایان**
- **نام تجاری/ برند: آندروویت**
- **شرکت صاحب پروانه: دارو درمان پارمیدا تحت لیسانس شرکت کیوفارما اسپانیا**
- **تولیدشده در: شرکت کیش مدیفارم، کیش، ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۲ ساشه	نیاز روزانه٪
(Vitamin A(Betacarotene	mcg ۱۳۳	۱۶/۷
Vitamin B۱	mg ۱/۴	۱۲۷/۳
Vitamin B۲	mg ۱/۶	۱۱۴/۳
Nicotinamide	mg ۱۸	۱۱۲/۵
Vitamin B۶	mg ۲	۱۴۲/۹
Biotin	mcg ۱۵۰	۳۰۰
Folic acid	mcg ۲۰۰	۱۰۰
Vitamin B۱۲	mcg ۱	۴۰
Vitamin C	mg ۶۰	۷۵
Vitamin D۳	mcg ۵	۱۰۰
Vitamin E	mg ۱۰	۸۳/۳
Vitamin K۱	mcg ۴۵	۶۰
(Calcium (Phosphate	mg ۱۶۰	۲۰
(Copper (Citrate	mg ۱	۱۰۰
(Ferrous (Fumarate	mg ۳/۵	۲۵
(Magnesium (Oxide	mg ۱۰۰	۲۶/۷
(Manganese (Carbonate	mg ۱	۵۰
Phosphorous	۱۲۳mg	۱۷/۶
Selenium	mcg ۱۰۵	۱۹۰/۹
(Zinc (Oxide	mg ۵	۵۰
Lycopene	mg ۰/۰۶	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکرو کریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، منیزیم استئارات گیاهی، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، استئاریک اسید گیاهی، پتاسیم کلراید، اکسید آهن زرد.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به کمک به سلامت عمومی و تقویت عملکرد فیزیکی بدن در آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص همراه مایعات میل گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض گوارشی خفیف (حالت تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی، اسهال، یبوست). احتمال تغییر رنگ مدفوع
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در مصرف وارفارین، آنتی‌بیوتیک‌ها و یا داروهای شیمی‌درمانی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود. دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مایواینوزیتول+ فولیک اسید**
- **نام تجاری/ برند: اوازیتول**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد ساشه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۲ ساشه	نیاز روزانه٪
Myo-Inositol	۴ g	-
Folic Acid	۴۰۰ mcg	۱۰۰


- **اجـزای غیرفعال فرآورده (اکسـپیانت):** مالتودکسـترین، طعم‌دهنده پرتقال، سوکرالوز، سـیلیکون دی اکسید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به بهبود سـندرم تخمدان پلی کیسـتیک
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانه دو ساشـه مصرف شـود. هر ساشـه را در نصـف لیـوان آب حل کـرده و بلافاصله میـل نمایید.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **مـوارد منـع مصرف:** در صورت حساسـیت به میـو اینوزیتول، فولیک اسـید و یـا هریـک از مواد تشـکیل‌دهنده ایـن فـرآورده، از مصرف آن خـودداری نمایید.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** عـوارض جانبـی خاصی در طـی مصرف ایـن مکمل گزارش نشـده اسـت. اگـر هریک از عوارض جانبی در شـما بـروز کـرد با پزشـک خود مشـورت کنید.
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابل ذکر:** مصـرف فرآورده هـای حاوی فولیـک اسـید با متوترکسـات ممکن اسـت در جذب ایـن دارو تداخل ایجـاد کنـد. مصـرف همزمـان ایـن فـرآورده بـا داروهای ضد تشـنج ماننـد فنـی توییـن، والپـروات سـدیم و یـا کاربامازپیـن ممکن اسـت غلظت سـرمی ایـن داروها را کاهـش دهد. مصرف همزمـان اوازیتول بـا سولفاسـالازین ممکن اسـت سـبب کاهـش توانایی بـدن در جذب فولیک اسـید شود.
- **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود، دور از دسـترس کودکان



- **نام فرآورده:** مکمل تقویت ناخن‌ها
- **نام تجاری/ برند:** پیلفود کمپلکس اسپشیال نیلز
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت دارو درمان پارمیدا
- **تولیدشده در:** شرکت پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۳۰ عدد قرص روکش‌دار
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص	مصرف روزانه توصیه شده٪
L-Cystine	۵۰۰ mg	-
(Zinc(Oxide	۱۰ mg	۱۰۰
Biotin	۵۰ mcg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، تالک، هایپرملوز، کراس کارملوز سدیم، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، تیتانیوم دی اکساید، اکسید آهن قرمز رنگ
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به رشد و سلامت ناخن‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی ۱ قرص به مدت ۶-۳ ماه مصرف گردد. هر قرص همراه با وعده غذایی با مایعات فراوان میل گردد. (آب، آب میوه و...). پیلفورد کمپلکس اسپشیال نیلز فاقد لاکتوز، گلوتن و مشتقات آجیل می‌باشد و برای کسانی که عدم تحمل لاکتوز، سلیاک و یا حساسیت به آجیل دارند مناسب می‌باشد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** احتمال بروز عوارض گوارشی در موارد بسیار نادر
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با کینولون‌ها (سیپروفلوکساسین، افلوکساسین و...) و داروهای دسته تتراسایکلین‌ها (تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین) ممکن است سبب کاهش جذب این داروها شود. در صورت مصرف سایر داروها با پزشک مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود، دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** مکمل تقویتی مو
- **نام تجاری/ برند:** پیلفود کمپلکس پس از زایمان
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت دارو درمان پارمیدا
- **تولیدشده در:** شرکت پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۹۰ عدد کپسول خوراکی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۳ کپسول	٪نیاز روزانه
L-Cyctine	mg ۱۰۰۰	-
Millet Extract	mg ۷۰	-
L-Methionine	mg ۵۰	-
(Iron(sulfate	mg ۲۰	۱۴۳
Zinc	mg ۱۰	۱۰۰
Vitamin E	mg ۱۴	۱۱۷
Vitamin B۵	mg ۱۰	۱۶۷
Vitamin B۶	mg ۴	۲۸۶
(Manganese(Sulfate	mg ۱	۵۰
Gamma Linolenic Acid	mg ۳	-
Vitamin B۲	mg ۲	۱۴۳
Copper Sulfate	mg ۱/۶	۱۶۰
Biotin	mcg ۱۰۰	۲۰۰
(Iodine(Potassium iodine	mcg ۲۰۰	۱۳۳

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، منیزیم اسـتئارات، کراس کارملوز سـدیم، سـلیکون دی اکساید، ژلاتین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به حفـظ سـلامت موها و جلوگیـری از ریزش مـو در دوران پس از زایمان
- **دسـتور صحیـح مصرف فـرآورده:** روزانه ۳ کپسـول به مـدت حداقل ۳-۶ ماه مصـرف گردد.

کپسول‌ها همراه با وعده غذایی و مایعات کافی مصرف شود.

- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد. در صـورت ابتـلا بـه مشـکلات کبـدی، کـم‌کاری و یـا پـرکاری تیروئید قبـل از مصـرف این فـرآورده با پزشـک خود مشـورت کنید. در صورت مصرف سـایر داروها با پزشـک خـود مشـورت کنیـد. ایـن فـرآورده فاقـد لاکتـوز، گلوتن و مشـتقات آجیـل می‌باشـد و بـرای کسـانی که عـدم تحمل لاکتـوز، سـلیاک و یا حساسـیت بـه آجیـل دارند مناسـب می‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **مـوارد منـع مصرف:** در صـورت ابتلا بـه هموکروماتـوز از مصرف این فرآورده خـودداری نمایید.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** مکمل‌هـای خوراکـی حـاوی آهن ممکن اسـت باعـث تیره شـدن رنـگ مدفوع شـوند، ایـن موضوع بـه دلیل وجـود آهـن جذب نشـده اسـت و مضر نمی باشـد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود، دور از دسـترس کودکان



- **نام فرآورده: مکمل تقویت مو و استخوان دوران یائسگی**
- **نام تجاری/ برند: پیلفود کمپلکس پلاس۴۵**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۹۰ عدد کپسول خوراکی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۳ کپسول	مصرف روزانه توصیه شده٪
L-Cystine	mg ۱۰۰۰	-
Millet extract	mg ۷۰	-
L-Methionine	mg ۵۰	-
(Iron(Sulfate	mg ۲۰	۱۴۳
(Zinc(Oxide	mg ۱۰	۱۰۰
Vitamin E	mg ۱۴	۱۱۷
Vitamin B۵	mg ۱۰	۱۶۷
Vitamin B۶	mg ۴	۲۸۶
(Manganes (sulfate	mg ۱	۵۰
Gamma linolenic Acid	mg ۳	-
Vitamin B۲	mg ۲	۱۴۳
(Copper(sulfate	mg ۱/۶	۱۶۰
Biotin	mcg ۱۰۰	۲۰۰
Vitamin D۳	mcg ۵	۱۰۰

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، منیزیم اسـتئارات، کراس کارملوز سـدیم، سـیلیکون دی اکساید، ژلاتین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** تغییرات فیزیکـی و بیولوژیکـی در دوران یائسـگی ممکـن اسـت سـبب ضعیف شـدن موهـا شـود؛ بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از ویتامین‌هـا و عناصر مختلـف در ایـن دوره می‌توانـد کمک‌کننـده باشـد. پیلفـود کمپلکـس پـلاس ۴۵، یـک مکمل غذایی مناسـب برای دوران یائسـگی می‌باشـد کـه به حفظ سـلامت موهـا و رنگدانه‌های آن، سـلامت اسـتخوان‌ها و عملکـرد طبیعـی هورمون‌هـا کمـک می‌کند.
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانه ۳ کپسـول به مـدت حداقل ۶-۳ مـاه مصـرف گردد.

هر کپسول همراه با وعده غذایی و مایعات کافی میل گردد.

پیلفـود کمپلکـس پـلاس ۴۵ فاقـد لاکتـوز، گلوتـن و مشـتقات آجیل می‌باشـد و برای کسـانی که عدم تحمل لاکتوز، سـلیاک و یا حساسـیت بـه آجیل دارند مناسـب می‌باشـد.

- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صورت ابتـلا بـه هموکروماتـوز از مصرف این فـرآورده خـودداری نمائیـد. در صـورت ابتلا به مشـکلات کبـدی قبل از مصـرف این فـرآورده با پزشـک خـود مشـورت نمائید.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** احتمـال بـروز عـوارض گوارشـی در موارد نـادر. مصـرف مکمل‌های خوراکی حـاوی آهن ممکن اسـت باعث تیره رنـگ شـدن مدفـوع شـود. ایـن موضوع بـه دلیـل وجود آهـن جذب نشـده اسـت و مضر نمی‌باشـد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگـه‌داری شـود، دور از دسـترس کـودکان



- **نام فرآورده: مکمل مولتی ویتامین+ مینرال**
- **نام تجاری/ برند: پیلفود کمپلکس**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا**
- **تولیدشده در: شرکت پرارین پارس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۲ قرص	مصرف روزانه توصیه شده٪
L-Cystine	mg ۱۰۰۰	-
Gelatin	mg ۲۵۰	-
Millet extract	mg ۷۰	-
L-Methionine	mg ۵۰	-
(Iron(sulfate	mg ۲۰	۱۴۳
(Zinc(oxide	mg ۱۶	۱۶۰
Vitamin E	mg ۱۴	۱۱۷
Vitamin B۵	mg ۱۰	۱۶۷
Vitamin B۶	mg ۴	۲۸۶
(Manganese (sulfate	mg ۴	۲۰۰
Gamma linolenic Acid	mg ۳	-
Vitamin B۲	mg ۲	۱۴۳
(Copper(sulfate	mg ۱/۶	۱۶۰
Biotin	mcg ۱۰۰	۲۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکرستالین سلولز، سدیم کراس کارملوز، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، تالک هایپر ملوز، اکسید آهن قرمز، تیتانیوم دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** پیلفورد کمپلکس یک مکمل حاوی زینک، بیوتین و مواد دیگر است که به حفظ سلامت مو و ناخن‌ها کمک می‌کند.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۲ قرص به مدت ۳ تا ۶ ماه مصرف گردد. قرص همراه با وعده غذایی با مایعات فراوان میل شود. (آب، آب میوه و ...)
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد. پیلفورد کمپلکس فاقد لاکتوز، گلوتن و مشتقات آجیل می‌باشد و برای کسانی که عدم تحمل لاکتوز، سلیاک و یا حساسیت به آجیل دارند مناسب می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت ابتلا به هموکروماتوز از مصرف این فراورده خودداری کنید. در صورت بارداری شیردهی یا مشکلات کبدی قبل از مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** احتمال بروز عوارض گوارشی در موارد بسیار نادر، مصرف مکمل‌های خوراکی حاوی آهن ممکن است باعث تیره رنگ شدن مدفوع شود. این موضوع به دلیل وجود آهن جذب نشده است و مضر نمی‌باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با بیس فوسفونات‌ها (آلندرونیت،اتیدرونیت و...)، کینولون‌ها (سیپروفلوکساسین، افلوکساسین و...) و داروهای دسته تتراسایکلین‌ها (تتراسایکلین، داکسی سایکلین، مینوسایکلین) ممکن است سبب کاهش جذب این داروها شود. در صورت مصرف سایر داروها با پزشک مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود، دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده:** ساشه حاوی ال کارنیتین+ ال ارژنین، ویتامین‌ها و مینرال‌ها
- **نام تجاری/ برند:** ایرافرتیل
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت دارو درمان پارمیدا
- **تولیدشده در:** شرکت پرارین پارس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ساشه ۶۰ عدد
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ساشه	مصرف روزانه ٪
(L-Carnitine (tartrate	۵۰۰ mg	**
L-Arginine	۵۰۰ mg	**
Acetyl L-Carnitine	۲۵۰ mg	**
Vitamin C	۹۰ mg	۱۱۲/۵
N-Acetyl Cysteine	۵۰ mg	**
Vitamin E	۳۰ mg	۲۵۰
(Ferrous (Gluconate	۷ mg	۵۰
Vitamin B۱۲	۲/۵ mcg	۱۰۰
Vitamin B۵	۶ mg	۱۰۰
(Zinc (Gluconate	۵ mg	۵۰
Beta Carotene	۴/۸ mg	۱۰۰
Vitamin B۶	۲ mg	۱۴۳
(Copper (gluconate	۰/۵ mg	۵۰
Folic Acid	۲۰۰ mcg	۱۰۰
Selenium	۲۷/۵ mcg	۵۰
Vitamin D۳	۵ mcg	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیلیکون دی اکساید، اسانس پرتقال، سیتریک اسید، مالتودکسترین، سوکرالوز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به عملکرد متعادل سیستم تولید مثل و تقویت باروری در بانوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک ساشه مصرف شود. هر ساشه را در یک لیوان آب حل کرده و میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت نارسایی شدید کبدی، کلیوی، ابتلا به بیماری ویلسون و یا سابقه تشنج، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از مواد تشکیل‌دهنده این فراورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارض گوارشی خفیف از قبیل تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، نفخ، درد شکمی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان وارفارین با این فراورده ممکن است سبب افزایش ریسک خونریزی شود. مصرف این فرآورده با داروهای مربوط به شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی ممکن است سبب تداخل در جذب این داروها شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شود، دور از دسترس کودکان



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی**
- **نام تجاری/ برند: وایتال استایل**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت دارو درمان پارمیدا، تهران، ایران**
- **تولیدشـده در: شـرکت داروسـازی کیـش مدیفـارم، جزیـره کیـش، ایـران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد قرص روکش‌دار**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**


جز	مقدار در هر قرص
(Iron(Fumarate	۱۰ mg
Folic Acid	۶۰۰ mcg
(Idoine(Potassiume	۱۰۰ mcg
Vitamin B۱۲	۳ mcg

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، کلسـیم فسـفات انهیدروس، منیزیم اسـتئارات، سـیلیکون دی اکساید، سـدیم کـراس کارملوز.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** تامین آهـن، یـد، ویتامیـن B۱۲ و فولیـک اسـید بـدن در دوران بـارداری و شیر د هی
- **دسـتور صحیـح مصرف فـرآورده:** همواره ایـن فـراورده را طبق نظر و دسـتور پزشـک خود مصرف کنیـد. دوز توصیه شـده روزانـه یک قرص قبـل یـا همراه غذا می‌باشـد. چـای، تخم مرغ، شـیر و غـلات می‌توانند روی جـذب آهـن تاثیرگذار باشـند. از مصرف این مواد یک سـاعت قبل تـا ۲ سـاعت بعد از وایتال اسـتایل خـودداری نمایید.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیش‌گیـری نمی‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک یا داروساز
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صـورت حساسـیت بـه هـر یـک از مـواد تشـکیل‌دهنده ایـن فـراورده از مصـرف آن خـودداری نماییـد.
- **عـوارض جانبـی احتمالی:** عوارض گوارشـی مانند حالـت تهوع، نفخ، یبوسـت، اسهال، تیره شـدن مدفوع
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابل ذکر:** مصرف مزمـن آنتی‌بیوتیک‌ها، مهـار کننده‌هـای پمـپ پروتـون، مهارکننده‌هـای رسـپتور H۲ و کلسـتیرامین ممکـن اسـت جـذب ویتامیـن B۱۲ و فولیـک اسـید را کاهـش دهـد. مصرف همزمـان وایتال اسـتایل بـا لووتیروکسـین و یا کینولون‌ها (مانند سیپروفلوکساسـین، افلوکساسـین و ...) سبب کاهش غلظـت سـرمی ایـن داروها می‌شـود.
- **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبت و در دمـای ۱۵ تا ۳۰ درجـه سـانتی‌گراد نگه‌داری شـود، دور از دسـترس کودکان

آدرسا دارو

به سوی زندگی سالم

شرکت داروسازی درسا دارو





- **نام فرآورده: قرص ویتامین د۳ (Vitamin D۳)**
- **نام تجاری/ برند: بن فرول (Bonferol)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (.Dorsa Darou Co)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (.Dorsa Darou Co)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص خط‌دار گرد به رنگ سفید- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ۱۰ عددی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین D۳ (کوله کلسی فرول)	۱۰۰۰ واحد بین‌المللی (۲۵ میکروگرم)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز، میکروکریستالین سلولز، کلسیم هیدروژن فسفات و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** بدن انسان به منظور جلوگیری از بروز نرمی استخوان در کودکان (ریکتز) و یا در بزرگسالان (استئومالاسی) به مقادیر کافی ویتامین D۳ نیاز دارد. این ویتامین همراه با کلسیم باعث جلوگیری از پوکی استخوان در سنین بالا می‌شود. علاوه بر این ویتامین D۳ در بهبود عملکرد عصب و عضله نیز نقش مهمی دارد.

از آن جا که تامین مقادیر کافی ویتامین D۳ از مواد غذایی به تنهایی کار مشکلی است، لذا در افرادی که نیاز به مقادیر بیشتری از ویتامین D۳ دارند نظیر مادرانی که سابقه چندین بار بارداری با فواصل کوتاه دارند و یا افراد مسن و کسانی که پوشش خاص دارند و نور آفتاب به پوست بدن آن ها نمی‌رسد، افراد گیاه خوار یا کسانی که از مصرف ماهی اجتناب می‌کنند، کسانی که از بعضی بیماری‌های مزمن مانند بیماری کرون، سلیاک، مشکلات کبدی و کلیوی رنج می‌برند و یا بیمارانی که داروهایی نظیر کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون و برخی داروهای ضد ویروس را مصرف می‌کنند در معرض کمبود ویتامین D۳ می‌باشند و نیاز به دریافت مکمل تغذیه‌ای بن‌فرول® دارند.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را همراه غذا و آب کافی میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف خودداری نمایید.

در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نما یید .



- **نام فرآورده: قرص ویتامین د۳ (Vitamin D۳)**
- **نام تجاری/ برند: بن فرول (Bonferol)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص خط دار گرد به رنگ سفید- ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین D۳ (کوله کلسی فرول)	۲۰۰۰ واحد بین‌المللی (۵۰ میکروگرم)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** کراس کارملوز، میکروکریستالین سلولز، کلسیم هیدروژن فسفات و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**

بدن انسان به منظور جلوگیری از بروز نرمی استخوان در کودکان (ریکتز) و یا در بزرگسالان (استئومالاسی) به مقادیر کافی ویتامین D۳ نیاز دارد. این ویتامین همراه با کلسیم باعث جلوگیری از پوکی استخوان در سنین بالا می‌شود. علاوه بر این ویتامین D۳ در بهبود عملکرد عصب و عضله نیز نقش مهمی دارد.

از آن جا که تامین مقادیر کافی ویتامین D۳ از مواد غذایی به تنهایی کار مشکلی است، لذا در افرادی که نیاز به مقادیر بیشتری از ویتامین D۳ دارند نظیر مادرانی که سابقه چندین بار بارداری با فواصل کوتاه دارند و یا افراد مسن و کسانی که پوشش خاص دارند و نور آفتاب به پوست بدن آن‌ها نمی‌رسد، افراد گیاه‌خوار یا کسانی که از مصرف ماهی اجتناب می‌کنند، کسانی که از بعضی بیماری‌های مزمن مانند بیماری کرون، سلیاک، مشکلات کبدی و کلیوی رنج می‌برند و یا بیمارانی که داروهایی نظیر کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون و برخی داروهای ضد ویروس را مصرف می‌کنند در معرض کمبود ویتامین D۳ می‌باشند و نیاز به دریافت مکمل تغذیه‌ای بن‌فرول® دارند.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را همراه غذا و آب کافی میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف خودداری نمایید.

در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نما یید .



- **نام فرآورده: کراتین منوهیدرات (Creatine Monohydrate))**
- **نام تجاری/ برند: مجیک نوتریشن کراتین (Magic Nutrition Creatine Monohydra)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: پودر خوراکی در بسته‌بندی ۳۰۰ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر پیمانه
کراتین منوهیدرات	۵ گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** ۰

کمک به عضله‌سازی و حفظ سلامت عضلات، افزایش اندازه توده و قدرت عضلانی

این مکمل ضمن تامین انرژی لازم برای تمرینات بی‌هوازی، اثر محافظتی بر روی سیستم قلب و عروق و اعصاب نیز دارد.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روش اول: برای شروع، در ۴ روز اول مصرف، روزانه ۲۰ گرم کراتین در چهار وعده صبح، ظهر، قبل و بعد از تمرین (هر بار ۱ قاشق چای‌خوری معادل ۵ گرم) استفاده شود و از روز پنجم تا انتهای دوره مصرف روزانه ۱۰ گرم کراتین (۵ گرم قبل و ۵ گرم بعد از تمرین) استفاده گردد.

روش دوم: بدون دوره بارگیری، روزانه ۱۰ گرم کراتین (۵ گرم قبل و ۵ گرم بعد از تمرین) استفاده شود. مصرف آب کافی (۶ تا ۸ لیوان) در روز، در دوره استفاده از این فرآورده توصیه می‌گردد.

مصرف این فرآورده همراه با نوشیدنی‌های قندی اثربخشی محصول را افزایش می‌دهد.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف، خودداری شود.

در صورت استفاده از هر نوع دارو، قبل از مصرف این مکمل با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.

مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی، دیابت و کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی گردد.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از حل نمودن کراتین در نوشیدنی‌های اسیدی اجتناب شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در ظرف کاملا در بسته و در جای خنک و خشک نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ید و اسید فولیک (Iodine+ Folic acid)**
- **نام تجاری/ برند: یدوفولیک (Iodofolic)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص رو کش دار به رنگ صورتی - ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
ید	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دی کلسیم فسفات دی هیدرات، نشاسته، سدیم بی کربنات، اکدیسول، منیزیم استئارات و آب مقطر
- **رده سنی:** دوران پیش از بارداری، حین بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** قرص یدوفولیک® ترکیبی منحصر به فرد از اسید فولیک و ید می‌باشد که این ترکیبات در دوران پیش از بارداری و حین بارداری از مهم ترین مواد مغذی لازم و ضروری برای رشد سیستم عصبی، بینایی و شنوایی جنین می‌باشند. مصرف روزانه اسید فولیک در این دوران جهت پیشگیری از نقص‌های عصبی در جنین توصیه می‌گردد. همچنین مصرف ید در رشد مغز و تکامل بینایی و شنوایی جنین ضروری می‌باشد.
اثربخشی قرص یدوفولیک® براساس کارآزمایی های بالینی انجام گرفته در دوران پیش از بارداری و حین بارداری، مورد تایید پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص را همراه غذا و آب کافی میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف خودداری نمایید.
در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

توصیه می‌شود مصرف این محصول در کسانی که مبتلا به بیماری‌های تیروئید می‌باشند، با نظر پزشک صورت گیرد.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مجاز است.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان متوترکسات با فولیک اسید باعث کاهش اثر این دارو می‌شود.
از مصرف یدوفولیک® همراه با سایر فرآورده‌هایی که حاوی اسید فولیک هستند خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴ قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.



- نام فرآورده: قرص مولتی ویتامین مینرال (Multivitamin Mineral)
- نام تجاری/ برند: آی ویتا (ivita)
- شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)
- تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)
- شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص روکش‌دار بیضی- ۳۰ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

جز	مقدار در هر قرص
ویتامین E	۲۲/۵ واحد بین‌المللی (۱۵ میلی‌گرم)
ویتامین D	۶۰۰ واحد بین‌المللی (۱۵ میکروگرم)
ویتامین C	۹۰ میلی‌گرم
ویتامین B1 (تیامین)	۴ میلی‌گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین)	۳ میلی‌گرم
ویتامین B3 (نیاسین)	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین B6	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B12	۶ میکروگرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۶۰۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
زینک	۱۵ میلی‌گرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
منیزیم	۱۰۰ میلی‌گرم
آهن	۲۷ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز، میکروکریستالین سلولز، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید و منیزیم استئارات
- **رده سنی:** دوران پیش از بارداری، حین بارداری و شیردهی
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** قرص آی‌ویتا® حاوی ۱۷ ماده‌ی مغذی ضروری برای تامین نیاز روزانه بدن شامل: ویتامین‌های B1، C، D، E، B2، B3، B6، B12 و مواد معدنی و ریزمغذی‌های بیوتین، اسید فولیک، اسید پانتوتنیک، روی، ید، مس، سلنیم، منیزیم و آهن می‌باشد که جهت مصرف در دوران پیش از بارداری، حین بارداری و شیردهی و سایر افراد نیازمند به ترکیبات آن توصیه می‌شود. مصرف روزانه اسید فولیک در دوران بارداری جهت پیشگیری از نقص‌های عصبی در جنین توصیه می‌گردد. همچنین مصرف ید در رشد مغز و تکامل بینایی

و شنوایی جنین ضروری می‌باشد.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف مجاز روزانه ۱ قرص می‌باشد. قرص را همراه غذا و آب کافی میل نمایید. قرص آی‌ویتا® را با حداقل ۲ ساعت فاصله با سایر فرآورده‌های حاوی کلسیم و آنتی اسیدها مصرف نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف، خودداری شود.

در صورت استفاده از هر نوع دارو، قبل از مصرف این مکمل با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.

این فرآورده حاوی آهن است که در صورت مصرف بیش از اندازه، می‌تواند برای کودکان مضر باشد.

توصیه می‌شود مصرف این محصول در کسانی که مبتلا به بیماری‌های تیروئید می‌باشند، با نظر پزشک صورت گیرد.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مجاز است.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴ قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: ال گلوتامین (L-Glutamine)**
- **نام تجاری/ برند: مجیک نوتریشن ال-گلوتامین (Magic Nutrition L-Glutamine)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: پودر خوراکی در بسته‌بندی ۳۰۰ گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر پیمانه
ال گلوتامین	۵ گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**

کمک به حفظ و سلامت عضلات در دوره‌های طولانی تمرینات ورزشی شدید
تسریع بازتوانی و تاخیر در بروز خستگی
جلوگیری از تحلیل عضلانی

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک یا دو بار در روز (قبل، حین و یا بعد از تمرینات ورزشی)، هر بار یک پیمانه سر گرد پودر (۵ گرم) را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب سرد و یا هر نوشیدنی دیگر با طعم مطلوب مورد نظر خود، حل کرده و میل نمایید.

در روزهای غیرتمرین به صورت ناشتا یک پیمانه سر گرد (۵ گرم) در آب حل نموده و به سرعت میل نمایید.
از حل نمودن گلوتامین در آب و یا نوشیدنی داغ اکیدا اجتناب نما یید .
گلوتامین در فاز آبی ناپایدار بوده و بهتر است به محض حل کردن در آب، مصرف شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف، خودداری شود.

در صورت استفاده از هر نوع دارو، قبل از مصرف این مکمل با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.
توصیه می‌شود در صورت ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی و یا کبدی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴ قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در ظرف کاملا در بسته و در جای خنک و خشک نگهداری نمایید.




- **نام فرآورده: کافئین/منیزیوم/زینک (Caffeine/Magnesium/Zinc)**
- **نام تجاری/ برند: رسکیوکاف (Rescuecaf)**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **تولیدشده در: شرکت درسا دارو (Dorsa Darou Co.)**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص خط‌دار بیضی شکل به رنگ سفید - ۶۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
کافئین انهیدروس	۲۰۰ میلی‌گرم
منیزیوم (اکساید و استئارات)	۵۰ میلی‌گرم
ویتامین ب۶	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکیستالین سلولز، لاکتوز منوهیدرات، پلی وینیل پیرولیدون
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش هوشیاری و کاهش علائم خستگی، سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد قرص میل شود و یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف، خودداری شود.
در صورت استفاده از هر نوع دارو، قبل از مصرف این مکمل با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.
در صورت بارداری و شیردهی و یا ابتلا به فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی، دیابت، گلوکوم، پوکی استخوان، نارسایی کبدی، کلیوی و اختلالات روانپزشکی قبل از مصرف این مکمل با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
پس از هر بار مصرف در ظرف محکم شود. در صورت پارگی درپوش داخلی، از مصرف فرآورده خودداری گردد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این مکمل با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** از مصرف مکمل‌های تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. عوارضی که امکان بروز آن‌ها نادر ولی جدی می‌باشد. عوارض قلبی و عروقی ، عصبی، نارحتی‌های گوارشی، واکنش‌های حساسیتی و چشمی، تکرر ادرار، عوارض گوشی در مصرف این مکمل گزارش گردیده است. در صورت بروز آن‌ها باید با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف هر گونه دارو همانند اکیناسه، آمیودارون ، دیسولفیرام، افدرین، کتوکونازول، کتوپروفن،فنوباربیتال، فنی توئین،تئوفیلین ، تیزانیدین ، کینولون ها همانند سیپروفلوکساسین ، آدنوزین ، آناگرلید، لیتیوم ، آسپرین، دفرازیروکس، سیکلوسرین ، کوکائین و سایر داروها با پزشک و داروساز خود مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴ قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی آن نگهداری نمایید.

SINCE 1946

شرکت داروسازی دکتر عبیدی





- **نام فرآورده: بون آرکو (BONARCO)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi / BONARCO**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص روکش‌دار- ۳۰ عددی (۲ بلیستر پانزده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر دو قرص
کلسیم (به صورت کربنات)	۱۰۰۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۱۶۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین K۲	۹۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز، منیزیم استئارات، پلی سوربات، سیلیکون دی اکساید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پلی اتیلن گلایکول، تالک، تیتانیوم دی اکساید.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی ۲ عدد قرص همراه آب و وعده‌ی غذایی مصرف شود. یک قرص همراه با ناهار و یک قرص همراه با شام میل شود، قرص جویده نشود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

در صورتیکه به هر یک از اجزای فرآورده حساسیت دارید قبل از مصرف فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت مصرف داروها مانند وارفارین، بیس فسفونات، لوتیروکسین، دیگوکسین، کینولون‌ها و تتراسیکلین‌ها قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به بیماری زمینه‌ای هایپرکلسمی، هایپرپاراتیروئیدی و افزایش بیش از حد ویتامین دی قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از ترکیبات بکار رفته در این محصول، در بیماران با مقادیر بالای کلسیم در ادرار و سرم
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوزهای معمول، عارضه جانبی با این فرآورده دیده نمی‌شود. در موارد نادر ممکن است نفخ یا یبوست رخ دهد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از حل نمودن کراتین در نوشیدنی‌های اسیدی اجتناب شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

فرآورده را در بسته بندی اصلی، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: رِوُفولیک پریناتال (RevoFolic Prenatal)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi / RevoFolic Prenatal**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: ساخت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات)	۵۰۰ میکروگرم
ید (به صورت پتاسیم یدید)	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز، سدیم بی‌کربنات، دکستروز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولات و ید
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** ۱ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

قبل از شروع مصرف این فرآورده، در صورت ابتلا به بیماری و مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف فولات میتواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنیسیوز گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات میتواند موجب ایجاد حمله‌های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

در صورت ابتلا به گوآتر ندولار، تیروئیدیت خودایمنی و در کودکان مبتلا به سیستیک فایبروزیس مصرف این فرآورده باید با احتیاط صورت پذیرد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از شروع مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورتی که به هر یک از اجزای این فرآورده حساسیت دارید از مصرف آن بپرهیزید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به طور معمول در دوز توصیه شده به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از مشکلات گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای این فرآورده می‌تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابی، گیجی، بی حسی، ضعف دست و پا، حالت تهوع، مشکل گوارشی، تشدید آکنه نوجوانی، آریتمی، کم کاری و پرکاری تیروئید، پاروتیت، آدنومای تیروئید و ضایعات کوچک روده‌ای گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای زیر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید:

داروهای ضد تیروئید، لیتیم، وارفارین

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگهداری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: رِوُفولیک رگولار (RevoFolic Regular)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi /RevoFolic Regular**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: ساخت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
فولات (به صورت کلسیم_ال_متیل فولات)	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولات و ویتامین ب۱۲
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** ۱ تا ۲ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به طور معمول فولات به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از آزردگی گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای مشتقات فولات می‌تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابی، آزردگی، گیجی، حالت تهوع، آزردگی معده، تشنج، گاز و سایر عوارض گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای ضد صرع، ضد بارداری خوراکی، ضد سل، فرآورده‌های حاوی الکل، گلوکارپیداز و آنتاگونیست‌های فولیک اسید مثل متوتروکسات، پریمتامین، تریامترن، تریمپیرامین و سولفونامیدها می‌تواند منجر به کمبود فولات گردد.

در موقعیت‌هایی از قبیل درمان با متوتروکسات و داروهای ضد صرع جهت جلوگیری از پیشرفت آنمی مگالوبلاستیک درمان با فولیک اسید و فولینیک اسید لازم است.

کاهش غلظت سرمی فنی توئین طی مصرف مکمل فولات در مواردی گزارش شده است و احتمالا چنین اثری در مصرف همزمان با باربیتورات‌ها نیز مشاهده می‌گردد.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: رِوُفولیک مَکس (RevoFolic Max)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi / RevoFolic Max**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: ساخت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص- ۳۰ عددی (۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات)	۱۰۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان (در صورت تجویز پزشک)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولات و ویتامین ب۱۲
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** ۱ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

قبل از شروع مصرف این فرآورده، در صورت ابتلا به بیماری و مصرف سایر داروها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف فولات میتواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنسیوس گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات میتواند موجب ایجاد حمله‌های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از شروع مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده مصرف روفولیک مکس توصیه نمی‌گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به طور معمول فولات به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از آزردگی گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای مشتقات فولات می‌تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابی، آزردگی، گیجی، حالت تهوع، آزردگی معده، تشنج، و سایر عوارض گردد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** داروهای ضد صرع، ضد بارداری خوراکی، ضد سل، فرآورده‌های حاوی الکل، گلوکارپیداز و آنتاگونیست-های فولیک اسید مثل متوتروکسات، پریمتامین، تریامترن، تریمیپرامین و سولفونامیدها می‌تواند منجر به کمبود فولات گردد.

در موقعیت‌هایی از قبیل درمان با متوتروکسات و داروهای ضد صرع جهت جلوگیری از پیشرفت آنمی مگالوبلاستیک درمان با فولیک اسید و فولینیک اسید لازم است.

کاهش غلظت سرمی فنیتوئین طی مصرف مکمل فولات در مواردی گزارش شده است و احتمالا چنین اثری در مصرف همزمان با باربیتورات‌ها نیز مشاهده می‌گردد.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: فروفورت انرژی (Ferro Fort Energy)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi/ Ferro Fort Energy**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول- ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
آهن (به صورت فروس بیس گلایسینات)	۲۸ میلی‌گرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
اسید فولیک	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۸ میکروگرم
روی (به صورت سولفات مونوهیدرات)	۱۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکروز، نشاسته، تیتانیوم دی اُکساید، هایپروملوز، پوویدون، رنگ پونسو ۴ آر، پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰، رنگ زرد کینولین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن و روی مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن و تامین ویتامین‌های ب۹ و ب۱۲ مورد نیاز بدن و کمک به ساخت گلبول قرمز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان: روزانه ۱ عدد کپسول با مقدار کافی آب میل گردد.

جهت جذب بهتر آهن، این فرآورده را با معده خالی همراه با یک لیوان پر از آب، یک ساعت قبل یا ۲ ساعت پس از غذا مصرف نمایید. اگرچه به منظور کاهش احتمالی تحریکات معده، ممکن است همراه با غذا مصرف شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

قبل از مصرف این فرآورده، در صورت مصرف مکمل کلسیم یا داروهایی مانند آهن تزریقی، آنتی اسیدها، آنتی بیوتیک‌ها، داروهای ضد صرع، داروهای تیروئید، پنی سیلامین، سولفاسالازین و ابتلا به بیماری‌هایی مانند آنمی و نارسایی‌های خونی، اختلالات متابولیک، نارسایی کلیوی، کبدی، گوارشی، سابقه سوءمصرف الکل و تزریق خون با پزشک خود مشورت نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هر یک از اجزای این فرآورده از مصرف آن پرهیز نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در دوزهای معمول، عارضه جانبی با این فرآورده دیده نمی‌شود. در موارد نادر ممکن است عوارض گوارشی مانند درد شدید و انقباض مداوم شکم یا معده و سیاهی مدفوع رخ دهد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف فرآورده‌های تاریخ گذشته خودداری کنید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

فرآورده را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن آن سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

فرآورده را تا زمان مصرف، درون ظرف اصلی خود نگهداری نمایید.

بعد از هر بار مصرف درپوش بطری را محکم ببندید.



- **نام فرآورده: فروفورت دئودنال (FerroFort Duodenal)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi/ FerroFort Duodenal**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول- ۳۰ عددی (قوطی/ ۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
فروس گلایسین سولفات (معادل آهن دو ظرفیتی)	۸۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون، متاکریلیک اسید کوپلیمر، رنگ خوراکی، تالک خالص، تیتانیوم دی اکساید، دی بوتیل فتالات، ژلاتین و سوکروز.
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بالای ۶ سال (در صورت تجویز پزشک معالج)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف را پزشک تعیین می‌کند.

۱) این فرآورده باید بدون جویدن و همراه با مقادیر کافی آب مصرف شود.

۲) این فرآورده باید به صورت ناشتا و و با معده خالی در هنگام صبح حدود یک ساعت قبل از صبحانه و یا در فاصله زمانی مناسب حدود ۲ ساعت قبل و یا بعد از غذا مصرف شود.

۳) در صورت اشکال در بلع کپسول، محتویات درون آن را به طور کامل تخلیه و به درون یک قاشق سوپخوری منتقل نمایید. سپس آن را با مقادیر کافی آب میل کنید.

۴) دوره مصرف توسط پزشک تعیین می‌گردد. مصرف خوراکی آهن، در صورت تجویز پزشک و نیاز بیمار، پس از نرمال شدن نتایج هموگلوبین همراه با پایش میزان فریتین سرم، می‌تواند ادامه یابد.

۵) دوره مصرف بر اساس شدت کم خونی و نیاز فردی معمولا ۳ تا ۶ ماه است که ممکن است در برخی موارد طولانی‌تر نیز گردد.

۶) در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از فرآورده، آن نوبت را مصرف ننموده و برنامه عادی خود را ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار فرآورده خودداری کنید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

قبل از مصرف این فرآورده موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

وجود هرگونه حساسیت ، بارداری یا شیرده ی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر

حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این فرآورده تأثیر بگذارد.

قبل از مصرف این فرآورده در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها (به خصوص موارد ذیل) پزشک خود را مطلع سازید:

۱) بیماران مبتلا به زخم‌های روده‌ای

۲) افراد سالخورده با علایم کمبود آهن

۳) کم خونی با منشأ نامشخص

۴) هموراژی (خونریزی)

۵) کم خونی ناشی از بیماری‌های شدید کلیوی

این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه ۷۸/۷۷٪ بالاتر از حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه است باید حتما با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.

در هنگام رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد مراقبت خاصی مورد نیاز نمی‌باشد.

آزمایش تشخیصی بنزیدین در هنگام مصرف آهن میتواند مثبت گردد.

به دلیل امکان تغییر تیره رنگ مدفوع، آزمایش وجود خون مخفی در مدفوع ممکن است مثبت شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با توجه به افزایش نیازمندی به آهن طی دوران بارداری و شیردهی، مصرف این فرآورده طی این دوران باید به طور منظم و در مقادیر تجویز شده توسط پزشک انجام گیرد.
- **موارد منع مصرف:** ۱) حساسیت به هر یک از مواد متشکله این فرآورده

۲) مقادیر زیاد آهن خون (هموکروماتوز هموليز مزمن)

۳) در اختلالات مصرف آهن (مانند کم خونی سیدروبلاستیک، کم خونی ناشی از مسمومیت با سرب، تالاسمی)

۴) مصرف در کودکان کمتر از ۶ سال

● **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

۱) مشکلات گوارشی مانند اسهال، یبوست، سوزش سردل یا استفراغ ممکن است حادث شود. کثرت وقوع با مقدار مصرف افزایش می‌یابد.

۲) واکنش‌های حساسیتی (مانند حساسیت پوستی) در موارد نادر ممکن است ظاهر شود.

۳) تغییر تیره رنگ مدفوع ممکن است در طی مصرف ایجاد شود که ناشی از مصرف آهن بوده و بی‌خطر است.

● **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید پزشک خود را مطلع سازید.

داروهای ضد درد یا ضد روماتیسم (مانند سالیسیلات ها و فنیل بوتازون): مصرف توام این داروها با این فرآورده میتواند باعث وخامت تحریکات مخاط گوارشی گردد.

تتراسیکلین‌ها، داروهای بیس فسفونات: مصرف همزمان باعث مهار جذب آهن، تتراسیکلین‌ها و داروهای بیس فسفونات می‌گردد.

کلستیرامین، داروهای حاوی کلسیم، منیزیم و آلومینیم (مانند آنتی اسیدها، نمک‌های جانشین کلسیم و منیزیم): جذب آهن مهار می‌گردد.

پنی سیلامین، ترکیبات خوراکی طلا، اِل-متیل دوپا، لوودوپا، اِل-تیروکسین : جذب این داروها اگر همزمان با آهن مصرف شوند، مختل می‌گردد.

آنتی بیوتیک‌های فلوروکینولونی مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، نور فلوکساسین، افلوکساسین: جذب این داروها در مصرف همزمان با آهن به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. به طور کلی فاصله زمانی مصرف این فرآورده با داروهای فوق باید حداقل ۲ ساعت باشد.

نداخلات غذایی: مواد موجود در غذاهای گیاهی که با آهن تشکیل کمپلکس می‌دهند مانند فیتات‌ها، اگزالات‌ها و فسفات‌ها و همچنین مواد موجود در قهوه، چای، شیر و نوشیدنی‌های کولا از جذب آهن به درون خون جلوگیری می‌نمایند.

● **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -

● **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی مشابه با عوارض جانبی ولی با شدت بیشتر، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

● **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف فرآورده‌های تاریخ گذشته خودداری کنید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

فرآورده را تا زمان مصرف، درون ظرف اصلی خود نگهداری نمایید.

بعد از هر بار مصرف درپوش بطری را محکم ببندید.

فرآورده را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن آن سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک میکند.





- **نام فرآورده: فروفورت کودکان (Children Ferro fort)**
- **نام تجاری/ برند: Ferro fort Abidi/ Children**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: ساخت ایران**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره خوراکی- ۳۰ میلی‌لیتر درون بطری شیشه‌ای به همراه قطره چکان - فاقد گلوتن**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
آهن (به صورت لیپوزومال)	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم مونو بازیک فسفات، پلی سوربات ۸۰، آسکوربیک اسید، سوکرالوز، سدیم متا بی سولفیت، طعم‌دهنده، اصلاح کننده طعم و آب خالص.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ میلی‌لیتر یا با تجویز پزشک.

قطره آهن می‌تواند به طور مستقیم در دهان چکانده و یا در نصف لیوان آب حل شده و مصرف شود. برای اطمینان از برداشتن مقدار دقیق و صحیح فرآورده، از قطره چکان مدرج داخل جعبه استفاده نمایید.

بعد از هر بار مصرف، قطره چکان را با آب بشویید.

قبل از مصرف، فرآورده را به خوبی تکان دهید تا محتویات یکنواخت شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

این فرآورده جایگزین رژیم غذایی اصلی نمی‌باشد.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.

در صورت مصرف مکمل یا داروی دیگر برای کودک قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید.

در صورت ابتلای کودک به بیماری زمینه‌ای، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید. این بیماری‌ها شامل: هموکروماتوزیس ،هموسیدروزیس، آنمی همولیتیک و ... می‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت کودک از مصرف این فرآورده پرهیز نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** از عوارض عمده آهن می‌توان به عوارض گوارشی اشاره کرد که شامل حالت تهوع، استفراغ، نفخ و سایر ناراحتی‌های گوارشی از قبیل سیاهی مدفوع، اسهال، یبوست و بی‌اشتهایی است.

در صورت بروز عوارض با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

قبل از باز نمودن درب فرآورده برای اولین بار، آن را به صورت ایستاده، در بسته بندی اصلی (بطری و جعبه مقوایی)، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمایید.

پس از باز نمودن درب فرآورده برای اولین بار، آن را به صورت ایستاده، در بسته بندی اصلی (بطری و جعبه مقوایی) و در یخچال نگهداری نمایید.

از مصرف فرآورده‌ای که بیش از یک ماه از باز شدن دربش گذشته است، خودداری نمایید.

فرآورده را از یخ زدگی محافظت نمایید.



- **نام فرآورده: فروفورت گاین (Ferro Fort Gyn)**
- **نام تجاری/ برند: Abidi / FerroFort Gyn**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دکتر عبیدی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول- ۳۰ عددی (قوطی/ ۳ بلیستر ده تایی)**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر کپسول
فروس گلایسین سولفات (معادل آهن دو ظرفیتی)	۶۰ میلی‌گرم
اسید فولیک	۰/۷۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پوویدون، متاکریلیک اسید کوپلیمر نوع A، دی بوتیل فتالات، تیتانیوم دی اکساید، تالک خالص، رنگ پونسو ۴ آر، هایپرومولوز، اکسید آهن زرد، پلی اتیلن گلیکول، ژلاتین و سوکروز
- **رده سنی:** بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۶ سال (در صورت تجویز پزشک معالج)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن و تامین ویتامین ب ۹ مورد نیاز بدن و کمک به ساخت گلبول قرمز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف را پزشک تعیین میکند اما میزان مصرف این فرآورده به طور کلی به صورت زیر است:

در موارد کمبود شدید آهن، بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از ۱۵ سال و یا با وزن بیشتر از ۵۰ کیلوگرم، مقدار مصرف ممکن است ۲ یا ۳ کپسول در شروع درمان باشد. در چنین مواردی این تعداد باید در چند نوبت تقسیم شود.

دستور صحیح مصرف فرآورده: مقدار مصرف را پزشک تعیین می‌کند.

۱) این فرآورده باید بدون جویدن و همراه با مقادیر کافی آب مصرف شود.

۲) این فرآورده باید به صورت ناشتا و و با معده خالی در هنگام صبح (حدود یک ساعت قبل از صبحانه) و یا در فاصله زمانی مناسب حدود ۲ ساعت قبل و یا بعد از غذا مصرف شود.

۳) در صورت اشکال در بلع کپسول، محتویات درون آن را به طور کامل تخلیه و به درون یک قاشق سوپخوری منتقل نمایید. سپس آن را با مقادیر کافی آب میل کنید.

۴) دوره مصرف توسط پزشک تعیین می‌گردد. مصرف خوراکی آهن ، در صورت تجویز پزشک و نیاز بیمار، پس از نرمال شدن نتایج هموگلوبین همراه با پایش میزان فریتین سرم ، می تواند ادامه یابد.

۵) دوره مصرف بر اساس شدت کم خونی و نیاز فردی معمولا ۳ تا ۶ ماه است که ممکن است در برخی موارد طولانی‌تر نیز گردد.

۶) در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از فرآورده، آن نوبت را مصرف ننموده و برنامه عادی خود را ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار فرآورده خودداری کنید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

قبل از مصرف این فرآورده موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

وجود هرگونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلاء به بیماری‌های دیگر

قبل از مصرف این فرآورده در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها (به خصوص موارد ذیل) پزشک خود را مطلع سازید:

۱. بیماران مبتلا به زخم‌های روده‌ای
۲. افراد سالخورده با علایم کمبود آهن،
۳. کم خونی با منشأ نامشخص
۴. هموراژی (خونریزی)
۳. کم خونی ناشی از بیماری‌های شدید کلیوی

این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه ۳۳/۳۳٪

بالاتر از حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه است، باید حتما با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.

موارد احتیاط:

۱. در هنگام رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد مراقبت خاصی مورد نیاز نمی-باشد.

۲. آزمایش تشخیصی بنزیدین در هنگام مصرف آهن میتواند مثبت گردد.

۳. به دلیل امکان تغییر تیره رنگ مدفوع، آزمایش وجود خون مخفی در مدفوع ممکن است مثبت شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده طی دوران بارداری و شیردهی جهت کمبودهای آهن و اسید فولیک مطابق با دستور پزشک انجام می‌گیرد.
- **موارد منع مصرف:**

۱ - حساسیت به هر یک از مواد متشکله این فرآورده

۲- مقادیر زیاد آهن خون (هموکروماتوز هموليز مزمن)

۳- در اختلالات مصرف آهن (مانند کم‌خونی سیدروبلاستیک، کم خونی ناشی از مسمومیت با سرب، تالاسمی)

۴-در کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ (به عنوان مثال به علت فقدان فاکتور ذاتی)

۵- مصرف در کودکان کمتر از ۶ سال

- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

۱- مشکلات گوارشی مانند اسهال، یبوست، سوزش سردل یا استفراغ ممکن است حادث شود. کثرت وقوع با مقدار مصرف افزایش می‌یابد.

۲- واکنش‌های حساسیتی (مانند حساسیت پوستی) در موارد نادر ممکن است ظاهر شود.

۳-تغییر تیره رنگ مدفوع ممکن است در طی مصرف ایجاد شود که ناشی از مصرف آهن بوده و بی‌خطر است.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** قبل از مصرف این فرآورده چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید پزشک خود را مطلع سازید.

داروهای ضد درد یا ضد روماتیسم (مانند سالیسیلات‌ها و فنیل بوتازون): مصرف توام این داروها با این فرآورده میتواند باعث وخامت تحریکات مخاط گوارشی گردد.

داروهای ضد تشنج: مصرف مقادیر بالای این فرآورده میتواند باعث افزایش حملات تشنجی در بیماران تحت درمان با داروهای ضد تشنج گردد.

تتراسیکلین‌ها، داروهای بیس فسفونات: مصرف همزمان باعث مهار جذب آهن، تتراسیکلین‌ها و داروهای بیس فسفونات می‌گردد.

کلستیرامین، داروهای حاوی کلسیم، منیزیم و آلومینیم (مانند آنتی اسیدها، نمک‌های جانشین کلسیم و منیزیم): جذب آهن مهار می‌گردد.

پنی سیلامین، ترکیبات خوراکی طلا، اِل-متیل دوپا، لوودوپا، اِل-تیروکسین: جذب این داروها اگر همزمان با آهن مصرف شوند، مختل می‌گردد.

آنتی بیوتیک‌های فلوروکینولونی مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، نور فلوکساسین، افلوکساسین: جذب این داروها در مصرف همزمان با آهن به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

داروهای سیتوتوکسیک، سولفونامیدها، داروهای ضد صرع، **باربیتورات‌ها:** این داروها جذب اسید فولیک را مختل می نمایند.

به طور کلی فاصله زمانی مصرف این فرآورده با داروهای فوق باید حداقل ۲ ساعت باشد.

تداخلات غذایی: مواد موجود در غذاهای گیاهی که با آهن تشکیل کمپلکس می‌دهند مانند فیتات‌ها، اگزالات‌ها و فسفات‌ها و همچنین مواد موجود در قهوه، چای، شیر و نوشیدنی‌های کولا از جذب آهن به درون خون جلوگیری می‌نمایند.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی مشابه با عوارض جانبی ولی با شدت بیشتر، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف فرآورده‌های تاریخ گذشته خودداری کنید.

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.


فرآورده را تا زمان مصرف، درون ظرف اصلی خود نگهداری نمایید.

بعد از هر بار مصرف درپوش بطری را محکم ببندید.

فرآورده را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن آن سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک میکند.

Razak

شرکت لابراتوارهای رازک





- **نام فرآورده: اکولایف® (Ekolife®)**
- **نام تجاری/ برند: اکولایف® (Ekolife®)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بیلیسترهای ۱۰ عددی در کارتن باکس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار(برای دو قرص)	RDA
Hydrolysates protein of wheat	۸۰۰ mg	
L-cysteine	۹۲ mg	
Methionine	۱۱۸ mg	
Spirulina	۱۳ mg	
Vitamin B۵	۶ mg	٪۱۰۰
Vitamin B۶	۲ mg	٪۱۴۳
(D-Biotin (B۸	۰/۱۵ mg	٪۳۰۰
Vitamin PP	۱۸ mg	٪۱۱۲/۵
Zinc	۱۵ mg	٪۱۵۰
Magnesium	۲۰ mg	٪۵

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** CALCIUM PHOS-PHATE, DIBASIC, ANHYDROUS 143.4 mg
OPADRY 12.32mg
SILICON DIOXIDE 0.8 mg
POVIDONE K25 24 mg
ISOPROPYL ALCOHOL 188.6 mg
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه بهبـود تقویـت و تحریـک رشـد مـو و ناخـن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه دو عـدد قـرص همـراه یـک لیـوان بـزرگ آب در هنـگام وعـده‌ی غذایـی مصـرف شـود. اکولایـف بـرای یـک دوره ۳ ماهـه توصیـه می‌گـردد. جهـت بلعیـدن آسـانتر می‌تـوان قـرص را نصـف کـرد. اکولایـف بایـد همـراه بـا رژیـم غذایـی متنـوع و متعـادل مصـرف گـردد.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** بـا توجـه بـه ایمنـی بـالا و میـزان کالـری کـم اکولایـف®، می‌تـوان آن را همـراه بـا نمـک، در دوران بـارداری ،بیماران دیابتـی و مبتلایان به فشـار خـون در طول برنامه کاهـش وزن مصرف نمـود.در صـورت مصـرف همزمان بـا سـایر فرآورده‌ها/ داروهـای دیگر قبـل از مصـرف بـا پزشـک یـا داروسـاز مشـورت نماییـد. این فـرآورده حاوی گلوتن می‌باشـد و در بیماران مبتلا به سـیلیاک اسـتفاده نشـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** بـا صلاحدیـد پزشـک می‌توانـد در طـول بـارداری و شـیردهی مصـرف گردد.
- **مـوارد منـع مصرف:** در صورت حساسـیت به هر یک از اجـزای فراورده، افـراد مبتـلا به مشـکلات کلیـوی بایـد محصـول را تحت نظر پزشـک مصـرف نمایند. افراد مبتلا به بیماری سـلیکاک به علـت وجود گلوتن در ایـن محصول قبل از اسـتفاده با پزشـک خود مشـورت نمایند.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** ایـن محصـول معمـولا توسـط افـراد تحمـل می‌شـود و عـوارض جانبـی متـداول بـا ایـن محصـول گـزارش نشـده اسـت، لکـن در صـورت بـروز عـوارض زیـر بـا پزشـک و یـا داروسـاز خـود مشـورت نماییـد: واکنـش شـدید آلرژیـک (تحریک‌هـای پوسـتی و تنفسـی، التهـاب دهـان، صـورت، لب‌هـا و زبـان)، سـریعا بـه پزشـک و یـا مرکـز درمانـی مراجعـه نمایـد.
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** تداخـل دارویـی رایـج بـا ایـن محصـول گـزارش نگردیـده اسـت.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۲ قرص در روز
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** در صـورت مصـرف اتفاقـی بیـش از میـزان توصیـه شـده، سـریعا بـه پزشـک و یـا مرکـز درمانـی مراجعـه نماییـد.
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و خنـک، در دمـای کمتـر از ۳۰ درجـه و دور از دسـترس کـودکان نگهـداری نماییـد.



- **نام فرآورده: زینک سولفات (Zinc sulfate)**
- **نام تجاری/ برند: زینک سولفات (Zinc sulfate)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت/ یک شیشه‌ای ۱۲۰ میلی‌لیتری با غلظت ۵ml/5mg در کارتن باکس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
Zinc (as sulfate)	۵ml/5mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** SUCROSE
METHYLPARABEN
PROPYLPARABEN
PROPYLENE GLYCOL
- **رده سنی:** برای کودکان و بزرگسالان قابل مصرف است.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** عامل کمکی در رشد و نمو طبیعی و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این محصول به قرار زیر است:

کودکان : ۸-۵ میلی لیتر در روز

زنان باردار و شیرده: ۲۲/۵ میلی‌لیتر در روز (فقط با نظر پزشک متخصص)

بالغین: ۲۵ میلی‌لیتر در روز (با نظر پزشک متخصص تا ۴۰ میلی‌لیتر در روز)

بهتر است مصرف فرآورده همراه با وعده غذایی باشد.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی، فرآورده را همراه با غذا مصرف کنید، اما از مصرف همزمان با مواد غذایی حاوی میزان بالای کلسیم ، فسفر و آهن خودداری نمایید. در نارسایی حاد کلیوی، تعدیل دوز فرآورده ضروری می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیر دهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای این فرآورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشکلات گوارشی، تهوع، استفراغ، سردرد. از مصرف بیش از مقدار تجویز شده پزشک خودداری نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** پنی سیلامین، تتراسایکلین، سیپروفلوکساسین
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** برای کودکان میزان ۸-۵ میلی‌لیتر در روز ذکر شده است.

برای زنان باردار و شیرده میزان ۲۲/۵ میلی‌لیتر در روز ذکر شده است.

برای بالغین میزان ۴۰ میلی‌لیتر در روز ذکر شده است.

- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** علائم مسمومیت نظیر تهوع، استفراغ، عطش، بی‌قراری، خستگی، ضعف، تعریق می‌باشد.

لذا در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید به بیمارستان منتقل شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی، فرآورده را همراه با غذا مصرف کنید، اما از مصرف همزمان با مواد غذایی حاوی میزان بالای کلسیم، فسفر و آهن خودداری نمایید. در نارسایی حاد کلیوی، تعدیل دوز فرآورده ضروری می‌باشد.

- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری و از یخزدگی محافظت شود. فراورده دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: زینک سولفات (Zinc sulfate)**
- **نام تجاری/ برند: زینک سولفات (Zinc sulfate)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت / یک شیشه‌ای ۱۲۰ میلی‌لیتری با غلظت ۵ml/۱۰mg در کارتن باکس به همراه بروشور داخل جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
Zinc (as sulfate)	۵ml/۱۰mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** PROPYLPARABEN
METHYLPARABEN
PROPYLENE GLYCOL
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE
ANHYDROUS CITRIC ACID
SUCROSE
WATER
- **رده سنی:** برای کودکان و بزرگسالان قابل مصرف است.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** زینک کمک کننده رشد و نمو طبیعی در دوران بارداری، کودکی و بزرگسالی است و باعث تقویت سیستم ایمنی است.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان بالای ۳۰ کیلوگرم و بزرگسالان: ۴ قاشق چایخوری پر، سه بار در روز یا طبق نظر پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی، فرآورده را همراه با غذا مصرف کنید، اما از مصرف همزمان با مواد غذایی حاوی میزان بالای کلسیم، فسفر و آهن خودداری نمایید. در نارسایی حاد کلیوی، تعدیل دوز فرآورده ضروری می‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت هرگونه حساسیت به اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مشکلات گوارشی، تهوع استفراغ، سردرد/ از مصرف بیش از مقدار تجویز شده پزشک خودداری نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** پنی سیلامین، تتراسایکلین، سیپروفلوکساسین
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان بالای ۳۰ کیلوگرم و بزرگسالان: ۴ قاشق چایخوری پر، سه بار در روز یا طبق نظر پزشک
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود. در صورت بروز مشکلات گوارشی، فرآورده را همراه با غذا مصرف کنید، اما از مصرف همزمان با مواد غذایی حاوی میزان بالای کلسیم، فسفر و آهن خودداری نمایید. در نارسایی حاد کلیوی، تعدیل دوز فرآورده ضروری می‌باشد.
- **شرایط نگهداری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری و از یخزدگی محافظت شود. فراورده دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سیستین B٦ زینک رازک® (Zinc Cystine B٦ Razac®)**
- **نام تجاری/ برند: سیستین B٦ زینک رازک® (Zinc Cystine B٦ Razac®)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ٦٠ عدد قرص روکش‌دار به صورت بیلیسترهای ١٥ عددی در کارتن باکس به همراه بروشور.**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار	RDA
L-Cystine	۲g	
Arginine	mg ۶/۰۰	
Vitamin B۶	۱/۴۰mg	٪۱۰۰
Zinc	۱۵/۳۲mg	٪۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** PROPYLPARABEN
METHYLPARABEN
PROPYLENE GLYCOL
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE
ANHYDROUS CITRIC ACID
SUCROSE
WATER
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود رشد و سلامت مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** به مدت دو تا سه ماه، روزانه ۴ قرص همراه با وعده‌های غذایی میل شود.
سیستین B۶ زینک رازک®، همراه با رژیم غذایی متنوع مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این محصول جایگزین رژیم غذایی سالم و متنوع نمی‌باشد. بیش از ۴ قرص در روز مصرف نشود. در صورت مصرف فرآورده دارویی دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده، سریعا به پزشک و یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای این فرآورده پزشک خود را مطلع سازید.

بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی، قلبی- عروقی، تنفسی، نقص سیستم ایمنی و دیابت باید محصول را تحت نظر پزشک مصرف نمایند.

- **عوارض جانبی احتمالی:** این محصول معمولا به خوبی توسط افراد تحمل می‌شود و عوارض جانبی متداول با این محصول گزارش نشده است، لکن در صورت بروز شدید عوارض جانبی مانند: واکنش‌های شدید آلرژیک (تحریک پوستی و تنفسی، التهاب دهان، صورت، لب‌ها، زبان)، سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** همراه با داروی لوودوپا و یا هر مهارکننده دوپاوکربوکسیلاز مصرف نشود.
این محصول باید با فاصله زمانی با سایر داروها مصرف گردد. در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر که حاوی املاح است، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** بیش از ۴ قرص در روز مصرف نشود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از میزان توصیه شده،سریعا به پزشک و یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- **نام فرآورده: فربیسین®(Ferbisin®)**
- **نام تجاری/ برند: فربیسین®(Ferbisin®)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۳۰ کپسول در جعبه به همراه بروشور.**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	مقدار	نیاز روزانه
Iron (Ferrous Bis-Glycinate)	mg ۲۸	٪۱۵۶
Folic acid	mcg ۴۰۰	٪۱۰۰
Vitamin C	mg ۶۰	٪۱۰۰
Vitamin B12	mcg ۸	٪۱۳۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ندارد
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبودی کم خونی ناشی فقرآهن، ویتامین B۱۲ و یا فولیک اسید
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول ترجیحا به همراه غذا با مشورت پزشک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مکمل‌های حاوی مقادیر بالای آهن برای کودکان خطر مسمومیت با آهن را به دنبال دارد. لذا دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- مکمل‌های حاوی آهن در افراد مبتلا به نارسایی کبدی، سیروز الکی، کلسیم مزمن و نارسایی پانکراس باید با احتیاط مصرف شود.
- در افرادی که کم‌خونی با دلیل ناشناخته دارند، مکمل‌های حاوی فولیک اسید با احتیاط مصرف شود.
- در صورت مصرف همزمان با سایر فراورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- مکمل آهن در افرادی که سابقه ی التهاب معده، زخم معده یا خونریزی گوارشی دارند، با احتیاط مصرف شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی طبق تجویز پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت به هریک از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این فراورده.

بیماران مبتلا به اختلالات متابولیسم آهن (هموکروماتوز، هموسیدروز)

- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فراورده به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه هریک از این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت ادامه عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
نفخ، حالت تهوع، سیاه شدن مدفوع، یبوست، بی اشتهایی، واکنش حساسیتی.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با داروهای زیر خودداری فرمائید:
داروهای آنتی اسیدها، بیس فسفونات‌ها، لوودوپا، لووتیروکسین، کینولون‌ها، تتراسایکلین‌ها، کلیسیم، روی، چای، داروهای ضد تشنج، کلشی سین، سولفاسالازین، متفورمین.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزی یک عدد کپسول
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، با پزشک تماس بگیرید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- **نام فرآورده: فولایرون® (Foliron®)**
- **نام تجاری/ برند: فولایرون® (Foliron®)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول / ۳۰ عدد کپسول به صورت بلیستر ۱۰ عددی در کارتن باکس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	مقدار	
Dried ferrous sulphate	mg ۱۸۵	Equivalent to ۶۰ mg Fe^{+2}
Folic acid	mcg ۴۶۰	

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** MAGNESIUM STEARATE
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
SILICON DIOXIDE
CROSCARMELLOSE SODIUM
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جریان رشد و کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول، قبل از وعده غذایی مصرف نموده و در صورت ایجاد تحریکات گوارشی به همراه غذا میل نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه میزان آهن آن ۳۳٪ بالاتر از حداکثر مقدار مجاز روزانه است می‌بایستی حتما با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
در صورت مصرف همزمان با فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت استفاده از هر داروی دیگر مانند آنتی بیوتیک، داروهای حاوی املاح معدنی با پزشک خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف نمایید.
- **موارد منع مصرف:** وجود هر نوع حساسیت به آهن، فولیک اسید
در صورت ابتلا به هر گونه کم‌خونی (به جز کمبود آهن)
- **عوارض جانبی احتمالی:** تحریک گوارشی در این فرآورده به علت فرمولاسیون خاص به حداقل رسیده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** تتراسایکلین‌ها
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک کپسول
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری نمایید.
در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.



- **نام فرآورده: فولایرون+زینک® (Floiron+Zinc®)**
- **نام تجاری/ برند: فولایرون+زینک® (Floiron+Zinc®)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳۰ کپسول hard gel به صورت بیلیسترهای ۱۰ عددی در کارتن باکس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
Dried ferrous sulphate	۱۵۰ mg (equivalent to ۴۸mg Fe^{+2})
Zinc sulphate	۳۰ mg (equivalent to ۴۸mg Zn^{+2})
Folic acid	mg ۲۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** -
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به جریان رشد و بهبود بافت‌ها از جمله بافت پوست و سیستم ایمنی موثر می‌باشد و در کم‌خونی ناشی از فقر آهن عامل کمکی می‌باشد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بالغین روزانه یک عدد کپسول (جهت جلوگیری از تحریک گوارشی) ترجیحاً بعد از غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** وجود هر نوع حساسیت به آهن، فولیک اسید، روی و یا موادی مانند غذا، رنگ‌ها و با مواد محافظ با پزشک و یا داروساز مشورت شود.

در صورت مصرف فرآورده دارویی دیگر از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت شود.

این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه میزان آهن آن ۶/۷ درصد بالاتر از حداکثر مقدار مجاز روزانه است می‌بایستی حتما با مشورت پزشک مصرف شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی فقط با تجویز پزشک مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت ابتلا به هرگونه کم خونی (به جز کمبود آهن) در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده
- **عوارض جانبی احتمالی:** تحریک گوارشی در این فرآورده به علت فرمولاسیون خاص به حداقل رسیده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** فرآورده‌های حاوی تترا سایکلین‌ها
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** وجود هر نوع حساسیت به آهن، فولیک اسید، روی و یا موادی مانند غذا، رنگ‌ها و با مواد محافظ با پزشک و یا داروساز مشورت شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری نمایید.

دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ملاتونین رازک**
- **نام تجاری/ برند: ملاتونین رازک**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۶۰ عدد قرص به صورت بلیسترهای ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
Melatonin	3mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** MAGNESIUM STEARATE
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
SILICON DIOXIDE
CROSCARMELLOSE SODIUM
- **رده سنی:** زیر ۱۸ سال منع مصرف دارد.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود کیفیت خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ قرص یک یا دو ساعت قبل از خواب و بعد از هر وعده غذایی توصیه می‌گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** به دلیل اثرات خواب‌آوری این فرآورده در زمان مصرف دارو از رانندگی و یا کار با ماشین‌آلات پرهیز نمایید.
بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی، قلبی و عروقی، تنفسی، نقص سیستم ایمنی و دیابت باید این محصول را تحت نظر پزشک مصرف نمایید.
در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت شود.
در صورت مصرف بیش از اندازه این فرآورده سریع با اورژانس تماس بگیرید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در زنانی که قصد باردار شدن دارند و نیز در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌گردد.
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای فراورده.
با توجه به اینکه ایمنی و اثربخشی ملاتونین در افراد زیر ۱۸ سال مورد مطالعه قرار نگرفته است. (لذا از مصرف در افراد زیر ۱۸ سال اجتناب نمایید).
- **عوارض جانبی احتمالی:** این محصول معمولا به خوبی توسط افراد تحمل می‌شود، لکن عوارض جانبی متداول شامل سردرد، سرگیجه، تحریک گوارشی، پایین‌آوردن درجه حرارت بدن (هایپوترمی) می‌باشد، که بعد از قطع مصرف فرآورده برطرف می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** ملاتونین نباید با داروهای خواب‌آور، نیفدیپین، فلووکسامین و همچنین وارفارین و سایر داروهای ضد انعقاد مصرف شود.
از مصرف همزمان این دارو با داروهای هورمونی، قرص‌های ضد بارداری، داروهای افسردگی، ضد دیابتی، خوآب‌آور و ضد انعقاد خون، قلبی- عروقی، سرکوب کننده سیستم ایمنی خودداری نمایید. مصرف همزمان موارد زیر با این فرآورده توصیه نمی‌گردد: چای، نوشیدنی‌های انرژی زا، دیگر فرآورده‌های حاوی کافئین
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** سردرد، سرگیجه، تحریک گوارشی، پایین آوردن درجه حرارت بدن (هایپوترمی) می‌باشد، که بعد از قطع مصرف فرآورده برطرف می‌شود.
در صورت مصرف بیش از اندازه این فرآورده سریع با اورژانس تماس بگیرید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در جای خشک و خنک و دور از نور و نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان قرار دهید.



- **نام فرآورده: منیزیم ۲۵۰ میلی‌گرم**
  (MANGANESIUM (AS OXIDE) ۲۵۰ MG)
- **نام تجاری/ برند: منیزیم ۲۵۰ میلی‌گرم**
  (MANGANESIUM (AS OXIDE) ۲۵۰ MG)
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۶۰ عدد قرص در یک بلیستر ۱۰ عددی در کارتن با کس به همراه بروشور پشت جعبه قرص/ ۳۰ عدد قرص در یک بلیستر ۱۰ عددی در کارتن با کس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
MAGNESIUM OXIDE	میلی‌گرم (المنتال 250 میلی‌گرم 437.767)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** CELLULOSE, MICRO-CRYSTALLINE
  ANHYDROUS CITRIC ACID
  CROSCARMELLOSE SODIUM
  SILICON DIOXIDE
  MAGNESIUM STEARATE
  WATER
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی - عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عظلات
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزی یک عدد قرص با یک لیوان پر آب، بعد از غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در بیماری‌های قلبی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.
  در صورت استفاده از دارو و یا مکمل‌های دیگر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
  از مصرف بیش از دوز توصیه شده اجتناب شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی با تجویز پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در بیماران دارای نارسایی کلیه و بیماران آریتمی قلبی
  در صورت حساسیت به هریک از اجزای این محصول
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید: حالت تهوع، استفراغ و اسهال، تشنگی، خواب‌آلودگی و ضعف عضلانی
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** حالت تهوع، استفراغ و اسهال، تشنگی، خواب‌آلودگی و ضعف عضلانی
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
  دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین + مینرال (MULTI VITAMIN + MINERAL)**
- **نام تجاری/ برند: مولتی ویتامین + مینرال (MULTI VITAMIN + MINERAL)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول/ ۶۰ عدد کپسول در بلیسترهای ۱۰ عددی در کارتن باکس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
VITAMIN A PALMITATE	3.27mg
CHOLECALCIFEROL	۴mg
DL-alpha-TOCOPHEROL ACETATE	۳۱/۵۷ mg
ASCORBIC ACID	۷۵ mg
THIAMINE HYDROCHLORIDE	۱/۵ mg
RIBOFLAVIN ۵'-PHOSPHATE SODIUM	۳/۰۴ mg
NIACINAMIDE	۲۰ mg
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE	۲mg
FOLIC ACID	۰/۴۳ mg
CYANOCOBALAMIN	۰/۰۰۶mg
FERROUS FUMARATE	۵۴ mg (المنتال ۱۵ mg)
MAGNESIUM OXIDE	۱۶۵/۸۳ mg (المنتال ۱۰۰ mg)
POTASSIUM IODIDE	۰/۱۹۶mg (المنتال ۰/۱۵ mg)
CALCIUM CARBONATE	۳۱۲/۱۶۳ mg (المنتال ۱۲۵ mg)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** MAGNESIUM STEARATE
ALCOHOL
SILICON DIOXIDE
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک کپسول بعد از وعده غذایی میل شود یا با تجویز پزشک از افزایش میزان توصیه شده خوداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مکمل‌های ریبوفلاوین رنگ ادارا را زرد می‌کند که این رنگ هیچ پیامد پاتولوژیک ندارد.
در صورت مصرف فراورده دارویی دیگر قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** این فرآورده در دوران بارداری ، شیردهی یا افرادی که احتمال بارداری دارد نباید مصرف شود مگر با تجویز پزشک

- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن حساسیت به هر یک از اجزا تشکیل‌دهنده فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید.
  این فرآورده برای کودکان زیر ۱۰ سال توصیه نمی‌گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** این فرآورده به خوبی تحمل می‌شود و عارضه جانبی رایجی برایش گزارش نشده است. توصیه می‌شود در صورت بروز احتمالی عارضه‌ای آن را به پزشک خود گزارش دهید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت استفاده از سایر داروها مانند دیورتیک‌ها، فنوباربیتال، کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون، ضدپلاکت‌ها، رتینوئیدها، سیلیکوسپورین، فلوئویوراسیل، کپسیتالبینف سولفیت‌ها، کلیتیرآمین، ضدبارداری‌های خوراکی، لوودوپا، پروبنسید، تئومایسین، آنتی اسیدها، سولفاسالارین، مایکوفنولات، پنی سیلامین و بیس فسفونات‌ها پزشک خود را مطلع سازید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد کپسول
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت بروز احتمالی عارضه‌ای آن را به پزشک خود گزارش دهید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
  دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.





- **نام فرآورده: ویتامکس® رازک (VITAMAX® RAZAK)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامکس® رازک (VITAMAX® RAZAK)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت/ ۱۲۰ میلی‌لیتری در کارتن با کس به همراه بروشور پشت جعبه**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا (هر ۵ میلی لیتر شامل)	مقدار
Vitamin B۱	5 mg
Vitamin B۲	۲ mg
Vitamin B۶	۲۰ mg
Nicotinamide	۲۰ mg
Dexpanthenol	۳ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE، SORBITOL، EDETATE DISODIUM PROPYLENE GLYCOL، PROPYLPARABEN، METHYLPARABEN، Oils, pineapple، WATER، SUCROSE
- **رده سنی:** به غیر از نوزادان و نوزادان نارس، از سنین کمتر از یک سال تا بزرگسالان و سالمندان قابل استفاده است.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به رفع کمبود برخی ویتامین‌های گروه B
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان تا یکسال : ۵ میلی لیتر یک بار در روز.
کودکان یک تا دوازده سال: ۵ میلی‌لیتر دو بار در روز.
بزرگسالان و سالمندان : ۵ میلی‌لیتر سه بار در روز.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** محلول خوراکی ویتامکس رازک یک مکمل حاوی برخی ویتامین‌های گروه B می‌باشد.
در صورت مصرف فرآورده‌های دارویی دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت شود.
در صورت مصرف تصادفی بیش از حد مجاز از این فرآورده، فوراً به پزشک مراجعه کنید.
از مصرف فرآرده پس از تاریخ انقضای ذکر شده خودداری نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی پیش از مصرف فرآورده حتما با پزشک متخصص مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** نوزادان و نوزادان نارس
حساسیت به هریک از اجزای تشکیل دهنده فرآورده.
بروز هرگونه واکنش آلرژیک بعد از مصرف فرآورده.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر فرآورده به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود اگر چه تمام عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
واکنش‌های آلرژیک به این دارو نادر است، اما اگر متوجه علائم یک واکنش شدید آلرژیک شوید؛ از جمله، بثورات پوستی، خارش/ تورم، سرگیجه شدید، مشکل تنفسی به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان موارد زیر با این فرآورده توصیه نمی‌گردد، در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید. قهوه، چای، کاربامازپین، فنی توئین،آنتی کولینرژیک (مثل: هیوسین، دیفن هیدرامین و...)، پرونپسید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** کودکان تا یکسال : ۵ میلی لیتر یک بار در روز.
کودکان یک تا دوازده سال: ۵ میلی لیتر دو بار در روز.
بزرگسالان و سالمندان : ۵ میلی لیتر سه بار در روز.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف تصادفی بیش از حد مجاز این فرآورده،فورا به پزشک مراجعه نمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین د۳ (VITAMIN D۳)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین د۳ (VITAMIN D۳)**
- **شرکت صاحب پروانه: لابراتوارهای رازک**
- **تولیدشده در: لابراتوارهای رازک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص/ ۳۰ عدد قرص در بلیستر ۱۰ عددی در جعبه به همراه بروشور پشت جعبه**

قرص/ ۶۰ عدد قرص در بلیستر ۱۰ عددی در جعبه به همراه بروشور پشت جعبه

- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**


اجزا	مقدار
CHOLECALCIFEROL	۱۰۰۰ INTERNATIONAL UNITS

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** SILICON DIOXIDE
MAGNESIUM STEARATE
CHOLECALCIFEROL
CROSCARMELLOSE SODIUM
- **رده سنی:** افراد بالای ۱۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** ویتامین D۳ چندین عملکرد مهم در بدن دارد که مهمترین آنها کمک به جذب کلسیم و فسفر و بهبود عملکرد سیستم ایمنی است.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** افراد بالای ۱۲ سال روزانه یک عدد قرص بعد از وعده غذایی مصرف نمایند یا با تجویز پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف دارو و یا مکمل‌های دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** این مکمل غذایی در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت داشتن حساسیت و نشان دادن واکنش آلرژیک به مواد تشکیل‌دهنده فرآورده از مصرف آن اجتناب نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت خارج نشدن از دوز پیشنهادی عوارض قابل ملاحظه‌ای ندارد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت استفاده از سایر داروها مانند دیگوکسین، هیدروکلروتیازید، کاربامازپین، فس فنی توئین، فنی توئین، فنوباربیتال، پریمیدون، کتوکونازول و کلوتریمازول پزشک خود را مطلع نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** روزانه یک عدد قرص
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک به دور از نور و رطوبت و دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

SAMAN PHARMED
POUYA

شرکت داروسازی سامان فارمد پویا





- **نام فرآورده: سام زینک پلاس® SAMZINC plus®**
- **نام تجاری/ برند: سام زینک پلاس® SAMZINC plus®**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سامان فارمد پویا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی خوارزمی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: جعبه حاوی ۶۰ عدد قرص روکش‌دار به صورت بلیسترهای ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص	RDA٪
Zinc gluconate	۱۰۵ mg	
Biotin	۱۵۰ mcg	۵۰۰
Vitamin B۱	۱۰ mg	۱۱۱
Vitamin B۲	۱۰ mg	۱۱۱
Vitamin B۳	۲۰ mg	۱۶۷
Vitamin B۶	۳ mg	۲۳۱
Vitamin B۱۲	۱۰ mcg	۵۵۵
Calcium D pantothenate	۵۰ mg	۴۶۰
Folic acid	۵۰۰ mcg	۱۲۵
Vitamin C	۱۵۰ mg	۱۶۷

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کراس کارملوز، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به حفظ سلامت پوست و مو ناخن
کمک به تامین ویتامین‌های گروه ب
کمک به حفظ سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با غذا و یا همراه با یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت حساسیت به هریک از اجزای فرآورده این محصول، ابتلا به بیماری‌های کلیوی و کبدی تحت نظارت پزشک مصرف شود.
این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت تجویز پزشک قابل مصرف است.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** به طور کلی قرص سام زینک پلاس ایمن بوده و توسط اغلب افراد به خوبی تحمل می‌شود.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر فرآورده‌های دارویی با پزشک یا داروساز قبل از مصرف این فرآورده مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** یک عدد
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایینتر از ۳۰ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ویتامین ث جوشان**
- **نام تجاری/ برند: ویتامین ث جوشان**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سامان فارمد پویا**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی خوارزمی**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی حاوی ۲۰ عدد قرص جوشان با طعم پرتقال**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص	NRV٪
Vitamin C	۱۰۰۰ mg	


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، بیکربنات سدیم، سوربیتول، PEG، سوکرالوز، PVP، ریبوفلاوین، طعم‌دهنده پرتقال
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به عملکرد و تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمیم زخم‌ها و حفاظت بدن در برابر عوامل اکسیداتیو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص جوشان در یک لیوان آب حل کرده و سپس میل کنید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت داشتن سابقه حساسیت به ویتامین C، غذاها و همچنین سابقه داشتن سنگ کلیه با پزشک یا داروساز قبل از شروع مصرف مشورت کنید.
در صورت مصرف سایر فرآورده‌های دارویی دیگر قبل از شروع مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت تجویز پزشک قابل مصرف است.

- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** ویتامین C سمیت بسیار کمی دارد و حتی در دوزهای بالا نیز عوارض جانبی جدی ایجاد نمی‌کند.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۲۰۰۰ میلی‌گرم در بزرگسالان
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** عوارض نادر (با مصرف دوز بالا): اسهال، تهوع، کرامپ‌های شکمی و معده‌ای، در صورت بروز هر یک از علائم به پزشک مراجعه فرمایید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه و دور از دسترس کودکان و نور نگهداری شود

STD

سمرطب درمان

شرکت داروسازی سمر طب درمان





- **نام فرآورده:** آپوویتال آ + د
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL A+D
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس آلمان Euro OTC Pharma GmbH
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قطره خوراکی (با طعم پرتقال)- ۳۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر میلی‌لیتر
ویتامین A (۱۵۰۰ واحد بین‌المللی)	۴۵۰ میکروگرم
ویتامین D (۴۰۰ واحد بین‌المللی)	۱۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسرول، پروپیلن گلایکول، پلی سوربات 80، سوکرالوز، پروپیل پارابن، متیل پارابن، دی سدیم ادتات، بوتیل هیدروکسی تولوئن
- **رده سنی:** کودکان- نوجوانان - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین A و D مورد نیاز بدن، سلامت بینایی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک میلی‌لیتر. قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** احتمال بروز اثرات ملین وجود دارد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قطره آ+د استارول
- **نام تجاری/ برند:** STAR WELL A+D DROP
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Phyteo laboratoire فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قطره خوراکی- ۳۰ میلی لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر میلی‌لیتر
D۳ ویتامین	۴۰۰ واحد بین‌المللی
A ویتامین	۱۵۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسانس طبیعی پرتقال، آب، سوکرالوز، پلی سوربات ۸۰
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین A و D مورد نیاز بدن، سلامت بینایی و استخوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک میلی‌لیتر، قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** احتمال بروز اثرات ملین وجود دارد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده: : Folsaure ۸۰۰**
- **نام تجاری/ برند: : Apovital Folsaure ۸۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: شـرکت هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH آلمـان**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: قـرص - ۳۰ عـدد بـه صـورت یـک بلیسـتر ۳۰ عـددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص ۸۰۰ میکروگرم
فولیک اسید	۸۰۰ میکروگرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** کلسـیم فسـفات، سـدیم کربوکسـی متیـل سـلولز، اسـیدهای چـرب نمـک منیزیـم، روغـن کانـولا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن اسـید فولیـک مـورد نیـاز در دوران بـارداری
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد قـرص همـراه بـا غـذا یـا مقـدار کافـی آب میـل شـود. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** در صـورت مصـرف همزمـان بـا داروهـای ضـد سـرطان ماننـد متوترکسـات و ضـد تشـنج بـا پزشـک و یـا دکتـر داروسـاز مشـورت گـردد. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان و پیشـگیری از بیمـاری نمی‌باشـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** ایـن مکمـل طبـق اطلاعـات درج شـده در بروشـور فـرآورده بـرای خانـم هـای در سـنین بـاروری و خانـم هـای بـاردار می‌باشـد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** در صـورت مصـرف همزمـان بـا داروهـای ضـد سـرطان ماننـد متوترکسـات و ضـد تشـنج بـا پزشـک و یـا دکتـر داروسـاز مشـورت گـردد.
- **ما کزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه سـانتیگراد و دور از دسـترس اطفـال نگهداری شـود.



- **نام فرآورده: : فرش مورنینگ مگا مگ ۴۰۰**
- **نام تجاری/ برند: : FRESH MORNING MEGA MAG- ۴۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: شـرکت پراریـن پـارس تحـت لیسـانس Welfare Nutrition بلژیـک**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: ساشـه دایرکـت بـا طعـم پرتقـال - ۳۰ عـدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ساشه
منیزیم	۴۰۰ میلی‌گرم
B۶ ویتامین	۶ میلی‌گرم
B۱۲ ویتامین	۳ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم


- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** لاکتـوز، مالتودکسـترین، سـیتریک اسـید، سـدیم سـیترات، سـوکرالوز، سـوربیتول، سـدیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه حفـظ عملکـرد طبیعـی عضـلات و سیسـتم عصبـی، کمـک بـه افزایـش سـطح انـرژی و کاهـش احسـاس خسـتگی.
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد ساشـه را بـاز کـرده و محتـوای آن را بـه طـور مسـتقیم روی زبـان ریختـه و پـس از چنـد ثانیـه بلعیـده شـود. ایـن فـراورده قابلیـت جـذب دهانـی دارد و نیـاز بـه حـل کـردن در آب نـدارد. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **هشـــدار و احتیاطهـــا:** در دوران بـارداری یـا شـیردهی، بـا توصیـه پزشـک یـا داروسـاز مصـرف گـردد. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان و پیشـگیری از بیمـاری نمی‌باشـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** بـا توصیـه پزشـک یـا داروسـاز مصـرف گـردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه سـانتیگراد، دور از نـور و دسـترس کـودکان نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: : استارویت مولتی ویتامین دراپ**
- **نام تجاری/ برند: : STAR VIT MULTIVITAMIN DROP**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Welfare Nutrition کشور فرانسه**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره با طعم پرتقال و زردآلو - ۳۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ساشه
A (IU ۱۵۰۰) ویتامین	۴۵۰ میکروگرم
B۱ ویتامین	۰/۶ میلی‌گرم
B۲ویتامین	۰/۷ میلی‌گرم
B۳ویتامین	۴ میلی‌گرم
B۵ویتامین	۱/۸ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۰/۴ میلی‌گرم
B۸ویتامین	۷/۵ میکروگرم
B۹ ویتامین	۱۵۰ میکروگرم
B۱۲ویتامین	۱ میکروگرم
C ویتامین	۴۰ میلی‌گرم
D۳ (IU ۴۰۰) ویتامین	۱۰ میکروگرم
Eویتامین	۶ میلی‌گرم
K۱ویتامین	۱۱/۲۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلوکز، گلیسرین، عصاره زردآلو، اسانس طبیعی پرتقالی، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوئیک اسید، اسید سیتریک مونوهیدرات.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن در کودکان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک میلی‌لیتر به همراه غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود. قبل از مصرف تکان داده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است. قبل از مصرف تکان دهید.



- **نام فرآورده: : آپوویتال ویتامین D۳ (۱۰۰۰ واحد بین‌المللی)**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL VITAMIN D۳ ۱۰۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت ۱ بلیستر ۳۰ تایی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
ویتامین D (۱۰۰۰ واحد بین‌المللی)	۲۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، لاکتوز مونوهیدرات، سدیم کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، اسیدهای چرب نمک منیزیم، پلی اتیلن گلیکول، سیلیکون دی اکساید، تالک، تیتانیوم دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه آب و غذا میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده، خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف داروهای کاهنده چربی خون (استاتین‌ها) و کورتیکواستروئیدها و در دوران بارداری یا شیردهی مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای کاهنده چربی خون (استاتین‌ها) و کورتیکواستروئیدها و در دوران بارداری یا شیردهی مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک، دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: : فیشر کیندر آسرولا**
- **نام تجاری/ برند: FISHER KINDER ACEROLA**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت - ۲۰۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
آسرولا	۳۵۰ میلی‌گرم
عصاره باک‌ثورن	۱۱۵ میلی‌گرم
ویتامین C	۸۲/۵۰ میلی‌گرم
ویتامین B1	۰/۸۰ میلی‌گرم
ویتامین B2	۱/۰۰ میلی‌گرم
B3 ویتامین	۱۲/۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B12	۲/۰۰ میکروگرم
ویتامین D3	۱۵/۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، اسانس پرتقال، صمغ زانتان
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال، نوجوانان، بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** منبع غنی ویتامین c، دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و کمک به تقویت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۳ تا ۱۲ سال: روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، نوجوانان و بزرگسالان: روزانه ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر، قبل از مصرف شیشه را به آرامی تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده: : فیشر کیندر ال-آرژینین +**
- **نام تجاری/ برند: FISHER KINDER L-ARGININE+**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت (با طعم پرتقال) - ۲۰۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
ال - آرژینین	۲۰۰ میلی‌گرم
ویتامین A	۲۴۰ میکروگرم
ویتامین B۲	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامینC	۲۰ میلی‌گرم
ویتامینD۳	۱۰ میکروگرم
ویتامینK۲	۵ میکروگرم
کلسیم کربنات	۱۲۰ میلی‌گرم
زینک گلوکونات	۴ میلی‌گرم
ید	۷۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، سوکرالوز، گلیسرول، پلی سوربات80، اسانس طبیعی پرتقالی، زانتان گام، سدیم بنزوات، پتاسیم یدید، سیتریک اسید، پتاسیم سوربات، EDTA.
- **رده سنی:** کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت و رشد کودکان و نوجوانان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۳ تا ۱۲ سال: روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، نوجوانان و بزرگسالان: روزانه ۵ تا۱۰ میلی‌لیتر، قبل از مصرف شیشه را به آرامی تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در دوران بارداری و شیردهی و در صورت مصرف داروهای کاهنده فشارخون با پزشک یا دکتر داروساز مشورت گردد. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با پزشک یا دکتر داروساز مشورت گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای کاهنده فشارخون و ضد انعقاد، با پزشک یا دکتر داروساز مشورت گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک، دوراز دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری، در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده: آپوویتال ال-آرژینین ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL L-ARGININ ۱۰۰۰**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت پراریـن پارس تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
ال - آرژینین	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک‌های منیزیم
- **رده سنی:** کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به عضله‌سازی، تحریک ترشح هورمون رشد، تقویت سیستم ایمنی، گشادی عروق، افزایش جریان خون و تقویت قوای جنسی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف داروهای حاوی نیترات، رقیق‌کننده خون یا داروهایی جهت اختلالات نعوظ، قبل از مصرف با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: : آپوویتال کپسول امگا ۳**
- **نام تجاری/ برند: KAPSELN ۳ APOVITAL OMEGA**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی مینو تحت لیسانس کارخانه Euro OTC Pharma GmbH کشور آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۳۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
اسیدهای چرب امگا -۳ شامل: EPA DHA	۵۰۰ میلی‌گرم ۱۸۱ میلی‌گرم ۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۲ میلی‌گرم (α - TE)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، گلیسرول
- **رده سنی:** کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به کاهش کلسترول و سلامت قلب و عروق و کمک به کاهش التهاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: آپوویتال امگا ۳ لبرترن**
- **نام تجاری/ برند: LEBERTRAN ۳ APOVITAL OMEGA**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت - ۱۵۰ میلی لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
اسیدهای چرب امگا-۳ شامل: EPA (Eicosapentanoic acid) DHA (Docosahexanoic acid)	۱۲۰۰ میلی‌گرم ۴۵۰ میلی‌گرم ۵۹۰ میلی‌گرم
ویتامین A (۸۳۳ واحد)	۲۵۰ میکروگرم RE
ویتامین D (۴۰۰ واحد)	۱۰ میکروگرم
ویتامین E	۱۰ میلی‌گرم α - TE

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسانس طبیعی پرتقال
- **رده سنی:** کودکان ۴ سال به بالا، نوجوانان، جوانان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن، کمک به تقویت سیستم ایمنی، کمک به رشد ذهنی و جسمی در کودکان و نوجوانان.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ سال به بالا و نوجوانان و جوانان روزانه ۵ میلی‌لیتر، قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه ی حساسیت مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز استفاده شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: : آپوویتال انرژی**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL ENERGY**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت پراریـن پـارس تحـت لیسـانس شـرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمـان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر عدد قرص جوشان
تائورین	۱۰۰۰ میلی‌گرم
کافئین	۵۰ میلی‌گرم
گلوکورونولاکتون	۶ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۵/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۱/۸ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۳ میکروگرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** سـوکرالوز، سـیتریک اسـید، سـدیم بیکربنـات، لاکتـوز مونوهیـدرات، PVP، اسـانس پرتقـال، ال-لوسـین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن انـرژی بـدن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد قـرص داخـل یـک لیـوان آب حـل و سـپس میـل شـود. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده حـاوی کافئیـن می‌باشـد، لـذا مصـرف آن در کـودکان و در دوران بـارداری و شـیردهی توصیـه نمی‌شـود. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** در دوران بـارداری و شـیردهی مصـرف ایـن فـرآورده توصیـه نمی‌شـود.
- **موارد منع مصرف:** مصرف در کودکان توصیه نمی‌شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنـک (دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: : آپوویتال آیزن تروپفن فور کیدز**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL EISENTROPFEN FUR KIDS**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره خوراکی (با طعم وانیل) - ۳۰ میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر عدد قرص جوشان
آهن	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسرول، آب، سوربیتول، سدیم بنزوات، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سوکرالوز، سیتریک اسید
- **رده سنی:** کودکان زیر ۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز و پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان زیر ۲ سال روزانه ۱ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا مدت یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده: : آپوویتال آیزن تبلت**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL EISEN TABLETTEN**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر عدد قرص
آهن	۲۰ میلی‌گرم
C ویتامین	۲۰۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۵۰ میکروگرم
B۶ ویتامین	۶ میلی‌گرم
B۱۲ویتامین	۳/۳ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نمک‌های منیزیم، روغن نارگیل، سیلیکون دی اکساید، اکسید و هیدروکسید آهن، پلی اتیلن گلیکول.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به خون‌سازی، تامین انرژی و رفع ضعف و خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص ترجیحا همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با فراورده‌های حاوی روی و کلسیم توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: : آپوویتال آیزن سافت**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL EISENSAFT**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت (با طعم تافی) ۲۰۰- میلی‌لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار
C ویتامین	۲۴ میلی‌گرم
B1 ویتامین	۲/۲ میلی‌گرم
B2 ویتامین	۱/۴ میلی‌گرم
نیاسین	۱۰ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲ میلی‌گرم
B۶ ویتامین	۴ میلی‌گرم
B۱۲ ویتامین	۵ میکروگرم
فولیک اسید	۳۰۰ میکروگرم
(آهن (فروس سولفات	۱۴ میلی‌گرم
(مس (کوپریک گلوکونات	۲۰۰ میکروگرم
منگنز گلوکونات	۳۰۰ میکروگرم
ید	۶۰ میکروگرم
زینک گلوکونات	۳ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** آب، گلوکز، سیتریک اسید، صمغ زانتان، طعم‌دهنده، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، پلی سوربات80، آسولفام پتاسیم، سوکرالوز، ساخارین.
- **رده سنی:** کودکان - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** موثر در خون‌سازی و افزایش متابولیسم انرژی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۱۰-۴ سال، روزانه ۲/۵ میلی‌لیتر کودکان بالاتر از ۱۱ سال و بزرگسالان: روزانه ۵ میلی‌لیتر. قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در محیط خشک، دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری، فرآورده حتما داخل یخچال نگهداری و به مدت ۳ ماه قابل مصرف می باشد.



- **نام فرآورده:** آپوویتال ایمو اکتیو فمیلی
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL IMMU AKTIV FAMILY
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت (با طعم پرتقال)- ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
D ویتامین (۴۰۰ IU)	۱۰ میکروگرم
A ویتامین	۲۵۰ میکروگرم
B1 ویتامین	۰/۸ میلی‌گرم
B۶ ویتامین	۰/۸ میلی‌گرم
نیاسین	۱۰ میلی‌گرم
B۱۲ ویتامین	۰/۹ میکروگرم
بیوتین	۱۵ میکروگرم
پنتوتنیک اسید	۳ میلی‌گرم
آهن	۸ میلی‌گرم
روی	۵ میلی‌گرم
منگنز	۱ میلی‌گرم
مس	۰/۶ میلی‌گرم
سلنیوم	۲۰ میکروگرم
ید	۵۰ میکروگرم
کروم	۸ میکروگرم
منیزیم	۵۶ میلی‌گرم
کولین	۱۰ میلی‌گرم
ال کارنیتین	۵ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، گلیسرول، پلی سوربات80، صمغ زانتان، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، سوکرالوز.
- **رده سنی:** کودکان ۴ سال به بالا، نوجوانان، بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت عملکرد سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ تا ۱۰سال روزانه ۵ میلی‌لیتر، کودکان ۱۱ سال به بالا، نوجوانان و بزرگسالان روزانه ۱۰ میلی‌لیتر. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در دوران بارداری و شیردهی، مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور ازنور و دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب شیشه فراورده حتما داخل یخچال نگهداری و در مدت ۳ ماه مصرف شود.



- **نام فرآورده: : استارویت ایمیونیتی**
- **نام تجاری/ برند: STARVIT IMMUNITY**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول آهسته رهش ٦٠ عدد به صورت ٤ بلیستر ١٥ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر عدد کپسول
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
زینک	۱۵ میلی‌گرم
C ویتامین	۳۵۰ میلی‌گرم
D۳ویتامین	۸۰۰ واحد بین‌المللی
Eویتامین	۱۲ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** شکر، اتیل سلولز، پوویدون K30، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، آب مقطر، ایزوپروپیل الکل
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت ب کمپلکس جویس
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT B COMPLEX JUICE
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Welfare Nutrition فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت (با طعم موز) ۲۰۰ میلی لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
B۳ ویتامین	۱۶ میلی‌گرم
اینوزیتول	۱۰ میلی‌گرم
لیزین	۱۰ میلی‌گرم
B۵ویتامین	۶ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۱/۷۳ میلی‌گرم
B۲ویتامین	۱/۴ میلی‌گرم
B۱ویتامین	۱/۱ میلی‌گرم
B۹ویتامین	۲۰۰ میکروگرم
B۸ویتامین	۵۰ میکروگرم
B۱۲ویتامین	۱۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلیسیرین، اسانس موز، سیتریک اسید، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، سوکرالوز، پلی سوربات 80، تری سدیم سیترات دهیدرات، ادتات، دی سدیم سوربیتول
- **رده سنی:** کودکان - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین‌های گروه B مورد نیاز بدن و سلامت سیستم عصبی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۳ تا ۱۲ سال: روزانه ۵ میلی‌لیتر، کودکان ۱۲ سال به بالا و بزرگسالان روزانه ۱۰ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک، قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** آپوویتال بیوتین
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL BIOTIN
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۳۰ عدد به صورت ۱ بلیستر ۳۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص
بیوتین	۲۵۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز مونوهیدرات، میکروکریستالین سلولز، پلی وینیل پیرولیدون K30، کراس پویدون، نمک‌های منیزیم.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت بیوتین
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT BIOTIN
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۶۰ عدد - داخل قوطی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص
بیوتین - D	۲۵۰۰ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** اسیدهای چرب مونو و دی گلیسیرید، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت و حفظ سلامت پوست، مو و ناخن.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص ما بین غذا با میزان کافی آب یا مطابق دستور پزشک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه حساسیت به هریک از اجزای قرص، مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** فیشر کیندر رویال ژلی
- **نام تجاری/ برند:** FISHER KINDER ROYAL JELLY
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت فیشر بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
رویال ژلی	۱۰۰ میلی‌گرم
پروپولیس	۱۰۰ میلی‌گرم
روی	۵ میلی‌گرم
A ویتامین	۸۳۳ واحد بین‌المللی
D۳ ویتامین	۲۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** شکر، طعم دهنده پرتقالی، زینک گلوکونات، صمغ زانتان، سیتریک اسید، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال، نوجوانان و بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تقویت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، نوجوانان و بزرگسالان روزانه ۵-۱۰ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک، قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در کودکان زیر۲ سال و افراد مبتلا به آسم و آلرژی مناسب نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** EH ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی دانا تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی نرم - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
B1ویتامین	۱/۴۶ میلی‌گرم
C ویتامین	۱۰۰ میلی‌گرم
زینک سیترات	۱۵ میلی‌گرم
B2ویتامین	۱/۵۸ میلی‌گرم
B3ویتامین	۹/۴۵ میلی‌گرم
B5ویتامین	۹/۵ میلی‌گرم
B6ویتامین	۱/۶۹ میلی‌گرم
B8ویتامین	۲۰۰ میکروگرم
B9ویتامین	۲۱۰ میکروگرم
B12ویتامین	۳میکروگرم
پاپا	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن آفتابگردان، ژلاتین، گلیسرول، لسیتین، تیتانیوم دی اکساید، آیرون اکساید، موم زنبور عسل.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو، ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه حساسیت مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت زینک پلاس ۱۰ میلی‌گرم سافت ژل
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT ZINC PLUS ۱۰ MG SOFTGEL
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی مینو تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی نرم - ۶۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
زینک	۱۰ میلی‌گرم
B۱ویتامین	۱/۴۶ میلی‌گرم
B۲ویتامین	۱/۵۸ میلی‌گرم
B۳ویتامین	۹/۴۵ میلی‌گرم
B۵ویتامین	۹/۵ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۱/۶۹ میلی‌گرم
B۸ویتامین	۲۰۰ میکروگرم
B۹ویتامین	۲۱۰ میکروگرم
B۱۲ویتامین	۳ میکروگرم
Cویتامین	۱۰۰ میلی‌گرم
پاپا	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** روغن دانه آفتاب گردان، روغن سویا، ژلاتین، گلیسرول، موم عسل، لسیتین، اکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت زینک پلاس ۱۵ میلی‌گرم
- **نام تجاری/ برند:** MG ۱۵ STAR VIT ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص
زینک	۱۵ میلی‌گرم
B۱ ویتامین	۱۰ میلی‌گرم
B۲ویتامین	۱۰ میلی‌گرم
B۳ویتامین	۳۰ میلی‌گرم
B۵ویتامین	۵۰ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۳ میلی‌گرم
B۸ ویتامین	۱۰۰ میکروگرم
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
B۱۲ویتامین	۱۵ میکروگرم
Cویتامین	۱۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** مونو و دی گلیسرید اسید چرب، منیزیم استئارات، میکروکریستالین سلولز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت زینک پلاس ۱۵میلی‌گرم سافت ژل
- **نام تجاری/ برند:** SOFTGEL STAR VIT ZINC PLUS ۱۵ MG
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی مینو تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی نرم - ۶۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
زینک	۱۵ میلی‌گرم
B1 ویتامین	۱/۴۶ میلی‌گرم
B2ویتامین	۱/۵۸ میلی‌گرم
B3ویتامین	۹/۴۵ میلی‌گرم
B5ویتامین	۹/۵ میلی‌گرم
B6ویتامین	۱/۶۹ میلی‌گرم
B8ویتامین	۲۰۰ میکروگرم
B9ویتامین	۲۱۰ میکروگرم
B12ویتامین	۳ میکروگرم
Cویتامین	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** روغن دانه آفتاب گردان، ژلاتین،گلیسیرین، موم زنبور عسل، لسیتین، اکسید آهن.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول یا میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین)، فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استار ول زینک پلاس لیکوئید
- **نام تجاری/ برند:** STAR WELL ZINC PLUS LIQUID
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Phyteo laboratoire فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
Cویتامین	۶۰ میلی‌گرم
B۱ویتامین	۰/۶ میلی‌گرم
B۲ویتامین	۰/۶ میلی‌گرم
B۳ویتامین	۸ میلی‌گرم
B۵ویتامین	۲/۵ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۱ میلی‌گرم
B۷ ویتامین	۰/۰۲ میلی‌گرم
B۸ویتامین	۲۰ میکروگرم
B۹ویتامین	۰/۱۵ میلی‌گرم
B۱۲ویتامین	۲ میکروگرم
زینک	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، گلیسیرین، سوکرالوز، لیمونن، سیتریک اسید، صمغ زانتان، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات.
- **رده سنی:** کودکان ۲سال به بالا - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست و مو، ناخن و سلامت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۲ تا ۷سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، کودکان ۷ تا ۱۳ سال یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر) دو بار در روز، افراد ۱۳ سال به بالا یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر) سه بار در روز یا مطابق دستور پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین)، فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** استار ویت زینک پلاس جویس
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT ZINC PLUS JUICE
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت (با طعم پرتقال) - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
C ویتامین	۶۰ میلی‌گرم
B1ویتامین	۰/۶ میلی‌گرم
B2ویتامین	۰/۶ میلی‌گرم
B3ویتامین	۸ میلی‌گرم
B5ویتامین	۲/۵ میلی‌گرم
B6ویتامین	۱ میلی‌گرم
B8ویتامین	۲۰ میکروگرم
B9ویتامین	۱۵۰ میکروگرم
B12ویتامین	۲ میکروگرم
زینک	۵ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، گلیسیرین، سوکرالوز، اسانس طبیعی پرتقال، سیتریک اسید، صمغ زانتان، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات
- **رده سنی:** کودکان بالای ۲ سال - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو، ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان۷-۲ سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، کودکان ۱۳-۷ سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر) دوبار در روز، افراد ۱۳ سال به بالا یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر) سه بار در روز یا مطابق دستور پزشک.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** استارویت زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** STARVIT ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی سخت - ٦٠ عدد به صورت ٤ بلیستر ١٥ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
زینک	۱۵ میلی‌گرم
PABA	۳۰ میلی‌گرم
بیوتین	۴۵۰ میکروگرم
نیکوتینامید	۱۲ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
C ویتامین	۸۰ میلی‌گرم
B1 ویتامین	۱/۶ میلی‌گرم
B۶ویتامین	۳ میلی‌گرم
B۱۲ویتامین	۳ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکارز، تالک، اتیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف آنتی بیوتیک‌ها از خانواده تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین به علت کاهش میزان جذب روی در بدن، ۲ ساعت قبل یا ۴ الی ۶ ساعت بعد از مصرف این فراورده صورت گیرد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** فیشر فلکسان زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** FISHER FLEXAN ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی مینو تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی نرم - ۶۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
زینک سولفات	۱۵ میلی‌گرم
C ویتامین	۱۰۰ میلی‌گرم
B1ویتامین	۱/۴۶ میلی‌گرم
B2ویتامین	۱/۵۸ میلی‌گرم
B3ویتامین	۹/۴۵ میلی‌گرم
B5ویتامین	۹/۵ میلی‌گرم
B6ویتامین	۱/۶۹ میلی‌گرم
B8 ویتامین	۲۰۰ میکروگرم
B9 ویتامین	۲۱۰ میکروگرم
B12ویتامین	۳ میکروگرم
Paba	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن آفتابگردان، ژلاتین، گلیسرول، موم زنبور عسل، لسیتین، تیتانیوم دی اکساید، آهن اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت وجود سابقه حساسیت و در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** فورت ایی زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** FORTE E ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت میم دارو
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۳۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص
زینک	۱۵ میلی‌گرم
بیوتین	۱۰۰ میکروگرم
فولیک اسید	۵۰۰ میکروگرم
B1 ویتامین	۱۰ میلی‌گرم
B2ویتامین	۱۰ میلی‌گرم
B3ویتامین	۳۰ میلی‌گرم
B6ویتامین	۳ میلی‌گرم
B12ویتامین	۱۵ میکروگرم
B5ویتامین	۵۰ میلی‌گرم
Cویتامین	۱۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون K30، کراس کارملوز سدیم، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، آب
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت پوست، مو، ناخن و سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص ما بین غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** فیشر کیندر زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** FISHER KINDER ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۱۰ میلی‌لیتر
زینک	۱۰ میلی‌گرم
Cویتامین	۱۲۰ میلی‌گرم
B1ویتامین	۱/۲ میلی‌گرم
B2ویتامین	۱/۲ میلی‌گرم
B3ویتامین	۱۶ میلی‌گرم
B5ویتامین	۵ میلی‌گرم
B6ویتامین	۲ میلی‌گرم
(۸ (بیوتینBویتامین	۴۰ میکروگرم
(۹ (فولیک اسیدBویتامین	۳۰۰ میکروگرم
B12ویتامین	۴ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ساکارز، اسانس پرتقال، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سدیم بنزات، سیتریک اسید.
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال، نوجوانان، بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم ایمنی، و تامین ویتامین‌های گروه B شد جسمی و کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** گروه سنی ۱۲-۳ سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، نوجوانان روزانه ۵-۱۰ میلی لیتر
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** آپوویتال زینک سافت
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL ZINKSAFT
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر ۵ میلی‌لیتر
C ویتامین	۴۰ میلی‌گرم
زینک گلوکونات	۵ میلی‌گرم
نیاسین	۴ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲ میلی‌گرم
B۲ ویتامین	۰/۶۵ میلی‌گرم
B۶ ویتامین	۰/۶۵ میلی‌گرم
B۱ ویتامین	۰/۶۰ میلی‌گرم
فولیک اسید	۱۵۰ میکروگرم
بیوتین	۲۰ میکروگرم
B۱۲ویتامین	۲ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** دکستروز، طعم دهنده پرتقالی، سوربیتول، صمغ زانتان، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، اسید سیتریک، آس سولفام، ساخارین
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو، ناخن، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۵ میلی‌لیتر
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در محیط خشک، دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری، فرآورده حتما داخل یخچال نگهداری و به مدت ۱ ماه قابل مصرف می‌باشد.



- **نام فرآورده:** آپوویتال سلن پلاس
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL SELEN PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی مینو تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول ژلاتینی نرم - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر کپسول
C ویتامین	۱۲۵ میلی‌گرم
Eویتامین	۴۰ میلی‌گرم
زینک	۸ میلی‌گرم
(۱۳۳۳ واحد بین‌المللی) A ویتامین	۴۰۰ میکروگرم
سلنیوم	۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن سویا، گلیسرول، لسیتین سویا، آهن اکساید و سدیم سلنات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت و حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و تقویت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه غذا با مقدار کافی آب میل شود
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** استارویت سلن پلاس
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT SELEN+
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در هر قرص
سلنیوم	۱۲۰ میکروگرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
C ویتامین	۱۲۵ میلی‌گرم
Eویتامین	۴۰ میلی‌گرم
Aویتامین	۴۰۰ میکروگرم
D۳ویتامین	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، مونو و دی گلیسریدهای اسید چرب، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت سیستم ایمنی و تقویت و حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه حساسیت به هریک از اجزای قرص، مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین)، فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

- **نام فرآورده:** قطره فروزن استارویت
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT FERROSEN DROP
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Welfare Nutrition کشور فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قطره با طعم پرتقال ۳۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	مقدار در هر میلی‌لیتر
آهن	۷ میلی‌گرم
B۱۲ ویتامین	۱/۲۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلوکز، گلیسرین، طعم دهنده پرتقالی، اسید لاکتیک، صمغ زانتان، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان زیر ۲ سال روزانه یک میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک. قبل از مصرف تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با فرآورده‌های حاوی روی و کلسیم توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** استار ویت فروزن جویس
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT FERROSEN JUICE
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** شرکت هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Welfare Nutrition فرانسه
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت (با طعم پرتقال) - ۲۰۰ میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	مقدار در ۵ میلی‌لیتر
آهن پیروفسفات لیپوفر (لیپوزومال)	۲۰ میلی‌گرم
B۶ ویتامین	۳ میلی‌گرم
B۱۲ ویتامین	۲/۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** گلوکز، فروکتوز، گلیسرین، طعم دهنده پرتقالی، لاکتیک اسید، زانتان گام، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، آب
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال، نوجوانان، بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۳-۱۰ سال روزانه ۲/۵ میلی‌لیتر، کودکان ۱۰ سال به بالا، نوجوانان و بزرگسالان روزانه ۵ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک.
قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده: فیشرکیندرفرومین**
- **نام تجاری/ برند: FISHER KINDER FERROMIN**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بندی: قـرص - ۳۰ عـدد به صورت ۲ بلیسـتر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: : میزان در ۵ میلی لیتر:**

جز	مقدار
ویتامین D۳	۱۰ میکروگرم
ویتامین E	۴۰ میلی‌گرم
کلسیم	۲۴۶ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۲۰ میکروگرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
مس	۱ میلی‌گرم
منگنز	۴ میلی‌گرم
سلنیوم	۱۲۰ میکروگرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
کلاژن هیدرولیزه	۳۰۰ میلی‌گرم
عصاره زنجبیل	۸۰ میلی‌گرم
کندرویتین سولفات	۱۰۰ میلی‌گرم
گلوکزامین سولفات	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** هیدروکسـی پروپیل متیل سـلولز، سـدیم کربوکسـی متیـل سـلولز، تیتانیـوم دی اکسـاید، نمک هـای منیزیـم، سـیلیکون دی اکسـاید، گلیسـرول، تالـک، پلـی اتیلن گلا یکو ل
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به عملکرد طبیعـی غضروف، اسـتخوان و عضلات بدن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزی ۲ عـدد قـرص ترجیحـا همـراه بـا آب و غـذا میـل شـود. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص ، درمـان و پیشـگیری از بیماری نمی‌باشـد. بـه علت وجود گلوکزامیـن کنتـرل قنـد خـون در افـراد دیابتـی توصیه می شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابق دسـتور پزشـک یا داروسـاز مصرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جای خشـک و در دمـای پایین تر از ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد ، دور از دسـترس اطفال نگهداری شـود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال فلکساویت
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL FLEXAVIT
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشـده در:** هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH آلمـان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** شربت - ۲۰۰ میلی لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار
آهن	۱۲ میلی‌گرم
مس	۰/۴ میلی‌گرم
ویتامین A	۲۵۰ میکروگرم
ویتامین B۲	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامین B۹	۱۰۰ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۲ میکروگرم


- **اجـزای غیرفعال فرآورده (اکسـیپانت):** زانتان گام، سـیتریک اسـید، پتاسـیم سـوربات، سـدیم بنـزوات، طعـم دهنده میـوه ای، سـوکرالوز، گلیسـرین، پلی سـوربات
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال - نوجوانان - بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک بـه تامیـن آهن مـورد نیاز بـدن، بهبود عملکرد سیسـتم ایمنـی و رفع خستگی
- **دسـتور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۱۲-۳ سـال روزانه یک قاشـق مرباخـوری(۵ میلـی لیتـر)، نوجوانـان و بزرگسـالان روزانـه دو قاشـق مرباخـوری(۱۰) میلـی لیتـر میـل شـود. قبل از مصـرف شیشـه را تکان دهید.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفا مکمل بـوده و جهت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابق دسـتور پزشـک یا داروسـاز مصرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد و درجای خشـک و خنک و دور از دسـترس اطفال نگهداری شـود. پس از بـاز شـدن درب بطـری در یخچال نگهداری شـود و تا یـک ماه قابل اسـتفاده است.



- **نام فرآورده: : آپوویتال کاردیوفیت پلاس امگا و کیوتن**
- **نـام تجـاری/ برنـد: APOVITAL CARDIO FIT PLUS OMEGA & Q10**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: داروسازی دانا تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: کپسـول ژلاتینی نـرم - ۳۰ عـدد بـه صـورت ۳ بلیسـتر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در ۲ عدد کپسول:**

جز	مقدار
اسیدهای چرب امگا -۳ DHA EPA	۱۲۰۰ میلی‌گرم ۶۰۰ میلی‌گرم ۴۲۰ میلی‌گرم
روغن زیتون فراهم کننده: اسیدهای چرب امگا - ۹	۱۹۴ میلی‌گرم ۱۲۰ میلی‌گرم
کوآنزیم کیوتن	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۲ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعال فرآورده (اکسـپیانت):** گلیسـرول، آیرون اکسـاید و هیدروکسـاید، ژلاتین
- **رده سنی:** بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** : کمک بـه عملکـرد طبیعی قلب
- **دسـتور صحیـح مصرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانه ۲ عدد کپسـول با میـزان کافی آب میل شـود
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفا مکمل بـوده و جهت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد. در افـراد زیـر ۱۸ سـال، خانـم هـای بـاردار و شـیرده توصیـه نمی‌شـود. .
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنک (دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد) و دور از نـور و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شود .




- نام فرآورده: آپوویتال کاردیوفیت
- نام تجاری/ برند:APOVITAL CARDIO FIT
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: داروسـازی دانـا تحت لیسـانس شـرکتEuro OTC Pharma GmbH آلمـان
- شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: کپسـول - ۳۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در دو عدد کپسول:

جز	مقدار
اسیدهای چرب امگا -۳: فراهم کننده DHA EPA	۳۰۰ میلی‌گرم ۲۵۰ میلی‌گرم ۳۰ میلی‌گرم
ویتامین B1	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB2	۱/۴ میلی‌گرم
نیاسین	۱۶ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۱/۴ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۲/۵ میکروگرم
ویتامینC	۸۰ میلی‌گرم
ویتامینD	۲۰ میکروگرم
ویتامینE	۱۲ میلی‌گرم
منیزیم	۳۷۵ میلی‌گرم
آهن (فروس فومارات)	۸ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
مس	۱ میلی‌گرم
منگنز سولفات	۲ میلی‌گرم
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
کروم	۱۰۰ میکروگرم
ید	۱۵۰میکروگرم
کوانزیم کیوتن	۳ میلی‌گرم
مخلوط کاروتنوئیدهای طبیعی	۴ میلی‌گرم
عصاره سیر	۲۰ میلی‌گرم
عصاره دانه انگور	۲۰ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** ژلاتیـن، روغـن سـویا، گلیسـرول، سـوربیتول، لسـیتین، آیـرون اکسـاید و هیدروکسـاید، پتاسـیم یدیـد، رنـگ آبـی برلیانـت FCF
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به عملکـرد طبیعی قلب
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه ۲ عدد کپسـول همـراه آب و غـذا میل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفا مکمل بـوده و جهت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد. در صـورت حساسـیت بـه هریـک از اجـزای فـراورده مطابق دسـتور پزشـک یا دکتر داروسـاز مصرف شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابـق دسـتور پزشـک یـا دکتـر داروسـاز مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنک (دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد) و دور از نـور و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شود.





- **نام فرآورده: آپوویتال کروم ۲۰۰**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL CHROM 200**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: : قرص - ۳۰ عدد به صورت ۱ بلیستر ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در هر قرص:**

جز	مقدار
کروم	۲۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات، اسیدهای چرب منیزیم، سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**کمک به حفظ سطح طبیعی قند خون
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه با آب و غذا میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف داروهای کاهنده قند و خون و در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف گردد. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال کلاژن پلاس
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL KOLLAGEN PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۳۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص:**

جز	مقدار
ویتامین C	۳۰ میلی‌گرم
ال - لیزین	۵۰ میلی‌گرم
کلاژن هیدرولیزه	۵۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، کلسیم فسفات، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک‌های منیزیم، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیتانیوم دی اکساید، پلی اتیلن گلیکول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت پوست
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فراورده مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: استار ویت کلافیکس**
- **نام تجاری/ برند: STAR VIT COLLAFIX**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در ۱ قرص:**

جز	مقدار
کلاژن	۲۵۰ میلی‌گرم
زینک سیترات	۱۰ میلی‌گرم
هیالورونیک اسید	۵۰ میلی‌گرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین B۸ (D-Biotin)	۳۰۰ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، اسیدهای چرب مونو و دی گلیسیرید، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو، ناخن و کمک به حفظ سلامت و تقویت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه میزان کافی آب میل شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت سابقه حساسیت به هر یک از اجزای فراورده و در صورت مصرف داروهای دیگر و نیز ابتلا به بیماری‌های مزمن قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با پزشک مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، دوراز دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ای اچ کلسیم پلاس**
- **نام تجاری/ برند: EH CALCIUM PLUS**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:قرص - ۳۰ عدد - داخل قو طی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان دریک قرص:**

جز	مقدار
کلسیم	۷۵۰ میلی‌گرم
منیزیم	۱۲۰ میلی‌گرم
زینک	۱۵ میلی‌گرم
منگنز	۲ میلی‌گرم
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین D3	۲۵ میکروگرم (۱۰۰۰ واحد بین‌المللی)
ویتامین K2	۳۰ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، تری کلسیم فسفات، نمک‌های منیزیم اسیدهای چرب، روغن وجتبل، تالک، تیتانیوم اکساید، میگلیول، تری کلسیم فسفات، مونو و دی گلیسیریدهای اسیدهای چرب، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل سلولز
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **موارد منع مصرف:** مصرف این فراورده در افرادی که از داروهای ضد انعقاد خون استفاده می‌کنند توصیه نمی‌شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک مصرف شو د .
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال کلسیم سیترات + منیزیم، زینک و ویتامین د.
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL CALCIUM CITRATE+MAGNESIUM, ZINC AND VITAMIN D
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۳۰ عدد قرص - به صورت دو بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در ٤ عدد قرص:

جز	مقدار
کلسیم سیترات	۱۰۰۰ میلی‌گرم
منیزیم	۱۶۰ میلی‌گرم
روی	۲۰ میلی‌گرم
منگنز گلوکونات	۲ میلی‌گرم
مس	۲ میلی‌گرم
ویتامین D (۲۰۰۰واحد بین‌المللی)	۵۰ میکروگرم
ویتامین B6	۲۰ میلی‌گرم
بور	۲ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، اسیدهای چرب منیزیم، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیتانیوم دی اکساید، سیلیکون، دی اکساید، سدیم تترابورات، تالک، گلیسرول، موم کارناوبا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت استخوان‌ها و عملکرد طبیعی عضلات
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه دو بار، هر بار دو عدد قرص با مقدار کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. مصرف همزمان این فراورده با فراورده‌های حاوی آهن توصیه نمی‌شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق با نظر پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** مصرف همزمان این فراورده با فرآورده‌های حاوی آهن توصیه نمی‌شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال زینک پلاس
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL ZINC PLUS
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** داروسازی مینو تحت لیسانس شرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول نرم - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در یک کپسول:

جز	مقدار
ویتامین C	۱۰۰ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم
نیاسین	۹ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۳ میکروگرم
ویتامین B۶	۱/۶ میلی‌گرم
ویتامین B1	۱/۳ میلی‌گرم
ویتامین B2	۱/۵ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن سویا، گلیسرول، موم زنبور عسل، لسیتین، اکسید و هیدروکسید آهن، تیتانیوم دی اکساید، رنگ قرمز آلورا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تقویت و حفظ سلامت پوست، مو، ناخن و کمک به کلاژن سازی طبیعی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: آپوویتال کیوتن پلاس ۱۰۰**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL Q10 PLUS 100**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: داروسازی دانا تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک کپسول:**

جز	مقدار
ویتامین C	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامینE (۱۸ واحد بین‌المللی)	۱۲ میلی‌گرم
زینک	۸ میلی‌گرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
کوآنزیم کیوتن	۱۰۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن سویا، ژلاتین، گلیسیرین، لسیتین، تیتانیوم دی اکساید، اکسید و هیدروکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت قلب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:فیشر فلکسان گلوکزامین & کندروئیتین مکس**
- **نام تجاری/ برند: FISHER FLEXAN GLUCOSAMINE CHONDROITIN MAX**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ٦٠ عدد به صورت ٤ بلیستر ١٥ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در هر ۳ عدد قرص:**

جز	مقدار
گلوکزآمین	۱۵۰۰ میلی‌گرم
کندرویتین	۱۲۰۰ میلی‌گرم
ام اس ام	۳۰۰ میلی‌گرم
هیالورونیک اسید	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین D۳	۳۰ میکروگرم (۱۲۰۰ واحد)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، تری کلسیم فسفات، منیزیم استئارات اسیدهای چرب نمک‌های منیزیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت مفاصل
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۳ عدد قرص همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه حساسیت با مشورت پزشک یا داروساز مصرف گردد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، دوراز دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فرش مورنینگ لیپوفروس**
- **نام تجاری/ برند: FRESH MORNING LIPOFERROUS**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره خوراکی (با طعم وانیل) همراه با قطره چکان - ۳۰ میلی لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک میلی لیتر:**

جز	مقدار
آهن (پیروفسفات)	۱۵ میلی‌گرم (المنتال)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم آسکوربات، زانتان گام، طعم‌دهنده وانیل، سوکرالوز
- **رده سنی:** کودکان زیر ۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و پیشگیری از کم‌خونی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان زیر ۲ سال روزانه ۰/۵ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک مصرف شود. قبل از مصرف تکان داده شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و حداکثر تا ۳۰ روز قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** استارویت مخمر آبجو ۶۵۰ میلی‌گرم + زینک +ویتامین های ب
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT BREWERS YEAST 650 MG + ZINC + VITAMINS B
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۶۰ عدد - داخل قوطی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص:**

جز	مقدار
مخمر آب جو	۶۵۰ میلی‌گرم
زینک	۵ میلی‌گرم
ویتامین B۵	۶ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۲ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۲/۵ میکروگرم
ویتامین B2	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامین B8 (بیوتین)	۰/۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، اسیدهای چرب مونو و دی گلسیرید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** : کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و تامین‌های ویتامین‌های گروه B
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه آلرژیک به ترکیبات حاوی مخمر قبل از مصرف با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فورت ایی ملاتونین**
- **نام تجاری/ برند: FORTE E MELATONIN**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: میم دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ٦٠ عدد به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص:**

جز	مقدار
ملاتونین	۳ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آویسل ۱۰۲، پی وی پی، کراس کارملوز، منیزیم استئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تنظیم خواب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان شبی یک عدد قرص نیم تا یک ساعت قبل از خواب یا مطابق دستور پزشک میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. هنگام مصرف این محصول از انجام فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارند از جمله رانندگی خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: استار ویت ملاتونین مکس**
- **نام تجاری/ برند: STAR VIT MELATONIN MAX**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: قرص - ٦٠ عـدد به صورت ٢ بلیسـتر ٣٠ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:**

جز	مقدار
ملاتونین	۳ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، اسـیدهای چـرب، منیزیـم اسـتئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تنظیـم خـواب
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان شـبی یـک عـدد قـرص نیـم سـاعت قبـل از خـواب میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد. رعایـت فاصلـه زمانـی در صـورت مصـرف همزمـان ایـن محصـول بـا فعالیـت هایـی کـه نیـاز بـه هوشـیاری دارنـد از جملـه رانندگـی درنظـر گرفتـه شـود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و خنـک (دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از نـور و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: فیشر فلکسان منیزیم ۷**
- **نام تجاری/ برند:FISHER FLEXAN MG7**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت دو بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در هر قرص:**

جز	مقدار
منیزیم	۳۷۵ میلی‌گرم
تائورین	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامینB1	۲/۲ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۲/۸ میلی‌گرم
ویتامینB۳	۴۸ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۶ میلی‌گرم
ویتامینB8 (بیوتین)	۱۵۰ میکروگرم
ویتامینB9	۵۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۷/۵ میکروگرم
ویتامینD۳	۱۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):** هیدروکسی پروپیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تالک، میگلیول، تیتانیوم اکساید، تری کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب منیزیم.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ عملکرد عضلات و رفع خستگی عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. در صورت وجود سابقه حساسیت با پزشک یا دکتر داروساز مشورت گردد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** با پزشک یا دکتر داروساز مشورت گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

- **نام فرآورده: آپوویتال منیزیم ۴۰۰**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL MAGNESIUM 400**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: پرارین پارس تحت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH کشور آلمان**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: ساشـه دایرکـت بـا طعـم پرتقـال - ۳۰ عـدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در هر ساشه:**



جز	مقدار
منیزیم	۴۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۶ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۳ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم


- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** لاکتوز، اسـید سـیتریک، سـیترات سـدیم، اسـیدهای چـرب منیزیـم، اسـانس پرتقـال، سـوکرالوز، مالتودکسـترین، سـوربیتول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه حفـظ عملکـرد طبیعـی عضـلات و سیسـتم عصبـی
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد ساشـه را بـاز کـرده و محتـوای آن را بـه طـور مسـتقیم روی زبـان ریختـه و پـس از چنـد ثانیـه بـدون نیـاز بـه آب بلعیـده شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان و پیشـگیری از بیمـاری نمی‌باشـد. احتمـال بـروز اثـرات ملیـن وجـود دارد. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** بـا توصیـه پزشـک یـا داروسـاز مصـرف گـردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** در صـورت مصـرف بیـس فسـفونات‌ها و آنتـی بیوتیک‌هـا، فاصلـه زمانـی حداقـل ۲ سـاعته بـا مصـرف ایـن فـراورده رعایـت شـود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه سـانتیگراد، دوراز دسـترس اطفـال نگهداری شـود.



- **نام فرآورده: استار ویت ملاتونین مکس**
- **نام تجاری/ برند: FISHER FLEXAN MAGNESIUM VITA-MIN B6 EFFERVESCENT**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: پرارین پارس تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: : قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص جوشان:**

جز	مقدار
منیزیم	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۱/۴ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکرالوز، سیتریک اسید، سدیم بیکربنات ، K30 PVP، اسانس لیمو، ال - لوسین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و کاهش اسپاسم عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص داخل یک لیوان آب حل و سپس میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: آپوویتال منیزیم اکتیو**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL MAGNESIUM AKTIV**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:**

جز	مقدار
منیزیم	۳۷۵ میلی‌گرم
ویتامین B1	۳/۳ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۴/۲ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۱۰ میلی‌گرم
ویتامین B۱۲	۷/۵ میکروگرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۶۰۰ میکروگرم
نیاسین	۴۸ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۱۵ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، میکروکریستالین سلولز، منیزیم لاکتات، سدیم کربوکسی متیل سلولز، روغن کلزا، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، پلی اتیلن گلیکول، تالک.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ عملکرد عضلات و رفع خستگی عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمیباشد. احتمال بروز اثرات ملین وجود دارد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف بیس فسفونات‌ها و آنتی بیوتیک‌ها، فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ای اچ منیزیم پلاس**
- **نام تجاری/ برند: EH MAGNESIUM PLUS**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد - داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:**

جز	مقدار
منیزیم	۳۷۵ میلی‌گرم
تائورین	۱۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B1	۲/۲ میلی‌گرم
ویتامین B2	۲/۸ میلی‌گرم
ویتامین B3	۴۸ میلی‌گرم
ویتامین B6	۶ میلی‌گرم
ویتامین B8 (بیوتین)	۱۵۰ میکروگرم
ویتامین B9 (فولیک اسید)	۵۰۰ میکروگرم
ویتامین B12	۷/۵ میکروگرم
ویتامین D3	۱۵ میکروگرم (۶۰۰ واحد بین‌المللی)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هیدروکسی پروپیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تالک، تیتانیوم اکساید، میگلیول، تری کلسیم فسفات، میکروکریستالین سلولز، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب منیزیم
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ عملکرد عضلات و رفع خستگی عضلانی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمیباشد. در صورت حساسیت به فراورده مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک مصرف شو د .
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** : آپوویتال منیزیم + آیزن و ب۶
- **نام تجاری/ برند:** vz APOVITAL MAGNESIUM + EISEN UND B6 v
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص - ۳۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در یک قرص:

جز	مقدار
منیزیم	۳۰۰ میلی‌گرم
آهن بیس گلایسینات	۱۴ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۱/۴ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** لاکتوز مونوهیدرات، میکروکریستالین سلولز، نشاسته، پلی وینیل پیرولیدون، سدیم کربوکسی متیل سلولز، اسیدهای چرب نمک منیزیم.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی، تامین انرژی و رفع خستگی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** فاصله زمانی دو ساعته با مصرف آنتی بیوتیک‌ها و بیس فسفونات‌ها رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف بیش از حد ترکیبات حاوی منیزیم احتمال بروز اثرات ملین وجود دارد.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.




- نام فرآورده: فیشر کیندر مولتی کد جویس
- نام تجاری/ برند: FISHER KINDER MULTICODE JUICE
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Fisher بلژیک
- شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: شربت - ۲۰۰ میلی لیتر
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در ۵ میلی لیتر:

جز	مقدار
ال - لایزین	۵۰ میلی‌گرم
ویتامین A	۱۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینB۱	۰/۸ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامینB۳	۸ میلی‌گرم
ویتامینB۵	۳ میلی‌گرم
ویتامینB6	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامینB12	۲ میکروگرم
بیوتین	۱۵ میکروگرم
فولیک اسید	۱۵۰ میکروگرم
ویتامینC	۴۰ میلی‌گرم
ویتامینD۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینE	۶ میلی‌گرم
ید	۷۰ میکروگرم
آهن گلوکونات	۷ میلی‌گرم
منیزیم گلوکونات	۵۶/۲۵ میلی‌گرم
منگنز گلوکونات	۵۰۰ میکروگرم
زینک گلوکونات	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکروز، گلیسرین، مالتودکسترین، زانتان گام، کلسیم دی پانتوتنات، پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات، نشاسته، اسانس پرتقال
- **رده سنی:** کودکان بالای ۳ سال - نوجوانان - بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن، تقویت رشد و سیستم ایمنی در کودکان و نوجوانان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۷-۳ سال روزانه یک قاشق مرباخوری (۵ میلی‌لیتر)، کودکان ۷ سال به بالا و نوجوانان روزانه دو قاشق مربا خوری (۱۰ میلی‌لیتر) یا مطابق دستور پزشک. قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان مکمل‌های حاوی کلسیم و ویتامین A با این فراورده خودداری شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک و دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا یک ماه قابل استفاده است.






- نام فرآورده: آپوویتال مولتی ویت ۵۰+
- نام تجاری/ برند: APOVITAL MULTIVIT +50
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH آلمـان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بندی: قـرص - ۳۰ عـدد به صورت ۲ بلیسـتر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص:

جز	مقدار
ویتامین B1	۱۴ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۴ میلی‌گرم
نیاسین	۳۰ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۱۰ میلی‌گرم
ویتامینB۱۲	۵ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینC	۶۰ میلی‌گرم
ویتامینD (۶۰۰ واحد)	۱۵ میکروگرم
ویتامینE	۱۵ میلی‌گرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
کرومیوم	۷۵ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
آهن (فروس فومارات)	۱۰ میلی‌گرم
منیزیم	۶۰ میلی‌گرم
منگنز	۰/۵ میلی‌گرم
مولیبدن	۵۰ میکروگرم
سلنیوم	۱۲۰ میکروگرم
روی	۱۵ میلی‌گرم
آلفا لیپوئیک اسید	۲۰ میلی‌گرم
لوتئین	۲ میلی‌گرم
عصاره مرکبات حاوی بیوفلاوونوئیدها	۱۰ میلی‌گرم

کوآنزیم کیوتن	۲۰ میلی‌گرم
عصاره چای سبز	۲۰ میلی‌گرم
مخلوط طبیعی کاروتنوئیدها	۲ میلی‌گرم
کولین	۱۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نمک های منیزیم، سیلیکون دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید، تالک، پلی اتیلن گلایکول، اکسید و هیدروکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص با میزان کافی آب و ترجیحا به همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- نام فرآورده: آپوویتال مولتی ویت ای-زد
- نام تجاری/ برند: APOVITAL MULTIVIT A-Z
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس Euro OTC Pharma GmbH آلمـان
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بندی: قـرص - ۳۰ عـدد به صورت دو بلیسـتر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در هر قرص:

جز	مقدار
ویتامین A (۲۶۶۶ IU)	۸۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۱/۶ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۲ میلی‌گرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
اسید فولیک	۲۰۰ میکروگرم
نیاسین	۱۸ میلی‌گرم
ویتامینB۱۲	۱ میکروگرم
ویتامینC	۶۰ میلی‌گرم
ویتامین D (۲۰۰ IU)	۵ میکروگرم
ویتامین E (۱۵ IU)	۱۰ میلی‌گرم
بیوتین	۱۵۰ میکروگرم
ویتامینK	۳۰ میکروگرم
کروم	۶۰ میکروگرم
آهن	۵ میلی‌گرم
ید	۱۰۰ میکروگرم
مس	۱ میلی‌گرم
منگنز	۲ میلی‌گرم
مولیبدن	۸۰ میکروگرم
سلنیوم	۳۰ میکروگرم
زینک	۵ میلی‌گرم
کلسیم فسفات	۱۶۲ میلی‌گرم
منیزیم	۱۰۰ میلی‌گرم
فسفر	۱۲۵ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فرآورده (اکسـیپانت):** میکروکریسـتالین سـلولز، سـدیم کراسـکارملوز، منیزیـم اسـتئارات، سـیلیکون دی اکسـاید، تیتانیـوم دی اکسـاید، گلیسـرول، هیدروکسـی پروپیـل متیـل سـلولز، سـدیم کربوکسـی متیـل سـلولز، اسـیدهای چـرب منیزیـم، سـدیم سـلنات، پلـی اتیلـن گلیکـول، اکسـید و هیدروکسـید آهـن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه حفـظ سـلامت عمومـی بـدن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** روزانـه یـک عـدد قـرص بـا میـزان کافـی آب میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان و پیشـگیری از بیمـاری نمی‌باشـد. از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابـق دسـتور پزشـک یـا دکتـر داروسـاز اسـتفاده شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جـای خشـک و در دمـای پایین‌تـر از ۲۵ درجـه سـانتیگراد، دور از دسـترس اطفـال نگهداری شـود.





- **نام فرآورده: آپوویتال مولتی ویتامین جوشان**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: پراریـن پـارس تحت لیسـانس شـرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمـان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص جوشان:**

جز	مقدار
ویتامین A	۹۴۹۲ واحد بین‌المللی
ویتامین D۳	۶۸۵/۵ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۴۹ میلی‌گرم
ویتامین B۱	۴/۲ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۵/۳ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۴/۸ میلی‌گرم
ویتامین C	۲۲۵ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲۰/۷ میلی‌گرم
فولیک اسید	۶۷۰ میکروگرم
نیاسین	۲۵/۹ میلی‌گرم
ویتامین K	۲۷۸/۵ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۷/۵ میکروگرم
بیوتین	۱۳۲/۵ میکروگرم

- **اجـزای غیرفعال فرآورده (اکسـیپیانت):** سـوکرالوز، سـیتریک اسـید، سـدیم بیکربنات، لاکتوزمونوهیدرات، پوویدون K۳۰، اسـانس پرتقال، ال - لوسین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** کمک به سـلامت عمومـی و تامین مـواد مغذی مـورد نیاز بدن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانه یک عـدد قرص داخـل یـک لیـوان آب (۲۰۰ میلی‌لیتـر) حل و سـپس میل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفا مکمل بـوده و جهت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** از مصـرف همزمان با سـایر فراورده‌هـای حـاوی ویتامیـن A خـودداری گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در جای خشـک و خنک (دمـای زیر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از دسـترس اطفال نگهداری شـود.



- نام فرآورده: مولتی ویت آقایان استارویت
- نام تجاری/ برند: STARVIT MULTIVIT FOR MEN
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک
- شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: کپسـول - ۶۰ عـدد به صورت ۴ بلیستر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در یک کپسول:

جز	مقدار
ویتامین A	۲۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینB۱	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB۳	۱۲ میلی‌گرم
ویتامینB۵	۵ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۲ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۲/۴ میکروگرم
ویتامینC	۸۰ میلی‌گرم
ویتامینD۳	۲۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینE	۱۰ واحد بین‌المللی
کلسیم کربنات	۵۰ میلی‌گرم
کروم	۳۰ میکروگرم
مس سولفات	۰/۹ میلی‌گرم
آهن	۸ میلی‌گرم
منیزیم	۵۰ میلی‌گرم
منگنز سولفات	۱/۸ میلی‌گرم
مولیبدن	۴۵ میکروگرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
زینک سولفات	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** شوگر اسفیر، اتیل سلولز،هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، شلاک (Shellac)
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز آقایان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، دوراز دسترس اطفال نگهداری شود.





- نام فرآورده: مولتی ویت آقایان بالای ۵۰ سال استار ویت
- نام تجاری/ برند: STAR VIT MULTIVIT FOR MEN +50
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک
- شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: کپسـول - ۶۰ عـدد به صورت ۴ بلیستر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در یک کپسول:

جز	مقدار
ویتامین A	۲۳۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینB۱	۳/۳ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۳/۳ میلی‌گرم
ویتامینB۳ (نیکوتینامید)	۱۰ میلی‌گرم
ویتامینB۵	۱۰ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۶ میلی‌گرم
ویتامین B7 (بیوتین)	۳۰ میکروگرم
ویتامین B9 (فولیک اسید)	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۲/۵ میکروگرم
ویتامینC	۶۰میلی‌گرم
ویتامینD۳	۷۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینE	۱۰ واحد بین‌المللی
کلسیم کربنات	۵۰ میلی‌گرم
کروم کلراید	۱۸۰ میکروگرم
مس سولفات	۲/۲ میلی‌گرم
منیزیم اکساید	۶۰ میلی‌گرم
منگنز سولفات	۴/۲ میلی‌گرم
مولیبدن	۹۰ میکروگرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
سلنیوم	۱۱۰ میکروگرم
زینک سولفات	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** شوگر اسفیر، اتیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، شلاک(Shellac)
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز آقایان بالای ۵۰ سال
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان (بالای ۵۰ سال) روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای کاهنده قند خون با پزشک یا داروساز مشورت گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، دوراز دسترس اطفال نگهداری شود.





- نام فرآورده: مولتی ویت خانم ها استار ویت
- نام تجاری/ برند: STAR VIT MULTIVIT FOR WOMEN
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک
- شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: کپسـول - ۶۰ عـدد به صورت ۴ بلیستر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در یک کپسول:

جز	مقدار
ویتامین A	۲۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینB۱	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB۳	۱۴ میلی‌گرم
ویتامینB۵	۵ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۲ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰ میکروگرم
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۱/۸ میکروگرم
ویتامینC	۸۰ میلی‌گرم
ویتامینD۳	۲۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینE	۱۰ واحد بین‌المللی
کلسیم کربنات	۵۰ میلی‌گرم
کرومیوم کلراید	۳۵ میکروگرم
مس سولفات	۱ میلی‌گرم
آهن	۱۵ میلی‌گرم
ید	۱۵۰ میکروگرم
منیزیم	۳۰ میلی‌گرم
منگنز سولفات	۰/۵ میلی‌گرم
مولیبدن	۴۵ میکروگرم
سلنیوم	۲۰ میکروگرم
زینک سولفات	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هسته شکر، اتیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، شلاک
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز در بانوان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف همزمان با داروهای کاهنده قند خون با پزشک یا داروساز مشورت گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- نام فرآورده: مولتی ویت بانوان بالای ۵۰ سال استارویت
- نام تجاری/ برند: STAR VIT MULTIVIT FOR WOMEN +50
- شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان
- تولیدشـده در: هگمتـان داروی غـرب تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک
- شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: کپسـول - ۶۰ عـدد به صورت ۴ بلیستر ۱۵ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: مقدار در یک کپسول:

جز	مقدار
ویتامین A	۲۳۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینB۱	۴/۵ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۴ میلی‌گرم
ویتامینB۳	۲۰ میلی‌گرم
ویتامینB۵	۶ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۴ میلی‌گرم
ویتامینB8	۵۰ میکروگرم
ویتامینB9	۴۰۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۵ میکروگرم
ویتامینC	۶۰ میلی‌گرم
ویتامینD۳	۶۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامینE	۱۰ واحد بین‌المللی
کلسیم کربنات	۵۰ میلی‌گرم
کرومیوم کلراید	۳۵ میکروگرم
مس سولفات	۱ میلی‌گرم
آهن	۱۰ میلی‌گرم
منیزیم (اکساید)	۳۰ میلی‌گرم
منگنز سولفات	۰/۵ میلی‌گرم
مولیبدن	۴۵ میکروگرم
سلنیوم	۲۰ میکروگرم
زینک سولفات	۱۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هسته شکر، اتیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، شلاک
- **رده سنی:** بزرگسالان (بالای ۵۰ سال)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز در بانوان بالای ۵۰ سال
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان (بالای ۵۰ سال) روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.





- **نام فرآورده:** مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL MULTIVITAMINSAFT FUR KIDS
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته‌بندی:** شربت (با طعم پرتقال) ۲۰۰- میلی‌لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در هر ۵ میلی لیتر:

جز	مقدار
ویتامین C	۴۰ میلی‌گرم
ویتامین E (۶/۹ IU)	۴/۶ میلی‌گرم
نیاسین	۶ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۰/۵ میلی‌گرم
ویتامینB۱	۰/۵ میلی‌گرم
ویتامینB6	۰/۵ میلی‌گرم
ویتامینIU 1500) A)	۴۵۰ میکروگرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
ویتامینD۳	۱۰ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۱/۲ میکروگرم
بیوتین	۸ میکروگرم
ویتامینK	۱۵ میکروگرم
زینک	۵ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** آب، سوربیتول، کنسانتره آب پرتقال و گریپ فروت، سیتریک اسید، زانتان گام، سدیم بنزوات، روغن پرتقال، پلی سوربات
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی بدن در کودکان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۵ میلی‌لیتر (یک قاشق مرباخوری)، قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با سایر مکمل‌های حاوی ویتامین A خودداری گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد و درجای خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** مولتی ویتامین جوشان استار ویت
- **نام تجاری/ برند:** STAR VIT MULTIVITAMIN EFFERVESCENT
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** پرارین پارس تحت لیسانس شرکت Welfare Nutrition بلژیک
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قرص جوشان - ۲۰ عدد
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در یک عدد قرص جوشان:

جز	مقدار
ویتامین A پالمیتات	۹۴۹۲ واحد بین‌المللی
ویتامینD۳	۶۸۵/۵ واحد بین‌المللی
ویتامینE - استات	۴۹ میلی‌گرم
تیامین مونونیترات	۴/۲۱ میلی‌گرم
ریبوفلاوین ۵- فسفات	۵/۳ میلی‌گرم
پیریدوکسین هیدروکلراید	۴/۸۴۵ میلی‌گرم
آسکوربیک اسید	۲۲۵ میلی‌گرم
کلسیم D - پنتوتنات	۲۰/۶۵ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۶۷ میلی‌گرم
نیکوتینامید	۲۵/۹ میلی‌گرم
ویتامینK	۲۷۸/۵ میکروگرم
ویتامینB۱۲	۷/۴۵ میکروگرم
بیوتین	۱۳۲/۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکرالوز، سیتریک اسید، سدیم بیکربنات، لاکتوز مونوهیدرات، PVP، اسانس پرتقال، لوسین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص داخل یک لیوان آب حل و سپس میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با سایر فراورده‌های حاوی ویتامین A خودداری گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: مولتی ویتامین جوشان فیشرفلکسان**
- **نام تجاری/ برند: FISHER FLEXAN MULTIVITAMIN EFFERVESCENT**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: پرارین پارس تحت لیسانس شرکت Fisher بلژیک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص جوشان:**

جز	مقدار
ویتامین A	۹۴۹۲ واحد بین‌المللی
ویتامین D۳	۶۸۵/۵ واحد بین‌المللی
ویتامین E	۴۹ میلی‌گرم
ویتامین B۱	۴/۲۱ میلی‌گرم
ویتامین B۲	۵/۳ میلی‌گرم
ویتامین B۶	۴/۸۴۵ میلی‌گرم
ویتامین C	۲۲۵ میلی‌گرم
پنتوتنیک اسید	۲۰/۶۵ میلی‌گرم
فولیک اسید	۰/۶۷ میلی‌گرم
نیاسین	۲۵/۹ میلی‌گرم
ویتامین K	۲۷۸/۵ میکروگرم
ویتامین B۱۲	۷/۴۵ میکروگرم
بیوتین	۱۳۲/۵ میکروگرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوکرالوز، سیتریک اسید، سدیم بیکربنات، لاکتوز مونوهیدرات، POVIDONE K۳۰، اسانس پرتقال، لوسین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص داخل یک لیوان آب حل و سپس میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک مصرف شود .
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان با سایر فراورده‌های حاوی ویتامین A خودداری گردد.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال مولتی ویتامین تروپفن فور کیدز
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL MULTIVITAMINTROPFEN FUR KIDS
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قطره خوراکی همراه با قطره چکان -۳۰ میلی لیتر
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک میلی لیتر:**

جز	مقدار
ویتامین A (۱۵۰۰ واحد بین‌المللی)	۴۵۰ میکروگرم
ویتامینD (۴۰۰ واحد بین‌المللی)	۱۰ میکروگرم
ویتامینE	۶ میلی‌گرم
ویتامینB۱	۰/۶ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۰/۷ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۰/۴ میلی‌گرم
ویتامینB12	۱ میکروگرم
پنتوتنیک اسید	۱/۸ میلی‌گرم
بیوتین	۷/۵ میکروگرم
نیاسین	۴ میلی‌گرم
ویتامینK	۱۱/۲۵ میکروگرم
فولیک اسید	۱۵۰ میکروگرم
ویتامینC	۴۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سوربیتول، ساکارز، اسانس پرتقالی، آب، پلی سوربات ۸۰، سدیم بنزوات، پتاسیم سوربات، سدیم سیترات، صمغ زانتان، سوکرالوز، ساخارین
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت عمومی و تامین ویتامین‌های مورد نیاز بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان روزانه ۱-۳ میلی‌لیتر یا مطابق دستور پزشک میل شود. قبل از مصرف شیشه را تکان دهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. پس از باز شدن درب بطری در یخچال نگهداری شود و تا ۳ ماه قابل استفاده است.



- **نام فرآورده:** آپوویتال نوروفیت
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL NEURO FIT
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** داروسازی دانا تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** کپسول - ۳۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در ۲ کپسول:

جز	مقدار
امگا-۳ DHA EPA	۲۵۰ میلی‌گرم ۱۷۹ میلی‌گرم ۳۷ میلی‌گرم
ویتامین C	۸۰ میلی‌گرم
ویتامین E	۱۲ میلی‌گرم
ویتامینB۱	۱/۱ میلی‌گرم
ویتامینB۲	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامینB۶	۱/۴ میلی‌گرم
ویتامینB۱۲	۲/۵ میکروگرم
بیوتین	۵۰ میکروگرم
پانتوتنیک اسید	۶ میلی‌گرم
فولیک اسید	۲۰۰ میکروگرم
آهن	۱۰ میلی‌گرم
سلنیوم	۵۵ میکروگرم
جینسینگ	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، روغن سویا، لسیتین سویا، گلیسرین، ژلاتین، تیتانیوم دی اکساید، آهن اکساید، مس
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود عملکرد ذهنی و مغزی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه ۲ عدد کپسول همراه آب و غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز استفاده شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و در دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: : آپوویتال هیالورون پلاس**
- **نام تجاری/ برند: vz APOVITAL MAGNESIUM + EISEN UND B6 v**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس شرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۱۵ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد کپسول:**

جز	مقدار
ویتامین C	۶۰ میلی‌گرم
بیوتین	۳۰۰ میکروگرم
کلاژن	۲۵۰ میلی‌گرم
هیالورونیک اسید	۵۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سدیم هیالورونات، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب نمک منیزیم، تیتانیوم دی اکساید، اکسی و هیدروکسید آهن
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و کلاژن سازی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت سابقه حساسیت به هریک از اجزای فراورده مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: آپوویتال ویتامین ب ۱۲**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL VITAMIN B12**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص - ۳۰ عدد به صورت ۱ بلیستر ۳۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:**

جز	مقدار
ویتامین B۱۲	۵۰۰ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، سیلیکون دی اکساید، اسیدهای چرب نمک منیزیم، تیتانیوم دی اکساید، سدیم کربوکسی متیل سلولز، تالک، پلی سوربات ۸۰
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین B۱۲ مورد نیاز بدن و کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد قرص همراه غذا و آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: فورت ایی ویتامین ث**
- **نام تجاری/ برند: FORTE E VITAMIN C**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: هگمتان داروی غرب**
- **شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بنـدی: قـرص - ٦٠ عـدد - داخـل قو طی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:**

جز	مقدار
ویتامین C	۱۰۰۰ میلی‌گرم

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** Ac Di Sol ،PVP K۳۰، منیزیـم اسـتئارات، دی کلسـیم فسـفات، آویسـل ۱۰۱
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی و دارای خـواص آنتی اکسـیدانی
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد قـرص همـراه غـذا بـا میـزان کافـی آب میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد. در بیمـاران بـا سـابقه‌ی بیماری‌هـای کلیـوی بـا پزشـک یـا دکتـر داروسـاز مشـورت گـردد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** بـا پزشـک یـا دکتـر داروسـاز مشـورت گـردد.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنـک (دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از نـور و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: آپوویتال ویتامین ث ۱۰۰۰**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL VITAMIN C 1000**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: پراریـن پـارس تحت لیسـانس شـرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمـان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص جوشان:**

جز	مقدار
ویتامین C	۱۰۰۰ میلی‌گرم


- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپانت):** سـوکرالوز، سـیتریک اسـید، سـدیم بیکربنـات، لاکتوزمونوهیـدرات، پوویـدون K۳۰، اسـانس پرتقـال، رنـگ سانسـت یلـو، ال - لوسـین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن ویتامیـن C و تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد قـرص جوشـان داخـل یـک لیـوان آب حـل و سـپس میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** در دوران بـارداری و شـیردهی مطابـق دسـتور پزشـک مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنـک (دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: استار ویت ویتامین ث ۱۰۰۰ میلی‌گرم جوشان**
- **نـام تجـاری/ برنـد: STAR VIT VITAMIN C 1000 MG EF-FERVESCENT**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشـده در: پراریـن پـارس تحـت لیسـانس شـرکت Welfare Nutrition بلژیـک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قرص جوشان - ۲۰ عدد**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد قرص جوشان:**

جز	مقدار
ویتامین C	۱۰۰۰ میلی‌گرم


- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـپیانت):** سـوکرالوز، سـیتریک اسـید، سـدیم بیکربنـات، لاکتوزمونوهیـدرات، پوویـدون K۳۰، اسـانس پرتقـال، رنـگ سانسـت یلـو، ال - لوسـین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تامیـن ویتامیـن C مـورد نیـاز بـدن و تقویـت سیسـتم ایمنـی
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان روزانـه یـک عـدد قـرص داخـل یـک لیـوان آب (۲۰۰ میلی‌لیتـر) حـل و سـپس میـل شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** از مصـرف بیـش از میـزان توصیـه شـده خـودداری شـود. ایـن فـراورده صرفـا مکمـل بـوده و جهـت تشـخیص، درمـان یـا پیشـگیری از بیماری‌هـا نمی‌باشـد.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مطابـق دسـتور پزشـک مصـرف شو د .
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** درجـای خشـک و خنـک (دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد) و دور از دسـترس اطفـال نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده:** آپوویتال ویتامین ث پلاس ۱۰ میلی‌گرم زینک
- **نام تجاری/ برند:** APOVITAL VITAMIN C PLUS 10 MG ZINC
- **شرکت صاحب پروانه:** سمر طب درمان
- **تولیدشده در:** هگمتان داروی غرب تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** : کپسول - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:** میزان در یک عدد کپسول:

جز	مقدار
ویتامین C	۳۰۰ میلی‌گرم
زینک	۱۰ میلی‌گرم


- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ۷ ژلاتین گاوی، نشاسته، میکروکریستالین سلولز، ساکاروز، شلاک، اتیل سلولز، پروپیلن گلایکول، تیتانیوم دی اکساید، متیل هیدروکسی بنزوات، استیک اسید، سیلیکون دی اکساید، سدیم لوریل سولفات، رنگ زرد کینولین، تارترازین، پروپیل هیدروکسی بنزوات Z
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن و تقویت سیستم ایمنی بدن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب و ترجیحا همراه غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** امکان کاهش جذب زینک در صورت مصرف همزمان با آهن وجود دارد. با توجه به تداخل زینک و آنتی بیوتیک‌ها (کینولون و تتراسایکلین) فاصله زمانی حداقل ۲ ساعته با مصرف داروهای نام برده شده رعایت شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.



- **نام فرآورده: ای اچ ویتامین د ۳ ۱۰۰۰ واحد**
- **نام تجاری/ برند: EH VITAMIN D3 1000 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: داروسازی دانا تحت لیسانس شرکت Fisher بلژ یک**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول - ۶۰ عدد به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد کپسول:**

جز	مقدار
ویتامین D۳	۲۵ میکروگرم (۱۰۰۰ واحد بین‌المللی)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** روغن آفتاب‌گردان، ژلاتین، گلیسیرین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه غذا با میزان کافی آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد. در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی و یا سابقه حساسیت با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.




- **نام فرآورده: آپوویتال ویتامین ای ۴۰۰ واحد**
- **نام تجاری/ برند: APOVITAL VITAMIN E 400 I.U**
- **شرکت صاحب پروانه: سمر طب درمان**
- **تولیدشده در: داروسازی مینو تحت لیسانس Euro OTC Pharma GmbH آلمان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۴۰ عدد به صورت ۲ بلیستر ۲۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک عدد کپسول:**

جز	مقدار
ویتامین E	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین گاوی، روغن دانه سویا، گلیسرول
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین E و آنتی اکسیدان
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان روزانه یک عدد کپسول همراه غذا و آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در دوران بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک یا دکتر داروساز مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** درجای خشک و خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

ASHBAL CHEMI

شرکت اشبال شیمی





- **نام فرآورده: سیتی کولین**
- **نام تجاری/ برند: استروکل**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اشبال شیمی**
- **تولیدشده در: داروسازی طب مفید نیکان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر جعبه حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی و در کل ۳۰ عدد قرص خوراکی ۲۵۰ میلی‌گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱ عدد قرص
سیتی کولین	۲۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکسید و کراس کارملوز سدیم
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** بهبود عملکرد شناختی مغز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** میزان دوز پیشنهادی روزانه ۱ عدد قرص است، اگرچه پزشک در خصوص مناسب‌ترین دوز مصرفی شما تصمیم‌گیری می‌کند. استروکل را می‌توان قبل یا بعد از غذا طبق دستور پزشک مصرف کرد
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در افراد کمتر از ۱۳ سال و یا مبتلا به پارکینسون با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** اگر به سیتی کولین یا سایر اجزای تشکیل دهنده‌ی این فرآورده حساسیت دارید از مصرف دارو خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مانند همه مکمل‌ها، این مکمل نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد دچار این عوارض نمی‌شوند. از قبیل:
دردهای شکمی، حالت تهوع، راش پوستی، سردرد گذرا، سرگیجه، افت فشار خون
اگر پس از مصرف این محصول علائم واکنش‌های آلرژیک در بدن شما ایجاد شد، از مصرف آن خودداری کرده و با پزشک خود مشورت کنید. علائم آلرژیک ممکن است شامل خارش، راش، کهیر یا تورم باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** استروکل یک مکمل است و تداخل دارویی مهمی ندارد، اما اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید آن را با پزشک یا داروساز خود درمیان بگذارید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۲۰۰۰ میلی‌گرم
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سیتی کولین**
- **نام تجاری/ برند: استروکل**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اشبال شیمی**
- **تولیدشده در: داروسازی طب مفید نیکان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر جعبه حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی و در کل ۳۰ عدد قرص خوراکی ۵۰۰ میلی‌گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱ عدد قرص
سیتی کولین	۵۰۰mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی وینیل پیرولیدون، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکسید و کراس کارملوز سدیم
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** بهبود عملکرد شناختی مغز
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** میزان دوز پیشنهادی روزانه ۱ عدد قرص است، اگرچه پزشک در خصوص مناسب‌ترین دوز مصرفی شما تصمیم‌گیری می‌کند. استروکل را می‌توان قبل یا بعد از غذا طبق دستور پزشک مصرف کرد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.
در افراد کمتر از ۱۳ سال و یا مبتلا به پارکینسون با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** اگر به سیتی کولین یا سایر اجزای تشکیل دهنده‌ی این فرآورده حساسیت دارید از مصرف استروکل خودداری کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مانند همه مکمل‌ها، این مکمل نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه دچار این عوارض نمی‌شوند. از قبیل:
دردهای شکمی، حالت تهوع، راش پوستی، سردرد گذرا، سرگیجه، افت فشار خون
اگر پس از مصرف این محصول علائم واکنش‌های آلرژیک در بدن شما ایجاد شد، از مصرف آن خودداری کرده و با پزشک خود مشورت کنید. علائم آلرژیک ممکن است شامل خارش، راش، کهیر یا تورم باشد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** استروکل یک مکمل است و تداخل دارویی مهمی ندارد، اما اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید آن را با پزشک یا داروساز خود درمیان بگذارید
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۲۰۰۰ میلی‌گرم
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: اس-آدنوزیل-ال-متیونین + ویتامین E + فسفوکمپلکس(فسفاتیدیل کولین + سیلی بین) و اس- استیل گلوتاتیون**
- **نام تجاری/ برند: آدولیور**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اشبال شیمی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دانش پژوهان آریا دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر جعبه حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی و در کل ۳۰ عدد کپسول خوراکی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱ عدد کپسول
اس-آدنوزیل-ال-متیونین	۲۲۵ mg
ویتامین E	۱۱۰ mg
فسفوکمپلکس (فسفاتیدیل کولین + سیلی بین)	۸۰ mg
اس استیل گلوتاتیون	۵۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکسید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** : کمک به بهبود عملکرد کبد
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ عدد
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

قبل از مصرف آدولیور با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید اگر:

- داروهای ضدافسردگی مصرف می‌کنید.
- مبتلا به بیماری پارکینسون هستید و یا داروی لوودوپا مصرف می‌کنید.
- دچار اختلالات دوقطبی هستید.

به علت عارضه احتمالی اختلال در خواب بهتر است از مصرف آدولیور در شب خودداری کنید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این محصول در دوران بارداری یا شیردهی ممنوع است.
- **موارد منع مصرف:** اگر به هرکدام از اجزای این فرآورده حساسیت دارید، از مصرف این فرآورده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** آدولیور معمولا به خوبی تحمل می‌شود اما مانند همه مکمل‌ها، این مکمل نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگر چه همه این عوارض ایجاد نمی‌شوند. از قبیل:

مشکلات گوارشی گذرا (درد شکم، نفخ، اسهال و تهوع)، اضطراب، بی‌خوابی، سرگیجه

اگر پس از مصرف این محصول علائم واکنش‌های آلرژیک در بدن شما ایجاد شد، از مصرف آن خودداری کرده و با پزشک خود مشورت کنید. علائم آلرژیک ممکن است شامل خارش، راش، کهیر یا تورم باشد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آدولیور یک مکمل است و تداخلات دارویی مهمی ندارد. اما اگر داروی لوودوپا مصرف می‌کنید، قبل از مصرف آدولیور با پزشک خود مشورت کنید. آدولیور ممکن است به مرور زمان باعث کاهش اثربخشی لوودوپا شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- **نام فرآورده: اس-آدنوزیل-ال-متیونین**
- **نام تجاری/ برند: آدومدز**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت اشبال شیمی**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دانش پژوهان آریا دارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: هر جعبه حاوی سه عدد بلیستر ۱۰ عددی و در کل ۳۰ عدد کپسول خوراکی ۴۰۰ میلی‌گرمی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر ۱ عدد کپسول
اس-آدنوزیل-ال-متیونین	۴۰۰mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکسید
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود خلق و خو
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** آدومدز را می‌توان بعد یا قبل از غذا مصرف کرد. بهتر است دوزهای مصرفی آدومدز در دو یا سه وعده مجزا تقسیم شوند. دوز پیشنهادی برای مصرف آدومدز در دو هفته اول شروع درمان روزانه ۲ عدد کپسول ۴۰۰ میلی‌گرمی است.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نمی‌باشد.

قبل از مصرف آدومدز با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید اگر:

- داروهای ضدافسردگی مصرف می‌کنید.
- مبتلا به بیماری پارکینسون هستید و یا داروی لوودوپا مصرف می‌کنید.
- دچار اختلالات دوقطبی هستید.

به علت عارضه احتمالی اختلال در خواب بهتر است از مصرف آدومدز در شب خودداری کنید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** قبل از مصرف این محصول در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک یا داروساز مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** اگر به هر کدام از اجزای این فرآورده حساسیت دارید، از مصرف این فرآوده خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** آدومدز معمولا به خوبی تحمل می‌شود اما مانند همه مکمل‌ها، این مکمل نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه این عوارض ایجاد نمی‌شوند. از قبیل:


مشکلات گوارشی گذرا (درد شکم، نفخ، اسهال و تهوع)، اضطراب، بی‌خوابی، سرگیجه

اگر پس از مصرف این محصول علائم واکنش‌های آلرژیک در بدن شما ایجاد شد، از مصرف آن خودداری کرده و با پزشک خود مشورت کنید. علائم آلرژیک ممکن است شامل خارش، راش، کهیر یا تورم باشد.

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** آدومدز یک مکمل است و تداخلات دارویی مهمی ندارد. اما اگر داروی لوودوپا مصرف می‌کنید، قبل از مصرف آدومدز با پزشک خود مشورت کنید. آدومدز ممکن است به مرور زمان باعث کاهش اثربخشی لوودوپا شود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۱۶۰۰ میلی‌گرم
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

cosar
Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی کوثر



- **نام فرآورده: Vitamin D3 1000 IU**
- **نام تجاری/ برند: Vitamin D3 1000 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی۹۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	Amount per tablet	NRV٪
(as Cholecalciferol)Vitamin D۳	۱۰۰۰ IU (mcg ۲۵)	۱۶۷

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز۱۱۲، کراس پوویدون، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، لاکتوز انهیدروس، پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰، RT FILM NOR YELLOW ۰۵۲۶
- **رده سنی:** ۹ تا ۱۸ سال (۴۰۰۰ واحد)، ۱۹ سال و بالاتر (۴۰۰۰ واحد)، زنان در دوران بارداری و شیردهی (۴۰۰۰ واحد)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** ویتامین D۳ یک ویتامین محلول در چربی است که بدن برای حفظ سلامت عمومی خود به آن نیازمند است. این ویتامین در حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و سیستم قلبی عروقی نقش به سزایی دارد. این ویتامین به جذب کلسیم از دستگاه گوارش کمک می‌کند که برای ساخت و حفظ بافت استخوانی مورد نیاز است و با همراهی کلسیم موجب می‌گردد از پوکی استخوان جلوگیری شود. علاوه بر بافت استخوانی سلول‌های ایمنی بدن برای مبارزه با عوامل بیماری‌زا و همچنین عضلات و اعصاب بدن برای انقباضات و انتقالات پیام‌های عصبی به ویتامین D۳ احتیاج دارند. کمبود ویتامین د۳ می‌تواند در عملکرد طبیعی بدن اختلال ایجاد کند و بیماری‌های گوناگون را در پی داشته باشد. تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه‌ی مستقیمی بین سطوح خونی بسیار پایین ویتامین د۳ و بروز بیماری‌های مختلف و سرطان وجود دارد. این کمبود در کودکان به ریکتز و در بزرگسالان به استئومالاسی می‌انجامد. کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ قرص به همراه وعده غذایی مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** دوز مصرفی ویتامین د۳ بسته به مورد مصرف و سن افراد متفاوت است. لذا قبل از مصرف با پزشک و داروساز مشورت گردد.

این فرآورده یک مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نمی‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ۴۰۰۰ واحد
- **موارد منع مصرف:** قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک مشورت کنید: در صورت حساسیت به این دارو و یا هر یک از اجزای این فرآورده، ژلاتین و یا هرگونه مواد غذایی یا دارویی دیگر. در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه‌ای از جمله ابتلا به سنگ کلیه، نارسایی کلیوی، سندرم سوء جذب، سارکوئیدوز، سندرم ویلیام، هایپر پارائیدیسم.
- **عوارض جانبی احتمالی:** اگرچه کلیه عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز علائم ذیل که ناشی از واکنش آلرژیک می‌باشد، مصرف فرآورده را قطع و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید: ورم صورت، لب، زبان و گلو- اختلالات در بلع - واکنش پوستی آلرژیک از جمله کهیر- اختلال در تنفس. همچنین مصرف این فرآورده ممکن است باعث ایجاد عوارض ذیل گردد: افزایش سطح کلسیم در خون و ادرار. علایم زودرس مسمومیت با ویتامین د۳ همراه با زیادی کلسیم خون: احساس ضعف و بی‌حالی، خستگی، گیجی، تحریک‌پذیری، سردرد، مشکلات گوارشی (مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، یبوست (علایم دیررس مسمومیت با ویتامین د همراه با زیادی کلسیم خون: تشنج، آتاکسی (اختلال در تعادل) گیجی، کما و نارسایی کلیوی. لذا در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در حین مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها از جمله مکمل‌ها، داروهای گیاهی قبل از مصرف این محصول با پزشک خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** ۴۰۰۰ واحد
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** قرص‌ها در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و داخل بسته‌بندی اصلی نگهداری شوند. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری گردد.



- **نام فرآورده: Vitamin D3 2000 IU**
- **نام تجاری/ برند: Vitamin D3 2000 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ۹۰ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per tablet	NRV٪
Vitamin D۳ (Cholecalciferol)	۲۰۰۰ IU (۵۰mcg)	۱۶۷

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز۱۱۲، کراس پوویدون، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات، لاکتوز انیدروس، پلی اتیلن گلایکول، روکش آرتی فیلم زرد ۵۲۶.
- **رده سنی:** ۹ تا ۱۸ سال (۴۰۰۰ واحد)، ۱۹ سال و بالاتر (۴۰۰۰ واحد)، زنان در دوران بارداری و شیردهی (۴۰۰۰ واحد)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** ویتامین D۳ یک ویتامین محلول در چربی است که بدن برای حفظ سلامت عمومی خود به آن نیازمند است. این ویتامین در حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و سیستم قلبی عروقی نقش به سزایی دارد. این ویتامین به جذب کلسیم از دستگاه گوارش کمک می‌کند که برای ساخت و حفظ بافت استخوانی مورد نیاز است و با همراهی کلسیم موجب می‌گردد از پوکی استخوان جلوگیری شود. علاوه بر بافت استخوانی، سلول‌های ایمنی بدن برای مبارزه با عوامل بیماری‌زا و همچنین عضلات و اعصاب بدن برای ایجاد انقباضات و انتقالات پیام‌های عصبی به ویتامین D۳ احتیاج دارند. کمبود ویتامین د۳ می‌تواند در عملکرد طبیعی بدن اختلال ایجاد کند و بیماری‌های گوناگون را در پی داشته باشد. تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه مستقیمی بین سطوح خونی بسیار پایین ویتامین د۳ و بروز بیماری‌های مختلف و سرطان وجود دارد. این کمبود در کودکان به ریکتز و در بزرگسالان به استئومالاسی می‌انجامد. این محصول می‌تواند به عنوان مکمل توسط همه‌ی افراد مصرف شود. کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر و کمک به سلامت سیستم ایمنی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد همراه وعده غذایی میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ۴۰۰۰ واحد
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** این قرص نیز مانند هر مکمل دیگری اگر به اندازه مصرف شود برای بدن مفید است. در صورتی که میزان مصرف آن بیش از اندازه مورد نیاز برای بدن (۱۷۵ ng/ml) باشد، ممکن است عوارض جبران ناپذیری داشته باشد. یکی از این عوارض ابتلا به بیماری هیپر کلسمی است. همچنین مصرف بیش از اندازه این ویتامین سبب ابتلا به مسمومیت، پوسیدگی استخوان، نارسایی کلیوی و... می‌شود. بنابراین برای مصرف مقدار و دوز آن با پزشک مشورت کنید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه ۴۰۰۰ واحد می‌باشد، از افزایش میزان مصرف شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورتی که میزان مصرف آن بیش از اندازه مورد نیاز برای بدن (۱۷۵ ng/ml) باشد، ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد. یکی از این عوارض ابتلا به بیماری هیپر کلسمی است. همچنین مصرف بیش از اندازه این ویتامین سبب ابتلا به مسمومیت، پوسیدگی استخوان، نارسایی کلیوی و... می‌شود. بنابراین برای مصرف مقدار و دوز آن با پزشک مشورت کنید.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود. دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

- **نام فرآورده: ALERTOKID**
- **نام تجاری/ برند: ALERTOKID**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ۶۰ عدد قرص جویدنی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	Amount per tablet	NRV٪
Choline bitartrate	mg ۴۹/۲	٪۲۴/۶
Magnesium citrate	mg ۶۰	۷۵
Lutein	۱۱/۲mg	-
Iodine (potassium iodide)	mcg ۴۰	۴۴/۴۴
Iron (ferrous Fumarate)	mg ۵	۷۱/۴۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سدیم کراس کارملوز، سیلیکون دی اکساید، پوویدون K۳۰، عصاره برگ stevia، طعم دهنده بلوبری، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، عصاره انگور
- **رده سنی:** ۴ سال و بالاتر
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به بهبود یادگیری کودکان و رشد و تکامل.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۴ سال به بالا : روزانه یک الی دو عدد قرص جویده شود. (قرص کامل بلعیده نشود) یا طبق دستور پزشک یا داروساز.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف همزمان با سایر داروها، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت شود.

این فرآورده برای کودکان ۴ سال و بالاتر تهیه شده است لذا در کودکان کمتر از ۴ سال تنها در صورت تشخیص و صلاحدید پزشک استفاده شود.

در صورت استفاده بیش از مقدار توصیه شده حتما با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت گردد.

این فرآورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک معالج مشورت نمایید.
- **موارد منع مصرف:** این فرآورده برای کودکان چهار و بالاتر توصیه شده، در کودکان کمتر از ۴ سال تنها در صورت تشخیص و صلاحدید پزشک معالج استفاده شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در حین مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه یک الی دو عدد قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**-
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور و در دمای محیط (کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- **نام فرآورده:** Magnesium + B6
- **نام تجاری/ برند:** Magnesium + B6
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی کوثر
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی کوثر
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** بلیسترهای ۱۵ عددی حاوی ۶۰ عدد قرص روکش دار
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	Amount per tablet	NRV٪
(Magnesium (Magnesium Oxide	۱۰۰ mg	-
Pyridoxine hydrochloride (vitamin B۶)	۱۰ mg	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، سیلیکون دی اکساید، کراس کاراملوز سدیم، پلی وینیل پیرولیدین K۳۰، نشاسته ذرت، RT film nor white
- **رده سنی:** بالای ۱۲ سال
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت سیستم عصبی و عضلانی و کمک به کاهش اسپاسم عضلانی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** افراد بالای ۱۲ سال: روزانه ۱ تا ۳ قرص، ترجیحا در دوزهای مجزا و همراه با غذا میل شود. مقدار مصرف روزانه ترجیحا باید به دوزهای متعدد تقسیم شود و قبل یا همراه با غذا مصرف شود. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت ابتلا به نارسایی شدید کلیوی، و یا آلرژی به هر یک از اجزای سازنده‌ی این محصول (لیست ترکیبات بر روی بسته‌بندی درج گشته است)، از مصرف این فرآورده بپرهیزید.

مصرف دوزهای بالای ویتامین ب ۶ برای مدت طولانی (به عنوان مثال چندین ماه تا چندین سال) می‌تواند باعث سوزن شدن اندام‌ها، اختلالات تعادلی، لرزش دست و پاها و یا بروز مشکلاتی در هماهنگی حرکتی شود. این عوارض معمولا با توقف مصرف، برطرف می‌شوند. از مصرف بیش از دوره تجویز شده خودداری شود.

در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، باید اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از هرگونه خطر مرتبط با افزایش سطح منیزیم خون انجام شود لذا قبل از مصرف این فرآورده در این شرایط با پزشک معالج مشورت نمایید.

مصرف این محصول به کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌شود، مگر با تشخیص و صلاحدید پزشک.

در صورتی که تحت درمان با سایر داروها (خصوصا نمک‌های فسفات یا کلسیمی) هستید حتما پیش از مصرف این فرآورده پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این مکمل در طول بارداری در صورت نیاز ممکن است در نظر گرفته شود. لذا در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف با پزشک معالج مشورت گردد.

دوزهای بالاتر از ۲۰ میلی‌گرم در روز از ویتامین B۶ در خانم شیرده توصیه نمی‌شود. قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

- **موارد منع مصرف:** مصرف این محصول به کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌شود، مگر با تشخیص و صلاحدید پزشک.
- **عوارض جانبی احتمالی:** هر دارو و یا فرآورده مکمل به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. برخی از عوارض بالقوه عبارتند از: اسهال، درد شکمی، واکنش‌های آلژیک پوستی. در صورت بروز عوارض با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه ۱ تا ۳عدد قرص می‌باشد، از افزایش میزان مصرف شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** مصرف دوزهای بالای ویتامین ب ۶ برای مدت طولانی (به عنوان مثال چندین ماه تا چندین سال) می‌تواند باعث سوزن شدن اندام‌ها، اختلالات تعادلی، لرزش دست و پاها و یا بروز مشکلاتی در هماهنگی حرکتی شود. این عوارض معمولا با توقف مصرف، برطرف می‌شوند. از مصرف بیش از دوره تجویز شده خودداری شود.
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و داخل بسته‌بندی خود نگهداری شوند. دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود. از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری شود.



- **نام فرآورده: MEDICEVO**
- **نام تجاری/ برند: MEDICEVO**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ۳۰ عدد کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per tablet	NRV٪
Vitamin B۶	mg ۱/۷	۱۰۰
Folic acid	mcg ۴۰۰	۱۷۰
Vitamin B۱۲	mcg ۲/۴	۱۰۰
Coffee fruit extract	mg ۲۰۰	-
Phosphatidylserine	mg ۱۰۰	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
افزایش تمرکز و کاهش حواس‌پرتی، افزایش دقت و سرعت در عملکرد، افزایش عملکرد حافظه و یادآوری سریع‌تر مطالب، بهبود یادگیری مطالب جدید، افزایش توانایی تمرکز طولانی، افزایش توانایی استدلال، تفکر و درک به روش منطقی.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر شب یک کپسول قبل از خواب همراه با یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک و یا داروساز مشورت کنید:
در صورت بارداری و شیردهی
در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه‌ای
در صورت مصرف سایر داروها
در صورت بروز عوارض جانبی شدید از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید. این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر با صلاحدید و تشخیص پزشک معالج.
- **موارد منع مصرف:** حساسیت شناخته شده به این فراورده و مشتقات آن و یا هر یک از اجزای فرمولاسیون از جمله ژلاتین، سویا، رنگ‌ها و ...
در افراد زیر ۱۸ سال مگر با تشخیص و صلاحدید پزشک معالج
در صورت ابتلا به بیماری زمینه‌ای مزمن مگر با تشخیص و صلاحدید پزشک معالج مصرف شود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در حین مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی هر شب یک کپسول می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**-
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در جای خشک و دور از نور و در دمای محیط (کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.



- نام فرآورده: Prenatal multivitamin
- نام تجاری/ برند: Prenatal multivitamin
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر
- تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر
- شـکل فـرآورده و تعداد در بسـته بنـدی: قوطی‌های حـاوی ۹۰ قرص
- اجزای فـرآورده و مقادیر آن:

اجزا	Amount per serving	NRV٪
(Vitamin A (As Acetate	mg ۳/۵۴	۵۹
(As Cholecalciferol) Vitamin D۳	mcg ۲۵	۱۶۷
As Thiamine) Vitamin B۱ (Mononitrate	mg ۱/۴	۱۰۰
(Riboflavin) Vitamin B۲	mg ۱/۴	۸۸
(As Niacinamide) Vitamin B۳	mg ۱۸	۱۰۰
As d-Calcium) Vitamin B۵ (Pantothenate	mg ۶	۸۶
As Pyridoxine) Vitamin B۶ (Hydrochloride	mg ۱/۹	۹۵
(As Cyanocobalamin) Vitamin B۱۲	mcg ۵/۲	۱۸۶
Folic acid	mcg ۸۰۰	۲۲۲
(Vitamin C (As Ascorbic Acid	mg ۸۵	۷۱
Vitamin E (As dl-alpha Tecopheryl (Acetate	mg ۱۵	۷۹
(Vitamin K (As Phytonadione	mcg ۹۰	۱۰۰
Biotin	mcg ۳۰	۸۶
(Calcium (As Calcium carbonate	mg ۲۵۰	۱۹
(Magnesium (As Magnesium oxide	mg ۴۵	۱۱
(Iron (As Ferrous Fumarate	mg ۲۷	۱۰۰
(Iodine (As potassium iodide	mcg ۱۵۰	۵۲
(Zinc (As Zinc oxide	mg ۱۱	۸۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کارملوز سدیم، پرژلاتین استارچ، میکروکریستالین سلولز ۱۰۲، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان (بانوان)
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به سلامت عمومی بدن و حفظ مواد مغذی مورد نیاز بدن در زنان باردار و شیرده.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** هر روز یک عدد قرص مولتی ویتامین پریناتال همراه یکی از وعده‌های غذایی مصرف شود.

میزان مصرف پیشنهادی روزانه یک قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.

بهتر است قرص مولتی ویتامین پریناتال از اولین روز بارداری و حتی قبل از شروع بارداری تا پایان دوران شیردهی مصرف شود.

برای بلعیدن راحت‌تر قبل و بعد از قورت دادن، آب مصرف نمایید.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** اگر در حال مصرف داروهای دیگر هستید یا مشکلات انعقادی خون دارید پیش از مصرف این دو محصول با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف تصادفی بیش از اندازه محصولات حاوی آهن در کودکان زیر ۶ سال می‌تواند مسمومیت مرگ‌باری ایجاد نمایید. این محصول را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. در صورت مصرف تصادفی بیش از حد این مکمل سریعا با پزشک یا مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** بهتر است قرص مولتی ویتامین پریناتال از اولین روز بارداری و حتی قبل از شروع بارداری تا پایان دوران شیردهی مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** افرادی که در حال مصرف دارو/ داروها هستند و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای (به خصوص مشکلات انعقادی خون) می‌باشند، قبل از مصرف این فرآورده، حتما با پزشک و یا داروساز مشورت کنند. با توجه به این که این فرآورده برای خانم‌های باردار و مادران شیرده فرموله شده، لذا مصرف این فرآورده برای کودکان زیر ۱۲ سال بدون مشورت با پزشک و داروساز ممنوع است.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده بر روی برچسب دارو، سریعا با پزشک و یا مرکز کنترل مسمومیت تماس گرفته شود.

در صورت بروز علائم حساسیت به هر یک از اجزای این فرآورده بلافاصله مصرف آن را قطع و به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

در صورت پلمپ نبودن درب محصول از مصرف آن خودداری نمایید.

این فرآورده مکمل تغذیه‌ای بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی گزارش نشده است.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** افرادی که در حال مصرف دارو/ داروها هستند و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای (به خصوص مشکلات انعقادی خون) می‌باشند، قبل از مصرف این فرآورده، حتما با پزشک و یا داروساز مشورت کنند. با توجه به این که این فرآورده برای خانم‌های باردار و مادران شیرده فرموله شده، لذا مصرف این فرآورده برای کودکان زیر ۱۲ سال بدون مشورت با پزشک و داروساز ممنوع است.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه یک قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** در صورت مصرف تصادفی بیش از حد این مکمل سریعا با پزشک یا مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید.
- **شرایط نگهداری فرآورده:** قرص‌ها در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و داخل بسته بندی خود نگهداری نما یید .

از یخ زدگی محافظت شود.

دور از دیدی و دسترس کودکان نگهداری شود.

از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری گردد.





- **نام فرآورده: Tall bone**
- **نام تجاری/ برند: Tall bone**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ٦٠ عدد قرص**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per serving	NRV٪
Vitamin D3 (cholecalciferol)	۵ mcg (۲۰۰IU)	۶۷
Vitamin K2 (menaquinone-7)	۴۵ mcg	۷۵
Calcium (As Carbonate)	۲۵۰ mg	۵۰
Magnesium (As oxide)	۱۲۵ mg	۶۲/۵

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کراس کاراملوز سدیم، پوویدون، لاکتوز مونوهیدرات، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها، جبران کمبود کلسیم و ویتامین کا۲ و ویتامین د۳، کاهش خطر شکستگی استخوان در استئوپروزیس (پوکی استخوان)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه دو قرص همراه غذا مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

این فرآورده مکمل بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** اگرچه عوارضی گزارش نشده است لیکن در صورت بروز هر عوارضی با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه ۲ عدد قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**-
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.

- **نام فرآورده: TALLFACTOR**
- **نام تجاری/ برند: TALLFACTOR**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: بطری ۲۴۰ میلی لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



اجزا	Amount per 3 ml	NRV٪
L-arginine	mg ۵۰۳/۹۵	-

- **اجـزای غیرفعـال فـرآورده (اکسـیپیانت):** سـدیم فسـفات دی بازیـک و مونوبازیـک، متیـل پارابـن، پروپیـل پارابـن، زانتـان گام،گلیسـرین، سـوربیتول، سـوکرالوز، طعـم دهنـده تـوت فرنگـی و رنـگ دهنـده E۱۲۷.
- **رده سنی:** کودکان
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:** کمـک بـه تحریـک ترشـح هورمـون رشـد، عضله‌سـازی، تقویـت سیسـتم ایمنـی، بهبـود جریـان خـون و تنظیـم متابولیسـم چربـی.
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** کـودکان ۴ تـا ۷ سـال: روزانـه ۳ میلی‌لیتـر، کـودکان بـالای ۷ سـال: روزانـه ۶ میلـی لیتـر
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** در صـورت مصـرف سـایر داروهـا، مکمل‌هـا و یـا ابتـلا بـه بیمـاری زمینـه‌ای، پیـش از مصـرف ایـن فـرآورده بـا پزشـک مشـورت نماییـد. مقـدار توصیـه شـده را بـدون مشـورت بـا پزشـک یـا داروسـاز افزایـش ندهیـد. دور از دیـد و دسـترس کـودکان قـرار گیـرد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **مـوارد منـع مصـرف:** در صـورت بـروز حساسـیت بـه مـواد تشـکیل‌دهنده از مصـرف ایـن مکمـل خـودداری شـود.
- **عـوارض جانبـی احتمالـی:** در هنـگام اسـتفاده مقادیـر مشـخص شـده، عـوارض جانبـی خاصـی گـزارش نشـده اسـت. در صـورت بـروز هرگونـه عـوارض جانبـی مصـرف فـرآورده را قطـع کـرده و بـا پزشـک خـود مشـورت نماییـد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمـم دوز مصرفـی در طـول روز:** میـزان مصـرف پیشـنهادی روزانـه ۳ میلی‌لیتـر بـرای کـودکان ۴ تـا ۷ سـال و ۶ میلی‌لیتـر بـرای کـودکان بـالای ۷ سـال می‌باشـد، از افزایـش میـزان مصـرف شـده بـدون نظـر پزشـک خـودداری نماییـد.
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای کمتـر از ۳۰ درجـه سـانتیگراد، در بسـته بنـدی اصلـی و دور از نـور مسـتقیم خورشـید و رطوبـت نگهـداری شـود.




- **نام فرآورده:** TMG ® TRIMETHYL GLYCINE
- **نام تجاری/ برند:** TMG ® TRIMETHYL GLYCINE
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی کوثر
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی کوثر
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قوطی های حاوی ۶۰ عدد کپسول
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per serving	NRV٪
(Trimethyl glycine (Betaine	۵۰۰ mg	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تری متیل گلایسین (تی ام جی) (بتائین) ترکیبی طبیعی برگرفته از گیاه چغندر است که با کمک به حفظ سطح مناسب سروتونین موجب بهبود خلق و خو، افزایش تمرکز، افزایش سطح انرژی و تندرستی می‌شود. تی ام جی با نقش داشتن در تنظیم سطح هموسیستئین بدن، برای سلامت قلب و عروق کمک کننده است. این محصول کمک می‌کند تا سلول‌ها حجم طبیعی خود را حفظ کنند که این ویژگی خصوصا از کلیه‌ها در برابر مقادیر بالای الکترولیت و اوره محافظت می‌کند. تی ام جی همچنین با مکانیسم‌های ویژه‌ای مانع از تجمع چربی در کبد می‌شود و از این رو در بهبود عملکرد کبد و پیشگیری از کبد چرب کمک کننده است. به طور کلی تی ام جی نقش بسزایی در کنترل مسیرهای التهابی بدن ایفا می‌کند.
کمک به متابولیسم طبیعی هموسیستئین
کمک به متابولیسم چربی‌ها و عملکرد کبد از طریق کولین (تی ام جی فرم فعال کولین می‌باشد)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد کپسول همراه غذا با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
بیش از دوز توصیه شده مصرف نگردد.

این فرآورده مکمل تغذیه‌ای بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت حساسیت شدید به هریک از اجزای محصول حاوی بتائین، در صورت بارداری و یا شیردهی و نیز کسانی که مبتلا به گاستریت، بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) یا بیماری زخم معده هستند، مصرف نشو د .
- **موارد منع مصرف:** در صورت حساسیت شدید به هریک از اجزای محصول حاوی بتائین، در صورت بارداری و یا شیردهی و نیز کسانی که مبتلا به گاستریت، بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) یا بیماری زخم معده هستند، مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** حالت تهوع مقطعی، استفراغ و اسهال گزارش شده است لذا در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی مصرف فرآورده را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه ۱ عدد کپسول می‌باشد، از افزایش میزان مصرف شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود. دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.



- نام فرآورده: SERAMOL
- نام تجاری/ برند: SERAMOL
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر
- تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر
- شـکل فـرآورده و تعـداد در بسـته بندی: بسـته های حـاوی ۳۰ عدد قـرص شـب و ۳۰ عدد قـرص روز به صـورت بلیسـترهای ۱۰ عددی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: ترکیبات قرص روز:

اجزا	Amount per serving	NRV٪
Vitamin B6(As Pyridoxine Hcl)	۱۰mg	۵۹۰
Folic Acid	mcg ۳۳۳	۸۰
Vitamin B12(Cyanocobalamin)	mg ۵۰	۲۰۸۰
Hydroxytryptophan	۵۰mg	-
Theanine	mg ۵۰	-

- اجزای فرآورده و مقادیر در ترکیبات قرص شب:

اجزا	Amount per serving	NRV٪
Vitamin E (As d-alpha tocopheryl succinate)	۳۰/۷۵mg	۱۷۰
Calcium (As Calcium Carbonate)	mg ۷۲	۶
L-glutamine	mg ۸۰۰	-
Valerian extract (Valerian officinal-ist) (root)	۳۰mg	-
Grapeseed extract (Vitis Vinifera)	۲۵mg	-
Melatonin	mg ۳	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز۱۰۲، کراس کاراملوز سدیم، پوویدون کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، منیزیم استئارات.
- **رده سنی:** بالای ۱۸ سال.
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** سرامول® به عنوان یک فرآورده‌ی مکمل، به کنترل استرس و اضطراب، بهبود الگوی خواب طبیعی، ایجاد آرامش و ارتقا سلامت عمومی بدن کمک نموده و هیچگونه وابستگی در فرد ایجاد نمی‌نماید.

قرص روز حاوی ویتامین‌های ب۶، فولیک اسید، ب۱۲، ۵-هیدروکسی تریپتوفان و ال-تئانین است که با کمک به افزایش سطح سروتونین سبب بهبود و ارتقا وضعیت روحی، حفظ آرامش و کنترل استرس می‌شود. ال-تئانین و ۵-هیدروکسی تریپتوفان با کمک به ایجاد الگوهای خواب طبیعی و دستیابی به خواب آرامش‌بخش، سلامت عمومی بدن را به همراه می‌آورند. مصرف این دو ماده همچنین موجب کاهش تاثیرات مخرب استرس و اضطراب بر بدن می‌گردد.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قرص روز (زرد): یک قرص در روز همراه غذا میل شود.

قرص شب (آبی): هر شب یک عدد قبل از خواب میل شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت سابقه ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا مصرف داروهای مورد استفاده برای بیماری‌های افسردگی، میگرن، پارکینسون و اختلالات اعصاب و روان با پزشک خود مشورت نمایید.

از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی، سنین کمتر از ۱۸ سال نیز مصرف همزمان این فرآورده با مکمل‌های حاوی ال-تریپتوفان یا ۵- هیدروکسی تریپتوفان خودداری نمایید.

این فراورده مکمل تغذیه‌ای است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی اجتناب شود.
- **موارد منع مصرف:** دوران بارداری و شیردهی. افراد با سنین کمتر از ۱۸ سال. مصرف همزمان این فرآورده با مکمل‌های حاوی ال-تریپتوفان یا ۵-هیدروکسی تریپتوفان.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در هنگام استفاده مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی مصرف فراورده را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها به ویژه داروهای افسردگی، میگرن، پارکینسون و اختلالات اعصاب و روان.

در صورت مصرف با سایر مکمل‌های حاوی ال-تریپتوفان یا ۵-هیدروکسی تریپتوفان.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی در روز ۱ عدد همراه غذا و یک عدد قبل از خواب می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**-
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.





- **نام فرآورده: Folinic acid**
- **نام تجاری/ برند: Folinic acid**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ۶۰ عدد کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per capsule	NRV٪
Folinic acid (Leucovorin Calcium)	mcg ۴۰۰	۱۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین فولات مورد نیاز بدن و کمک به سلامت سیستم عصبی
فرم فعال و طبیعی اسید فولیک
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان: روزانه یک کپسول همراه آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** مکمل تغذیه‌ای نباید به عنوان جایگزین یک رژیم متنوع و متعادل استفاده شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
از دوز اعلام شده بیشتر مصرف نشود مگر با توصیه پزشک.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی‌باشد. مصرف مکمل غذایی نباید جایگزین یک رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی در حین مصرف این فرآورده، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه یک عدد کپسول می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.



- **نام فرآورده: Folinic acid**
- **نام تجاری/ برند: Folinic acid**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قوطی های حاوی ۶۰ عدد کپسول**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per serving	NRV٪
Vitamin C	mg ۱۶۶/۶۷	۱۸۴
Acetylcysteine	mg ۴۰۰	-
Quercetin	mg ۲۶/۶	-
Curcumin	mg ۲۵	-
Lycopene	mg ۱/۶۶	-
Grape seed extract (%95 OPC)	۵۰mg	-
Vitamin E	IU ۵۰	۱۴۷
Vitamin B6	۱۶mg	۱۲۳۰
Zinc citrate	mg ۳/۳	۳۰
Vitamin B12	mcg ۷۹۸	۴۴۳/۳
Folic acid	mcg ۲۰۰	۵۰
Vitamin D3	IU ۲۰۰	۳۳/۳

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، پوویدون K۳۰، کراس کارملوز سدیم.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**

ک-تکس® یک فرآورده با فرمولاسیون پیشرفته شامل ماده ان-استیل سیستئین و چند نوع آنتی‌اکسیدان طبیعی، ویتامین‌ها و زینک است که می‌تواند در بهبود آسیب‌های ریوی کمک کننده باشد.

ک-تکس® در ترمیم آسیب سلولی ریه ناشی از آلودگی‌های موجود در هوا یا دود سیگار و دخانیات و حتی ورزش‌های سنگین کمک می‌کند و همچنین دارای اثرات پیشگیرانه از این آسیب‌ها می‌باشد. این محصول با جلوگیری از آسیب سلول‌های ریوی دراثر استرس اکسیداتیو، خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد، تسریع در ترمیم زخم و تشکیل بافت همبند و تقویت عملکرد سیستم ایمنی، باعث تقویت سیستم تنفسی می‌گردد.

ماده ان- استیل سیستئین موجود در این فرآورده در بهبود علائم برونشیت مزمن ناشی از استرس اکسیداتیو موثر است.

مناسب برای: افراد استعمال کننده دخانیات یا در معرض دود

آن، افراد با سابقه استعمال دخانیات، آلرژی‌های محیطی، حساسیت تنفسی به مواد شیمیایی گوناگون، افراد مبتلا به اختلالات تنفسی یا سرفه، افراد در حال بهبودی پس از ابتلا به سرماخوردگی، برونشیت یا نوموني، ورزشکاران.

- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** یک عدد قرص سه بار در روز ۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف داروهای دیگر توصیه می‌شود. این فرآورده به همراه غذا و یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت بارداری، شیردهی و مصرف سایر داروها و یا ابتلا به بیماری زمینه‌ای پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

این فرآورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.

در صورت بروز عوارض جانبی شدید از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشك مراجعه کنید.

در صورت تمایل به مصرف این فراورده برای بیش از ۱۲ هفته، با پزشك و یا داروساز مشورت نمایید.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشك معالج مشورت شود.
- **موارد منع مصرف:** در افرادی که تحت درمان با آنتی‌بیوتیک هستند، منع مصرف دارد. در افرادی که تحت درمان با فرآورده‌های حاوی نیتروگلیسیرین هستند، منع مصرف دارد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** در هنگام استفاده مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی مصرف فراورده را قطع کرده و با پزشك خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه‌ای از جمله ابتلا به سنگ کلیه، سنگ صفراوی، انسداد مجاری صفراوی، ترشح بیش از اندازه اسید معده و یا زخم معده.

در صورت مصرف سایر داروها به ویژه فرآورده‌های ضد تجمع پلاکتی، داروهای رقیق‌کننده خون قبل از مصرف این محصول با پزشك و یا داروساز مشورت نمایید.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی یک عدد قرص سه بار در روز ۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف داروهای دیگر توصیه می‌شود، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.





- نام فرآورده: Multivitamin mineral
- نام تجاری/ برند: Multivitamin mineral
- شرکت صاحب پروانه: شرکت داروسازی کوثر
- تولیدشده در: شرکت داروسازی کوثر
- شـکل فـرآورده و تعداد در بسـته بنـدی: قوطی های حـاوی ۶۰ عدد قرص
- اجزای فرآورده و مقادیر آن:

NRV٪	Amount per serving	اجزا
۷۵	mg ۰/۸	Vitamin A
۱۰۰	mg ۱/۴	Vitamin B1
۱۱۴	۱/۶	Vitamin B2
۱۱۳	mg ۱۸	Niacin
۱۰۰	۶mg	Vitamin B5
۴۰	mg ۰/۰۰۱	Vitamin B12
۱۰۰	mg ۰/۲	Folic acid
۷۵	mg ۶۰	Vitamin C
۱۰۰	mg ۰/۰۰۵	Vitamin D3
۸۳	mg ۱۰	Vitamin E
۳۰۰	mg ۰/۱۵	Biotin
۴۰	mg ۰/۰۳	Vitamin K
۲۰	mg ۱۶۲	Calcium elemental
۲۷	۱۰۰mg	Magnesium oxide
۱۸	mg ۱۲۵	Phosphorus
۱۵۰	mg ۰/۰۶	Chromium
۳۶	mg ۵	Iron
۶۷	mg ۰/۰۱	Iodine
۱۰۰	mg ۱	Copper
۱۰۰	mg ۲	Manganese sulfate
۱۶۰	mg ۰/۰۸	Molybdenum
۵۵	mg ۰/۰۳	Selenium
۵۰	mg ۵	Zinc
۱۴۳	mg ۲	Vitamin B۶

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** کلسیم فسفات دیبازیک مونوهیدرات، سدیم کراس کاراملوز سدیم، هیدروکسی پروپیل سلولز، میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، تالک، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** مولتی ویتامین مینرال مخلوط متنوعی از مواد مغذی بوده که می‌تواند میزان مناسبی از ویتامین‌ها و مواد معدنی را برای افرادی که قادر به دریافت میزان کافی مواد مغذی از وعده‌های غذایی خود به تنهایی نیستند فراهم کند و به حفظ و ارتقا سلامت عمومی بدن کمک کند. این محصول به علت دارا بودن مقادیر قابل توجه آنتی‌اکسیدان‌ها مانند ویتامین C و E و عنصر روی می‌تواند به بدن کمک کند که با عوامل بیماری‌زا مانند ویروس‌ها و باکتری‌ها مقابله و در ارتقا سیستم ایمنی بدن نقش موثری ایفا نماید.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد قرص همراه با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت وجود بیماری‌های زمینه‌ای، سنین زیر ۱۲ سال، بارداری و شیردهی و مصرف داروهای رقیق‌کننده خون به خصوص وارفارین پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

این فرآورده یک مکمل رژیمی غذایی است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** در صورت بارداری و شیردهی پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود بیماری‌های زمینه‌ای، سنین زیر ۱۲ سال، بارداری و شیردهی و مصرف داروهای رقیق کننده‌ی خون به خصوص وارفارین، پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

بیش از دوز توصیه شده مصرف نگردد.

این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.

مصرف مکمل غذایی نباید جایگزین یک رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم گردد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** در هنگام استفاده مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی مصرف فراورده را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت وجود بیماری‌های زمینه‌ای و مصرف داروهای رقیق‌کننده خون به خصوص وارفارین پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه یک عدد قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.





- **نام فرآورده:** NEOLIVA
- **نام تجاری/ برند:** NEOLIVA
- **شرکت صاحب پروانه:** شرکت داروسازی کوثر
- **تولیدشده در:** شرکت داروسازی کوثر
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** قوطی های حاوی ۶۰ عدد قرص جویدنی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

اجزا	Amount per capsule	NRV٪
Magnesium Aspartate	mg ۲۰	۱۲
Zinc picolinate	mg ۰/۷۵	۱۲
5 HTP	mg ۵۰	-
L-Theanine	mg ۱۵	-
N-acetyl cysteine	mg ۱۵۰	-
L-glutamine	mg ۲۰۰	-

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** میکروکریستالین سلولز، منیزیم استئارات، کلوئیدال سیلیکون دی اکساید، کراس کاراملوز سدیم، پوویدون k۳۰ ، آلیل هگزانوات، استویا
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** نئولیوا حاوی منیزیم، زینک و چند ماده مغذی مورد نیاز و ضروری برای ساخت پیام‌رسان‌های عصبی می‌باشد. فرمولاسیون ویژه‌ی نئولیوا و خاصیت تقویتی آن بر اکسیژن‌رسانی به مغز، این محصول را برای کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم، اختلال بیش‌فعالی و بسیاری از اختلالات اضطرابی مختلف در کودکان و بزرگسالان مناسب و قابل استفاده کرده است. این محصول جهت کمک به بهبود علائم ناشی از : اختلال طیف اوتیسم (ASD)، اختلال فراگیر رشد (PDD)، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، اختلال کم‌توجهی (ADD) و کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)، کمبود سروتونین و دوپامین، بی‌خوابی، اضطراب، افسردگی، اختلالات قاعدگی و سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS).
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان : هر شب یک ساعت قبل از خواب ۲ عدد قرص جویده شود.

کودکان: هر شب یک ساعت قبل از خواب ۱ عدد قرص جویده شود.

- **هشدار و احتیاط‌ها:** در صورت مصرف سایر داروها، آلرژی و یا ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر با صلاحیت پزشک. این فرآورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر با صلاحیت پزشک.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود بیماری‌های زمینه‌ای، سنین زیر ۱۲ سال، بارداری و شیردهی و مصرف داروهای رقیق‌کننده‌ی خون به خصوص وارفارین، پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

بیش از دوز توصیه شده مصرف نگردد.


این فراورده مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و درمان نمی‌باشد.

مصرف مکمل غذایی نباید جایگزین یک رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم گردد.

- **عوارض جانبی احتمالی:** در هنگام استفاده مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی مصرف فرآورده را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت مصرف سایر داروها، آلرژی و یا ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** میزان مصرف پیشنهادی روزانه ۲ عدد قرص می‌باشد، از افزایش میزان توصیه شده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:-**
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در بسته‌بندی اصلی و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.

KIMIA
داروسازی کیمیا سلامت خاورمیانه

شرکت کیمیا سلامت ایرانیان





- نـام فرآورده:مولتـی ویتامیـن و مولتی مینـرال (عصاره جینسـینگ، ویتامیـن هـای گـروه ب و ویتامیـن ث) حـاوی پـره بیوتیک ها
- نام تجاری/ برند: Advancis energy vitamins
- شـرکت صاحـب پروانـه: کیمیـا سـلامت ایرانیـان تحت لیسـانس فارمودیتیـکا پرتغال
- تولیدشده در: فندا -ایران
- شـکل فـرآورده و تعداد در بسـته بندی: قرص - ۳۰ عدد - ۳ بلیسـتر ۱۰ عـددی - جعبه مقوایی
- اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک قرص:

جز	مقدار
Fructooligosaccharides(FOS)	۱۰۰ میلی‌گرم
GOS))Galactooligosaccharides	۱۰۰ میلی‌گرم
Panax ginseng, Ginseng - Dry Extract	۸۰ میلی‌گرم
Tricalcium Phosphate	۱۹۴.۳ میلی‌گرم
Dicalcium phosphate	۱۰۶ میلی‌گرم
calcium	۹۰ میلی‌گرم
Phosphorus	۵۸ میلی‌گرم
Copper(as sulfate)	۲.۵ میلی‌گرم
Copper	۱ میلی‌گرم
Chromium picolinate	۳۲۰ میکروگرم
Chromium	۴۰ میکروگرم
Iron fumarate	۴۲.۶ میلی‌گرم
Iron	۱۴ میلی‌گرم
potassium iodide	۲۰۰ میکروگرم
Iodine	۱۵۳ میکروگرم
Potassium	۴۷ میکروگرم
Magnesium carbonate	۲۹۱ میلی‌گرم
Magnesium	۷۰ میلی‌گرم
Manganese sulphate	۶.۲ میلی‌گرم
Manganese	۲ میلی‌گرم
Sodium Selenite	۱۲۱ میکروگرم

selenium	۵۵ میکروگرم
Zinc oxide	۲۴.۹ میلی‌گرم
Zinc	۲۰ میلی‌گرم
Folic acid(pteroylglutamic acid)	۲۰۰ میکروگرم
Biotin(D-biotin)	۵۰ میکروگرم
Vitamin A(retinyl acetate)	۸۰۰ میکروگرم
Vitamin B۱(thiamine HCl)	۱.۱ میلی‌گرم
Vitamin B۲(Riboflavin ۵'-phosphate sodium)	۱.۴ میلی‌گرم
Vitaimin B۵ Pantothenic acid (Calcium D-Pantothenate)	۶ میلی‌گرم
Vitamin B۶(Pyridoxine HCl)	۱.۴ میلی‌گرم
Vitamin B۱۲(Cyanocobalamin)	۲.۵ میکروگرم
Vitamin C(L - Ascorbic acid)	۱۲۰ میلی‌گرم
Vitamin D۳(Cholecalciferol)	۵ میکروگرم
Vitamin E(DL-Alfa - Tocopheryl acetate)	۱۲ میلی‌گرم
Vitamin K(Phytomenadione)	۷۵ میکروگرم
Vitamin PP-Niacin(Nicotinamide)	۱۶ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسـپیانت):**لاکتوز، نشاسـته گندم، سـدیم کربوکسـی متیـل سـلولز کراس لینـک، میکروکریسـتالین سـلولز، نمک منیزیـم اسـیدهای چرب، منیزیم سـیلیکات، منیزیوم اسـتئارات
- **رده سنی:** بزرگسالان و جوانان بالای ۱۶ سال
- **مـوارد مصـرف برای اسـاس اطلاعات درج‌شـده در فـرآورده:** افزایش انرژی
تقویت سیستم ایمنی و کاهش استرس
ادونسـیس انـرژی به منظـور اسـتفاده در افراد فعال که نیـاز به تقویت بیشـتر جهـت مقابله با اسـترس، خسـتگی ذهنـی و فیزیکـی، فرموله شـده است.
ایـن فـرآورده حاوی پـره بیوتیک‌هایی اسـت که جذب مـواد معدنی را افزایـش داده و باعـث بالا رفتن سـنتز ویتامین‌ها می‌شـود.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه ۱ قرص بعد از صبحانه
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده یک دارو نیست.
این فرآورده جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.
ایـن فـرآورده نبایـد بـه عنـوان جایگزین رژیـم غذایی متعادل و سـالم در نظـر گرفته شـود.
این فرآورده حاوی لاکتوز و گندم است
مصرف این فرآورده در افراد زیر ۱۶ سال توصیه نمی‌شود.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** مصـرف ایـن فـرآورده در دوران بـارداری و شـیردهی توصیـه نمی‌شـود.
- **مـوارد منـع مصـرف:** در مـوارد حساسـیت شـدید یـا آلـرژی به هر یـک از ترکیبـات ایـن محصـول از مصـرف آن خـودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمـم دوز مصرفـی در طول روز:** از مصرف بیـش از مقادیر توصیه شـده پرهیز شود.
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**-
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** در دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتیگراد، در جـای خشـک و دور از نـور و حـرارت نگهـداری شـود. دور از دسـترس کـودکان نگهداری شـود.

- **نام فرآورده: سیدرال فورت آی ان تی (آهن سوکروزومیال و ویتامین ث) - فاقد گلوتن**
- **نام تجاری/ برند: سیدرال فورت آی ان تی**
- **شرکت صاحب پروانه: کیمیا سلامت ایرانیان تحت لیسانس فارمانوترا - ایتالیا**
- **تولیدشده در: داروسازی طب مفید نیکان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول - ۲۰ عدد - به صورت ۲ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک کپسول:**

آهن سوکروزومیال (آیرون پیروفسفات، نشاسته برنج پری ژلاتینه، سوکرواسترهای اسید چرب، لستین آفتاب گردان در شرت گلوکز، پروتئین‌های شیر، تری کلسیم فسفات)



جز	مقدار
آهن (سوکروزومیال)	۳۰ میلی‌گرم
آسکوربیک اسید (ویتامین ث)	۷۰ میلی‌گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نمک‌های منیزیم اسید چرب، سیلیکون دی اکساید، اکسید آهن قرمز، تیتانیوم دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** سیدرال فورت آی ان تی یک مکمل خوراکی بر پایه‌ی آهن سوکروزومیال و ویتامین ث است که برای جبران کمبودهای رژیم غذایی یا نیاز به مقادیر بیشتر از املاح گفته شده مناسب است. آهن موجود در سیدرال فورت آی ان تی آهنی است که با تکنولوژی سوکروزومیال احاطه شده است که منجر به عبور آهن به‌صورت دست نخورده از سیستم گوارش و جذب آن به طور مستقیم از مخاط روده می‌گردد. در نتیجه از ایجاد هرگونه اختلال گوارشی جلوگیری می‌کند. سیدرال فورت آی ان تی فرمی از آهن پیروفسفات است که با یک غشای سوکروزومیال احاطه شده است که منجر به فراهمی زیستی بالای این محصول می‌گردد. این تکنولوژی منجر به محافظت مخاط دهان و سیستم گوارش در برابر اکسیداسیون آهن می‌گردد و در نتیجه مانع طعم فلزی، ناراحتی گوارشی و تغییر رنگ مدفوع و مخاط می‌گردد. در واقع آهن موجود در این فراورده هرگز در تماس با مخاط قرار نمی‌گیرد، در نتیجه منجر به تحمل‌پذیری بالای سیستم گوارش و کاهش ریسک تحریکات گوارشی می‌گردد. این فراورده جهت کمک به جلوگیری از کم‌خونی فقر آهن ناشی از، از دست دادن حاد یا مزمن خون، جذب روده‌ای کم آهن و تامین آهن مورد نیاز بدن استفاده گردد. فراورده قابل استفاده در بیماران سلیاک و فاقد گلوتن می‌باشد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول با یک لیوان آب میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده جهت تشخیص، پیشگیری یا درمان بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری شود مگر با توصیه پزشک. این فراورده نباید به عنوان جایگزین رژیم غذایی متعادل و سالم در نظر گرفته شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فراورده دور از دید و دسترس کودکان زیر ۳ سال، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت نگهداری شود و از تماس آن با آب پرهیز شود. تاریخ انقضای ذکر شده برای فراورده ای می‌باشد که در شرایط مناسب نگهداری شده است.



- **نام فرآورده: سیدرال گوچه آی ان تی (آهن سوکروزومیال) - فاقد گلوتن**
- **نام تجاری/ برند: سیدرال گوچه آی ان تی**
- **شرکت صاحب پروانه: کیمیا سلامت ایرانیان تحت لیسانس جونیا فارما - ایتالیا**
- **تولیدشده در: داروسازی امین**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره خوراکی (به همراه یک ساشه ۱/۹ گرمی و قطره چکان) - ۳۰ میلی لیتر**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک کپسول:**

آهن سوکروزومیال (آیرون پیروفسفات، نشاسته برنج پری ژلاتینه، سوکرواسترهای اسید چرب، لسیتین آفتاب گردان در شربت گلوکز، پروتئین های شیر، تری کلسیم فسفات)

جزء	مقدار
آهن (سوکروزومیال)	۱۴ میلی‌گرم
آسکوربیک اسید (ویتامین ث)	۶۰ میلی‌گرم
سیانوکوبالامین (ویتامین ب۱۲)	۰/۳۷۵ میکروگرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، میکروکریستالین سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، نمک‌های منیزیم اسید چرب، سیلیکون دی اکساید، اکسید آهن قرمز، تیتانیوم دی اکساید.
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** سیدرال آی ان تی یک مکمل خوراکی بر پایه‌ی آهن سوکروزومیال و ویتامین ث و ویتامین ب ۱۲ است که برای جبران کمبودهای رژیم غذایی یا نیاز به مقادیر بیشتر از املاح گفته شده مناسب است. سیدرال آی ان تی، حاوی ۱۴ میلی‌گرم آهن به فرم سوکروزومیال در هر کپسول است، سیدرال آی ان تی فرمی از آهن پیروفسفات است که با یک غشای سوکروزومیال احاطه شده است که منجر به فراهمی زیستی بالای این محصول می‌گردد. این تکنولوژی منجر به محافظت مخاط دهان و سیستم گوارش در برابر اکسیداسیون آهن می‌گردد و در نتیجه مانع طعم فلزی، ناراحتی گوارشی و تغییر رنگ مدفوع و مخاط می‌گردد. در واقع آهن موجود در این فرآورده هرگز در تماس با مخاط قرار نمی‌گیرد، در نتیجه منجر به تحمل‌پذیری بالای سیستم گوارش و کاهش ریسک تحریکات گوارشی می‌گردد. این فرآورده جهت کمک به جلوگیری از کم‌خونی فقر آهن ناشی از، از دست دادن حاد یا مزمن خون، جذب روده‌ای کم‌آهن و تامین آهن مورد نیاز بدن استفاده گردد. فرآورده قابل استفاده در بیماران سلیاک و فاقد گلوتن می‌باشد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک کپسول با یک لیوان آب زیاد میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری یا درمان بیماری نمی‌باشد. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری شود مگر با توصیه پزشک. این فرآورده نباید به عنوان جایگزین رژیم غذایی متعادل و سالم در نظر گرفته شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده دور از دید و دسترس کودکان زیر ۳ سال، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت نگهداری شود و از تماس آن با آب پرهیز شود. تاریخ انقضای ذکر شده برای فرآورده ای می‌باشد که در شرایط مناسب نگهداری شده است.



- **نام فرآورده: سیدرال آی ان تی (آهن سوکروزومیال و ویتامین ث و ویتامین ب ۱۲) - فاقد گلوتن**
- **نام تجاری/ برند: سیدرال آی ان تی**
- **شرکت صاحب پروانه: کیمیا سلامت ایرانیان تحت لیسانس فارمانوترا - ایتالیا**
- **تولیدشده در: داروسازی طب مفید نیکان**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول - ۲۰ عدد - به صورت ۲ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک میلی لیتر:**


جزء	مقدار
آهن	۷ میلی‌گرم

- **محتویات ساشه:** آهن سوکروزومیال، مالتودکسترین.
- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** محتویات بطری: آب، ساکاروز، طعم دهنده، مالتودکسترین، صمغ زانتان، سیتریک اسید، استر ساکاروز اسیدهای چرب. پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** سیدرال گوچه آی ان تی، یک مکمل غذایی حاوی آهن سوکروزومیال است که در موارد کمبود مواد مغذی یا افزایش نیاز بدن به ملح ذکر شده موثر است. آهن برای نمو ادراکی مناسب در کودکان مفید است. آهن موجود در سیدرال گوچه آی ان تی که با تکنولوژی سوکروزومیال روکش شده است، از محیط معده به راحتی عبور میکند تا مستقیما در روده جذب شود و در نتیجه از هرگونه ناراحتی احتمالی معده جلوگیری میگردد. سیدرال گوچه آی ان تی در تمامی موارد کاهش دریافت آهن از طریق خوراکی، افزایش نیاز بدن به آهن یا جذب کم آهن در روده، می تواند مصرف شود. سیدرال گوچه آی ان تی منحصرا در موارد کمبود آهن، کم خونی ناشی از فقر آهن، در نوزادان نارس و نوزادانی که فقط از شیر مادر تغذیه میکنند، میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این محصول به عنوان مکمل غذایی در کودکان بین ۰ - ۳ سال مفید است. آهن یک ماده معدنی است که در تمام سلول های زنده یافت میشود. آهن جزء اصلی هموگلوبین در گلبول های قرمز است که به عنوان حامل اکسیژن نقش مهمی در بدن ایفا میکند. در برخی موارد، وقتی رژیم غذایی متعادل یا متنوع نیست، برای تقویت رشد کودکان، مصرف مکمل های غذایی از جمله آهن که عنصر مهمی برای نمو ادراکی کودکان است، ضروری است. آهن موجود در سیدرال گوچه آی ان تی، داخل یک غشاء فسفولیپید سوکروزومی، حمل میشود که باعث فراهمی زیستی بالای این فراورده میگردد. این تکنولوژی جدید این امکان را میدهد تا تحمل پذیری معده بهبود یابد. زیرا آهنی که در سوکروزوم محافظت شده، هرگز در تماس با بافت موکوسی سیستم گوارشی قرار نمیگیرد.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** چگونگی آماده سازی فراورده: پودر موجود در ساشه را به بطری اضافه کنید، درب آن را ببندید و خوب تکان دهید. قبل از هربار مصرف بطری را به خوبی تکان دهید. فقط پس از آماده سازی فراورده را مصرف کنید.

دستور مصرف پس از آماده سازی: مقدار مصرف توصیه شده روزانه ۱ میلی لیتر از محلول می باشد یا به مقداری که پزشک توصیه کرده است. از قطره چکان داخل بسته بندی استفاده کنید. محصول میتواند به طور مستقیم در دهان چکانده شود یا در مقداری آب حل و در هر زمان از روز مصرف گردد.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری‌ها نمی باشد. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده روزانه خودداری کنید. این فراورده نباید به عنوان جایگزین رژیم غذایی سالم و متعادل درنظر گرفته شود.

پس از آماده سازی در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد(یخچال) نگهداری و طی مدت یک ماه مصرف کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** -
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** محصول را در دمای اتاق (زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد)، دور از حرارت، نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری کنید. دور از دید و دسترس کودکان زیر ۳ سال نگهداری کنید. پس از آماده سازی، در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد (یخچال) نگهداری و طی مدت یک ماه مصرف کنید.

شرکت صنعتی کیمیدارو





- **نام فرآورده: لووکارنیتین 1 گرم (Levo Carnitine 1g)**
- **نام تجاری/ برند: Chemidarou**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت صنعتی کیمیدارو**
- **تولیدشده در: شرکت صنعتی کیمیدارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: محلول خوراکی - ٦ بطری ۱۰ میلی‌لیتری**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر ۱۰ میلی‌لیتر
ال-کارنیتین	۱ گرم

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** سیتریک اسید، سدیم سیترات دی هیدرات، سدیم بنزوات، سدیم ساخارین، سوربیتول ۷۰٪، اسانس گیلاس، آب خالص.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمبود کارنیتین، کمک به بهبود ضعف عضلانی، تنظیم متابولیسم بدن.
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** قطره خوراکی ال کارنیتین ۱۰۰۰، دوز خوراکی به میزان ۲ g/day (حداکثر دو بطری در روز)
کودکان: برای اطفال طبق دستور پزشک مصرف گردد.
فرآورده یکبار مصرف است.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.
قبل از مصرف این مکمل در موارد زیر، با پزشک معالج یا داروساز خود مشورت نمایید:
۱- در صورت داشتن سابقه بیماری قبلی یا حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه
۲- در صورت بارداری یا شیردهی
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** بارداری: این مکمل از نظر مصرف در بارداری گروه B می‌باشد.
شیردهی: از آنجا که احتمالا ترشح کارنیتین در شیر مادر وجود دارد مصرف این مکمل در دوران شیردهی باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد. هر چند تاکنون عارضه‌ای از ترشح این دارو در شیر انسان ثبت نشده است.
- **موارد منع مصرف:** در صورت مصرف مکمل در افراد مبتلا به دیابت میبایست قند خون کنترل گردد.
- **عوارض جانبی احتمالی:** عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند شامل:
۱. عوارضی که شیوع بیشتری دارند مانند: فشار خون بالا در بیماران دیالیز مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی (End Stage Renal Disease)
۲. عوارضی که شیوع کمتری دارند مانند: تب در بیماران دیالیزی با نارسایی مزمن کلیوی ESRD و تپش قلب یا (ضربان قلب سریع) در بیماران دیالیزی با نارسایی مزمن کلیوی ESRD
۳. عوارض نادر: ممکن است در بیمارانی که سابقه تشنج در آنها وجود دارد تشنج به شکل خفیف رخ دهد.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



- **نام فرآورده: ویتامین آ + د (Vitamin A + D)**
- **نام تجاری/ برند: Chemidarou**
- **شرکت صاحب پروانه: شرکت صنعتی کیمیدارو**
- **تولیدشده در: شرکت صنعتی کیمیدارو**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: قطره خوراکی - ۱۵ میلی لیتر ی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر میلی‌لیتر
ویتامین A	۱۵۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D۳	۴۰۰ واحد بین‌المللی

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** پلی سوربات ۸۰، بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن، متیل پارابن، پروپیل پارابن، سدیم ادتات، گلیسیرین، پروپیلن گلیکول، اسانس موز، آسپارتام.
- **رده سنی:** کودکان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تامین ویتامین آ و د و کمک به سلامت پوست، بینایی و استخوان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد. برای کودکان زیر ۴ سال از طریق خوراکی به میزان یک میلی‌لیتر روزانه طبق تجویز پزشک معالج می‌باشد. جهت برداشتن مقدار مشخص و صحیح دارو از قطره چکان استفاده نمایید.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فرآورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نمی‌باشد.

به دلیل وجود فنیل الانین مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری توصیه نمی‌شود.

این دارو برای وضعیت فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نما یید .

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

۱- حساسیت به هر نوع ویتامین و رنگ

۲ - وجود هر نوع بیماری خصوصاً بیماری‌های کبدی، هپاتیت ویروسی، سیروز، الکلیسم، نارسایی کلیوی، هیپرکلسمی، هیپرویتامینوز D، ناراحتی‌های قلبی - عروقی

- **مصرف در بارداری و شیردهی:** ویتامین A: در بارداری در گروه X طبقه بندی شده است و نباید در دوران بارداری مصرف گردد ولی در خصوص مصرف آن در دوران شیردهی مشکلاتی گزارش نشده است.

ویتامین D: در بارداری در گروه C طبقه بندی شده است و در شیردهی مطالعات چندانی بر روی آن صورت نگرفته است.

- **موارد منع مصرف:** مکمل‌های ویتامین A در صورت وجود هیپرویتامینوز اکیداً نباید مصرف شوند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** ویتامین D: عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارد:

دردهای استخوانی، یبوست، اسهال، تکرر ادرار، گیجی و خواب آلودگی، تهوع، طعم فلزی در دهان و مشکلات قلبی-عروقی

- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** ویتامین A : در صورت مصرف همزمان با داروهایی از قبیل مکمل‌های کلسیمی، کلستیرامین، ایزوترتینوئین و قرص‌های ضد بارداری تداخلات دارویی گزارش شده است.

ویتامین D: در صورت مصرف همزمان با آنتی اسیدهای آلومینیوم دار، باربیتورات‌ها، اتیدرونات، کلستیرامین، دیورتیک‌های تیازیدی و کورتون تداخلات دارویی گزارش شده است.

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار معین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.


- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** فرآورده را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

فرآورده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

پس از باز کردن در ظرف و قرار دادن قطره چکان، فرآورده به مدت ۳۰ روز قابل مصرف می‌باشد

DAROU NAVAK

شرکت ناوک دارو



- **نام فرآورده: کپسول آهن (فریک مالتول)**
- **نام تجاری/ برند: Ferric Maltol 30 mg**
- **شرکت صاحب پروانه: ناوک دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی جالینوس**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**



جز	مقدار در هر کپسول
Iron (Ferric Maltol)	۳۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):**
Lactose monohydrate, Sodium lauryl sulfate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, crosspovidone.
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به تأمین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** افراد بالای ۱۸ سال و بزرگسالان روزانه ۲ مرتبه هر بار یک کپسول با نصف لیوان آب، یک ساعت قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا، مصرف کنند و کپسول را کاملاً ببلعند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
قبل از مصرف دارو در صورت بیماری زمینه‌ای حتماً با پزشک مشورت کنید.
مصرف این محصول در افراد زیر ۱۸ سال، زنان باردار و دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.
در صورت مصرف این فراورده، از تزریق یا انفوزیون آهن اجتناب شود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** پیشنهاد نمی‌شود
- **موارد منع مصرف:** مصرف این فراورده در موارد ذیل توصیه نمی‌شود:
آلرژی به فریک مالتول
ابتلا به هرگونه بیماری زمینه‌ای که باعث تجمع/اختلال آهن در بدن می‌شود.
در صورتی که سابقه دریافت خون داشته‌اید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** ناراحتی یا نفخ در معده، یبوست، اسهال و حالت تهوع
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** بین مصرف مکمل‌های حاوی کلسیم یا منیزیم با این محصول حداقل ۲ ساعت فاصله بگذارید.
در صورت استفاده از سایر داروها از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای هورمونی، پارکینسون، پوکی استخوان و... حتماً قبل از مصرف با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص مولتی‌ویتامین و مینرال کودکان
- **نام تجاری/ برند:** Navak Multivitamins & Minerals for Kids
- **شرکت صاحب پروانه:** ناوک دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی جالینوس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۲ بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A (as Acetate)	۴۰۰ mcg (۱۶۰۰ IU)
Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate)	۱/۵ mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	۱/۵ mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	۱ mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	۳ mcg
Biotin	۳۰ mcg
Vitamin C (Sodium Ascorbate)	۵۰ mg
Vitamin D (Cholecalciferol)	۱۰ mcg (۴۰۰ IU)
Vitamin E (D-alpha-Tocopherol acetate)	۴/۵ mg (۱۰ IU)
Folate (Folic Acid)	۰/۱ mg
Niacinamide	۸ mg
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate)	۱۰ mg
Calcium (as Carbonate)	۱۶۰ mg
Iron (Ferrous Fumarate)	۴ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):**
Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Croscarmellose sodium, PVPK30, Citric acid acetate, Peach flavour, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Sucralose, Sunset yellow, Mannitol
- **رده سنی:** کودکان ۳ سال به بالا
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** تأمین ویتامین، مواد معدنی مورد نیاز کودکان، کمک به رشد و استحکام استخوان‌ها و سلامت دندان‌ها
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** کودکان ۳ سال و بالاتر از آن روزانه یک قرص همراه غذا یا مطابق با دستور پزشک بجوند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** در صورت به‌وجود آمدن علائم حساسیت، از مصرف فراورده خودداری شود. به علت وجود فنیل‌آلانین، در کودکان فنیل‌کتونوری مصرف نشود.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده:** قرص مولتی‌ویتامین و مینرال بارداری
- **نام تجاری/ برند:** Navak Multivitamins & Minerals for Pregnancy
- **شرکت صاحب پروانه:** ناوک دارو
- **تولیدشده در:** داروسازی جالینوس
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی:** ۲ بلیستر ۱۵ عددی
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر قرص
Vitamin A (as Palmitate)	IU ۴۰۰۰
Vitamin C (as Ascorbic Acid)	mg ۶۰
Vitamin D (Cholecalciferol)	IU ۴۰۰
Vitamin E (as Acetate)	IU ۳۰
Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate)	mg ۱/۷
Vitamin B2 (Riboflavin)	mg ۲
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	mcg ۸
Niacin (as Niacinamide)	mg ۲۰
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	mg ۲/۵
Biotin (as D-Biotin)	mcg ۳۰۰
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate)	mg ۱۰
Calcium (as Carbonate)	mg ۳۰۰
Iron (Ferrous Fumarate)	mg ۲۸
Iodine (as Potassium Iodide)	mcg ۱۵۰
Magnesium (as Magnesium Oxide)	mg ۵۰
Zinc (as Zinc Oxide)	mg ۱۵
Copper (as Copper Sulfate Pentahydrate)	mg ۲
Folate (Folic Acid)	mg ۰/۸

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):**
Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose sodium, Lactose monohydrate, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به تأمین ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بانوان پیش از بارداری، حین بارداری و زمان شیردهی.
پیشگیری از تولد نوزاد نارس و مسمومیت حاملگی
تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت پوست و مو و ناخن
حاوی ویتامین D، جهت حفظ سلامت استخوان‌ها
تأمین انرژی مورد نیاز بدن
حاوی ۲۸ میلی‌گرم آهن معادل نیاز روزانه‌ی مادران باردار به‌همراه ویتامین C جهت پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک قرص همراه با غذا میل شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
قبل از مصرف دارو در صورت وجود بیماری زمینه‌ای یا در صورت استفاده از سایر داروها، با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.a
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سافت‌ژل امگا ۳**
- **نام تجاری/ برند: Navak Omega 3**
- **شرکت صاحب پروانه: ناوک دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی کارن**
- **شـکل فرآورده و تعداد در بسـته بندی: ۳ بلیسـتر ۱۰ عددی کپسـول نرم**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در دو سافت‌ژل
Omega 3 Fatty Acids (from Fish oil)	۱۱۶۰ mg
DHA (Docosahexaenoic acid)	۹۶۰ mg
EPA (Eicosapentaenoic acid)	۲۰۰ mg

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسپیانت):**
Soybean oil, Glycerin, Vitamin E, Gelatin.
- **رده سنی:** -
- **مـوارد مصـرف بـرای اسـاس اطلاعـات درج‌شـده در فـرآورده:**
کمـک بـه حفـظ سـلامت سیسـتم عصبـی، حافظـه و بهبـود خلـق و خـو
کمـک بـه سـلامت خلـق و خـوی مـادران طـی دوران بـارداری و شـیردهی و کمـک بـه رشـد مغـزی جنیـن و نـوزاد
توصیه‌شـده بـه همـراه قـرص پریناتـال نـاوک بـا فرمولاسـیون ویـژه بـرای دوران بـارداری و شـیردهی
- **دسـتور صحیـح مصـرف فـرآورده:** بزرگسـالان ۲ عـدد همـراه بـا غـذا یـا طبـق نظـر پزشـک یـا داروسـاز مصـرف کننـد.
هنـگام بـارداری و شـیردهی روزانـه یـک عـدد همـراه غـذا یـا طبـق نظـر پزشـک یـا داروسـاز مصرف شـود.
- **هشـدار و احتیاط‌هـا:** ایـن فـراورده مکمـل بـوده و بـرای درمـان، تشـخیص و پیشـگیری نیست.
در صـورت اسـتفاده از سـایر داروهـا از جملـه داروهـای رقیق‌کننده‌ی خـون، قبـل از مصـرف بـا پزشـک مصـرف کنید.
- **مصـرف در بـارداری و شـیردهی:** هنـگام بـارداری و شـیردهی روزانـه یـک عـدد همـراه غـذا یـا طبـق نظـر پزشـک یـا داروسـاز مصـرف شـود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخـلات دارویـی و غذایـی قابـل ذکـر:** مصـرف همزمـان ایـن محصـول بـا داروهـای ضـد انعقـاد خـون و ضـد پلاکـت (ماننـد وارفاریـن) توصیـه نمی‌شـود.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائـم مصـرف بیـش از حـد و نحـوه مدیریـت مسـمومیت بـا آن:** -
- **شـرایط نگـه‌داری فـرآورده:** دور از نـور و رطوبـت و در دمـای زیـر ۲۵ درجـه سـانتی‌گراد نگهـداری شـود. دور از دسـترس کـودکان نگهـداری شـود.



- **نام فرآورده: سافت‌ژل ویتامین D3 1000 واحدی**
- **نام تجاری/ برند: Navak Vitamin D3 1000 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: ناوک دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی کارن**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳ بلیستر ۲۰ عددی کپسول نرم**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت‌ژل
Vitamin D3 (Cholechalciferol)	۲۵ mcg (۱۰۰۰ IU)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپانت):**
Soybean oil, Glycerin, Vitamin E, Gelatin
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها
کمک به حفظ عملکرد سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:**
کودکان و نوجوانان: روزانه ۱ عدد سافت‌ژل همراه با غذا یا طبق نظر پزشک یا داروساز مصرف کنند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
بیشتر از مقدار توصیه‌شده مصرف نشود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** افرادی که به ویتامین D و مشتقات آن حساسیت دارند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



- **نام فرآورده: سافت‌ژل ویتامین D۳ ۴۰۰۰ واحدی**
- **نام تجاری/ برند: Navak Vitamin D3 4000 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: ناوک دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی کارن**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳ بلیستر ۲۰ عددی کپسول نرم**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت‌ژل
Vitamin D3 (Cholechalciferol)	۱۰۰ mcg (۴۰۰۰ IU)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):**
Soybean oil, Glycerin, Vitamin E, Gelatin
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
کمک به حفظ سلامت و استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها
کمک به حفظ عملکرد سیستم ایمنی
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** بزرگسالان هفته‌ای ۲ عدد سافت‌ژل همراه با غذا یا طبق نظر پزشک یا داروساز کنند.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیش‌گیری نیست.
بیشتر از مقدار توصیه‌شده مصرف نشود.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** افراد با سطح کلسیم یا ویتامین D بالا
افرادی که به ویتامین D و مشتقات آن حساسیت دارند.
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** از مصرف همزمان این مکمل با داروهای زیر خودداری کنید و یا پیش از مصرف با پزشک خود مشورت کنید:

اورلیستات یا زنیکال (داروی کاهش وزن)
کلستیرامین (داروی پایین آورنده کلسترول)
آلومینیوم هیدروکسید و سوکرالفیت (داروی گوارشی)
داروهای شیمی‌درمانی
داروهای آنتی اپیلپتیک (کاربامازپین، فنی توئین، پریمیدون و فنوباربیتال)
دیگوکسین (گلیکوزیدهای قلبی)
هیدروکلروتیازید و کلروتالیدون (دیورتیک‌های تیازیدی و شبه آن)

- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.




- **نام فرآورده: سافت‌ژل ویتامین E ناوک**
- **نام تجاری/ برند: Navak Vitamin E 400 IU**
- **شرکت صاحب پروانه: ناوک دارو**
- **تولیدشده در: داروسازی کارن**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: ۳ بلیستر ۱۰ عددی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن:**

جز	مقدار در هر سافت‌ژل
Vitamin E (as D-alpha-Tocopherol acetate)	IU ۴۰۰

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):**
Soybean oil, Glycerin, Vitamin E, Gelatin
- **رده سنی:** -
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:**
تأمین ویتامین E و آنتی‌اکسیدان
بهبود سطح کلسترول و پیشگیری از بیماری‌های قلبی - عروقی
حفظ سلامت پوست و مو
بهبود علائم سندروم پیش از قاعدگی (PMS)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** روزانه یک عدد سافت‌ژل همراه با غذا یا طبق نظر پزشک یا داروساز مصرف شود.
- **هشدار و احتیاط‌ها:** این فراورده مکمل بوده و برای درمان، تشخیص و پیشگیری نیست.
در صورت استفاده از سایر داروها از جمله داروهای رقیق‌کننده‌ی خون، قبل از مصرف با پزشک مصرف کنید.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** زیر نظر پزشک مصرف شود.
- **موارد منع مصرف:** -
- **عوارض جانبی احتمالی:** -
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** -
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرکت نوریا درمان پاسارگاد





- **نام فرآورده: کونژوگیتد لینولئیک اسید (CLA)**
- **نام تجاری/ برند: ویتامور (VITAMORE)**
- **شرکت صاحب پروانه: نوریا درمان پاسارگاد**
- **تولیدشده در: شرکت داروسازی دانا**
- **شکل فرآورده و تعداد در بسته بندی: کپسول ژلاتینی نرم - ۶۰ عدد - داخل قوطی**
- **اجزای فرآورده و مقادیر آن: میزان در یک کپسول ژلاتینی نرم:**

جز	مقدار
Tonalin® CLA تونالین سی ال ای Conjugated linoleic acid (free fatty acid form)	۱۰۰۰ میلی‌گرم (حاوی ۸۱۰ میلی‌گرم اسید چرب کونژوگیتد لینولئیک اسید)

- **اجزای غیرفعال فرآورده (اکسیپیانت):** ژلاتین، سوربیتول، گلیسرین
- **رده سنی:** بزرگسالان
- **موارد مصرف برای اساس اطلاعات درج‌شده در فرآورده:** کمک به افزایش متابولیسم چربی‌ها و کاهش وزن بدن (کاهش توده چربی بدن)
- **دستور صحیح مصرف فرآورده:** ۱ تا ۲ کپسول، سه بار در روز، قبل یا همراه با غذا و یا مطابق دستور پزشک
- **هشدار و احتیاط‌ها:** برای مصرف بیش از ۶ ماه با پزشک مشورت کنید.
مصرف این مکمل در کودکان توصیه نمی‌شود.
این فرآورده یک مکمل غذایی است و جهت پیشگیری، تشخیص یا درمان نمی‌باشد.
- **مصرف در بارداری و شیردهی:** مصرف این فرآورده در بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود حساسیت به این فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید.
- **عوارض جانبی احتمالی:** مصرف این فراورده در برخی افراد ممکن است ناراحتی گوارشی ایجاد کند.
- **تداخلات دارویی و غذایی قابل ذکر:** در صورت داشتن هر نوع بیماری و یا مصرف هر نوع دارو، قبل از مصرف این مکمل با پزشک مشورت کنید.
- **ماکزیمم دوز مصرفی در طول روز:** -
- **علائم مصرف بیش از حد و نحوه مدیریت مسمومیت با آن:** -
- **شرایط نگه‌داری فرآورده:** دور از دسترس کودکان، در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود. کپسول‌ها را تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

این محصول در بسته‌بندی ۳۰ و ۹۰ عددی نیز عرضه می شود .